


→ 수용성 영양소
→ 지용성 영양소

유형

영양소	영양소 형태	소화된 산물
A		 아미노산
B		 글리세롤  지방산



ㄱ. A는 소장에서 소화된 후 (가)를 통해 이동한다.
 ㄴ. B는 쓸개즙에 의해 최종 소화된 후 (나)를 통해 이동한다.
 ㄷ. A와 B는 모두 지용성 영양소이다

- ① $\neg$ ② $\perp$ ③ $\neg, \perp$ ④ $\neg, \sqcup$ ⑤ $\perp, \sqcup$

정답 ①

(1) **알코올의 흡수와 분해**: 섭취한 알코올의 약 20%는 위에서 흡수되고, 나머지는 소장 of 모세혈관을 통해 흡수된다. 체내로 흡수된 알코올은 혈액을 통해 간으로 운반된 후 알코올 분해 효소에 의해 아세트알데히드, 아세트산 등을 거쳐 이산화탄소와 물로 분해되고, 간의 알코올 해독량을 초과해 섭취할 경우 아세트알데히드가 체내에 남아 간을 손상시킨다.

(2) **알코올이 인체에 미치는 영향**: 알코올은 구강 점막, 식도, 위 점막 등을 손상시킬 수 있으며, 지나친 음주는 위염, 위궤양, 지방간, 간경변, 알코올성 치매 등의 원인이 된다.

4 알코올은 □에서 분해되므로 지방간, 간경변 등의 원인이 된다.

- 지방
- 아세트알데히드
- 위
- 간

