


5 그림은 소장에서 흡수된 양분이 심장으로 이동하는 경로를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 단당류와 아미노산은 A 경로를 따라 이동한다.
- ㄴ. 지용성 비타민은 B 경로를 따라 이동한다.
- ㄷ. 흡수된 수용성 영양소와 지용성 영양소는 온몸으로 가기 전에 모두 간을 거친다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄴ      ⑤ ㄴ, ㄷ

6 표는 혈중 알코올 농도가 신체 행동에 미치는 영향을 나타낸 것이다.

| 음주량(캔) | 혈중 알코올 농도(%) | 신체에 미치는 영향                   |
|--------|--------------|------------------------------|
| 2      | 0.02~0.05    | 졸음, 긴장 해소                    |
| 3      | 0.05~0.1     | 말이 많아짐, 사회적 억압감 감소           |
| 7      | 0.1~0.2      | 말이 둔해짐, 평형 감각·판단력·집중력·기억력 둔화 |
| 10     | 0.2~0.3      | 평형·언어 장애가 심해짐, 구토, 흥분, 몸 떨림  |
| 14     | 0.3~0.4      | 의식·기억력 상실                    |
| 20     | 0.4 이상       | 호흡 정지, 혼수, 사망                |


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 음주량은 65kg 성인 남성, 맥주 1캔 기준이다.)

보기

- ㄱ. 음주량이 7캔 이상이면 소뇌의 기능이 향상된다.
- ㄴ. 혈중 알코올 농도가 증가할수록 대뇌의 기능이 둔화된다.
- ㄷ. 의식·기억력 상실은 혈중 알코올 농도 0.3% 이상에서 나타난다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄴ      ⑤ ㄴ, ㄷ

7 그림은 이자액의 소화 효소가 활성화되는 과정을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 키모트립신과 트립신은 녹말과 텍스트린을 분해하는 효소이다.
- ㄴ. 트립시노젠은 소장에서 엔테로키나아제에 의해 활성화 상태로 바뀐다.
- ㄷ. 소화 효소를 비활성 상태로 분비하는 이유는 분비샘을 보호하기 위한 것이다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 그림 (가)와 (나)는 소장에서 일어나는 기계적 소화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)와 같은 운동은 식도나 위에서도 관찰된다.
- ② (나)는 음식물과 소화액이 섞이는 분절 운동이다.
- ③ (나)에서 소화관 근육의 수축과 이완이 일어난다.
- ④ 음식물과 소화액의 혼합은 (나)를 통해 일어난다.
- ⑤ (나)는 음식물을 한쪽 방향으로만 이동시키는 운동이다.