



교감 신경 말단에서 아드레날린이 분비되면 심장 박동이 촉진되고, 부교감 신경 말단에서 아세틸콜린이 분비되면 심장 박동이 억제된다.

- 5 그림 (가)는 자율 신경 A나 B를 자극했을 때 동방 결절에서 나타나는 막전위를, (나)는 휴식을 취하고 있을 때와 운동할 때 각 기관에 공급되는 혈류량을, 표는 그때의 심박출량을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

구분	휴식	운동
심박출량 (L/분)	5	20

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기


- ㄱ. A를 자극하면 뇌로 가는 분당 혈류량이 자극 전보다 감소한다.
- ㄴ. B를 자극하면 분당 심박출량이 자극 전보다 감소한다.
- ㄷ. 운동을 하면 소화 기관의 작용이 활발하게 일어난다.
- ㄹ. 휴식을 취할 때보다 운동을 할 때 피부를 통한 열손실이 더 많다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

림프관은 림프가 이동하는 관으로, 한쪽 끝은 조직 세포 사이에 분포하고 다른 한쪽은 정맥과 연결되어 있으며, 판막이 존재한다.

- 6 그림은 사람의 체액 순환 경로와 각 부위의 혈액량을 상대값으로 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기

- ㄱ. 혈압의 크기는 혈관 $A > B > C$ 이다.
- ㄴ. 정맥보다 심장에 더 많은 혈액이 들어 있다.
- ㄷ. 모세혈관을 빠져나간 혈액의 일부는 림프관을 거쳐 정맥으로 이동한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ