


항이노 호르몬이 제대로 분비되지 않거나, 신장에 있는 표적 세포가 항이노 호르몬에 제대로 반응하지 못하면 물의 재흡수가 억제되어 오줌량이 증가한다.

- 9 자료는 요붕증에 대한 설명을, 그림은 정상인과 요붕증 환자 (가), (나)의 혈장 삼투압에 따른 혈장 내 항이노 호르몬(ADH)의 농도를 나타낸 것이다.

요붕증은 ADH가 제대로 분비되지 않거나, 집합관의 세포가 ADH에 제대로 반응하지 못해 정상인에 비해 신장에서 물의 재흡수가 억제되는 증상이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?


보기

- ㄱ. 환자 (가)는 집합관의 세포가 ADH에 제대로 반응하지 못한다.
 ㄴ. 환자 (나)는 정상인에 비해 다량의 물은 오줌을 배설한다.
 ㄷ. 신장에서 알도스테론의 작용이 억제되면 요붕증이 개선될 수 있다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

단백질과 같이 여과되지 않거나, 요소와 같은 노폐물은 투석액에 포함시키지 않으며, 혈액과 투석액이 같은 방향으로 흐를 때보다 반대 방향으로 흐를 때 투석 효율이 더 좋다.

- 10 그림은 인공 신장기의 구조를 나타낸 것이고, 자료는 그림에 관련된 설명이다.



- 투석막을 경계로 혈액과 투석액이 반대 방향으로 흐른다.
- 물질 X의 농도는 (가)와 (다)에서 같다.
- 요소의 농도는 (나)보다 (라)에서 더 낮다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)~(라)는 각 관을 흐르는 혈액 또는 투석액을 나타낸다.)

보기

- ㄱ. 물질 X는 단백질이다.
 ㄴ. 요소의 농도는 (가)가 (라)보다 높다.
 ㄷ. (가)는 혈액, (다)는 투석액이다.
 ㄹ. 투석액이 그림과 반대 방향으로 흐르면 (가)와 (나)의 요소 농도 차이는 더 커진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ