


절전 뉴런이 짧고, 절후 뉴런이 길면 교감 신경이므로 절전 뉴런 말단에서는 아세틸콜린, 절후 뉴런 말단에서는 아드레날린이 분비된다.

9 그림 (가)는 두 종류의 자율 신경을, (나)는 홍채의 환상근과 종주근을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?


보기

- ㄱ. a와 b에서 분비되는 물질은 동일하다.
- ㄴ. 신경 A에 의해 홍채의 종주근이 이완되고, 환상근이 수축된다.
- ㄷ. 신경 B는 혈당량의 감소를 촉진한다.

- ① ㄴ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

교감 신경과 부교감 신경은 길항 작용을 통해 항상성을 조절한다.

10 그림은 중추에 연결된 네 종류의 말초 신경 A~D를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A와 C는 길항 작용을 통해 항상성을 조절하는 역할을 한다.
- ㄴ. B가 흥분하면 신경의 말단에서 아세틸콜린이 분비된다.
- ㄷ. C가 흥분하면 동방 결절에서의 활동 전위 크기가 증가한다.
- ㄹ. 중추를 기준으로 B와 D의 흥분 전달 방향은 서로 반대이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ