



- 난황이 진행되어도 각 할구의 염색체 수와 DNA량은 변화 없다.

- ② 착상과 임신 : 수정 후 7~8일이 지나면 수정란은 포배 상태로 되어 자궁 내벽에 파묻히는 데, 이를 착상이라고 한다. 착상된 이후부터 임신되었다고 한다.
- ③ 임신의 유지 : 수정란이 착상되면 융모막에서 호르몬(HCG)이 분비되어 황체가 퇴화하는 것을 막아 프로게스테론이 계속 분비되고, 임신 기간 동안 자궁 내벽을 두껍게 유지하는 한편, FSH와 LH의 분비를 억제하여 새로운 여포의 성숙과 배란을 막는다. 임신 3개월이 되면 난소 속의 황체는 퇴화하고, 태반에서 프로게스테론과 에스트로겐이 분비되어 임신 상태를 유지한다.



심화의 창

임신 중의 호르몬 분비와 임신의 진단





HCG(인간 융모성 생식선 자극 호르몬)는 수정란이 착상된 후 융모막이 형성되면 분비되어 황체의 퇴화를 막는 호르몬이다. HCG의 분비량은 임신 초기에 크게 증가하고, 임신 3개월 이후에는 감소하여 이때 황체가 퇴화한다. 이후에는 태반에서 프로게스테론과 에스트로겐이 분비된다. HCG의 일부는 오줌으로 배출되므로 소변을 이용한 초기 임신 진단에 이용된다. 임신 진단용 시약의 HCG 항체와 오줌 속의 HCG가 결합하면 임신 여부 표시창에 붉은 선이 나타나므로 임신 여부를 진단할 수 있다.

5. 발생과 분만

- (1) 태반의 형성 : 착상 후 배 조직의 일부와 자궁 내벽의 일부가 합쳐져서 태반이 형성된다.

- ① 태반에서 태아의 혈관과 모체의 혈관은 직접 연결되어 있지 않고, 확산을 통한 물질 교환이 일어난다.
- ② 태아는 모체로부터 산소와 영양소를 공급받고, 이산화탄소나 노폐물을 모체 쪽으로 내보낸다.



정답

- ① 포배, 착상, 임신
- ② HCG
- ③ 황체, 프로게스테론
- ④ 여포, 월경
- ⑤ 확산
- ⑥ 없, 있

