

날개 평가

1

수정 후 8주까지를 ☐☐
☐ 수정 후 9주부터 출
 생 때까지를 ☐☐☐라
 고 한다.

2

태아의 기관 중에서 가장
 먼저 형성되기 시작하는
 것은 ☐☐ ☐☐
 이다.

3

수정 후 ☐주가 되면 태
 아 기관들의 기본적인 구
 조가 형성된다. 분만은 수
 정일로부터 약 ☐☐
 일째 되는 날 일어난다.

4

분만이 가까워지면 뇌하수
 체 후엽에서는 ☐☐
☐의 분비량이, 뇌하수체
 전엽에서는 ☐ ☐
☐ 호르몬의 분비량이
 증가한다.

5

☐☐은 정자가 난자에
 접근하는 것을 막는 남성
 용 피임 기구이며, 자궁 내
 장치는 수정란의 ☐☐
 을 방해하는 여성용 피임
 기구이다.

6

먹는 피임약의 주성분은
 에스트로겐과 ☐☐
☐☐으로, 여포의 성
 숙과 ☐☐을 억제한다.

정답

- ① 배아기, 태아기
- ② 중추 신경계
- ③ 8, 266
- ④ 옥시토신, 젖 분비 자극
- ⑤ 콘돔, 착상
- ⑥ 프로게스테론, 배란

(2) 태아의 발생


- ① 배아기 : 수정 후 8주까지를 말하며, 이 시기에 대부분의 기관이 형성된다. 중추 신경계가 가장 먼저 발달하기 시작하며, 심장, 팔, 다리는 8주가 되면 완성된다.
- ② 태아기 : 수정 후 9주부터 출생 때까지를 말한다. 사람의 모습을 갖추었으며, 임신 18주 정도 되면 태아가 활발히 움직여 태동을 느낄 수 있다.



자료

분석하기

태아의 발생 과정



- 수정 후 8주 이내에 대부분의 기관이 형성되어 사람의 모습을 갖추게 된다. 그러므로 이 기간에 모체의 약물 복용, 흡연, 음주, 바이러스 감염 등은 태아의 기관 형성에 나쁜 영향을 주어 기형이 유발될 가능성이 높다.
- 기관이 형성되는 시기와 완성되는 시기는 기관마다 다르다.

(3) 분만 : 분만이 가까워지면 뇌하수체 후엽에서는 옥시토신, 뇌하수체 전엽에서는 젖 분비 자극 호르몬의 분비량이 증가한다. 옥시토신은 자궁 근육을 수축시켜 수정 후 약 266일(38주)이 되면 분만이 이루어지게 하고, 젖 분비 자극 호르몬은 젖샘을 발달시켜 출산 후 젖 분비를 촉진한다.

6. 피임과 인공 수정

(1) 일시적인 피임법

- ① 먹는 피임약 : 합성 프로게스테론과 에스트로겐이 주성분인 피임약을 복용하여 새로운 여포의 성숙과 배란을 억제한다.
- ② 콘돔 : 얇은 고무 재질의 주머니로, 정자가 여성의 질 내로 들어가는 것을 막아 수정이 일어나지 않게 하는 남성용 피임 기구이다.
- ③ 폐미돔 : 여성용 콘돔으로, 정자가 여성의 자궁 안으로 들어가는 것을 막아 수정이 일어나지 않게 한다.
- ④ 자궁 내 장치(루프) : 정자의 이동을 방해하고, 수정란이 자궁 내벽에 착상하지 못하도록 한다.
- ⑤ 생식 주기법 : 배란 예정일 전후로 2~3일씩 임신 가능한 기간에 성생활을 피하는 방법이다.

