



(2) 영구 피임법

- ① 정관 수술 : 남성의 수정관을 절단하고 묶어 정자가 체외로 배출되는 것을 막는다.
- ② 난관 수술 : 여성의 수란관을 절단하고 묶어 정자와 난자가 만나지 못하도록 한다.



유형 짝고 넘어가기 피임 방법 [2008년 6월 모의평가]

그림은 정상적으로 생식 세포가 형성되는 남성과 여성에게 시술한 피임 방법을 나타낸 것이다.



수술을 받은 후에도 일어나는 현상으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A에서의 테스토스테론 분비
- ㄴ. B에서의 배란
- ㄷ. B에서의 감수 제 1 분열


- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설 정관 수술을 받더라도 정소(A)에서 테스토스테론의 분비는 정상적으로 일어난다. 또, 난관 수술을 받더라도 성 호르몬의 분비가 정상적으로 일어나므로, 난소(B)에서의 감수 제 1 분열과 배란은 정상적으로 일어난다.


정답 ⑤

(3) 인공 수정

- ① 체내 인공 수정 : 남성의 정자 수가 부족하여 임신이 되지 않을 때 주로 이용하는 방법이다. 정자를 채취하여 건강한 정자를 골라 여성의 배란 시기에 맞추어 주입기로 자궁에 넣어 준다.



- ② 체외 인공 수정 : 여성의 수란관이 막혀 임신이 되지 않을 때 주로 이용하는 방법이다. 정자와 난자를 채취하여 체외 수정시킨 후, 시험관에서 8세포기 정도까지 발생시킨 배를 여성의 자궁에 주입하여 착상시킨다. 모체의 프로게스테론 농도가 높게 유지되어 자궁 내벽이 충분히 두꺼워진 상태에서 배를 주입해야 한다. 착상된 배는 정상적으로 임신된 경우와 같이 태반을 형성하고 태아로 자란다.



날개 평가

- ① 정관 수술은 남성의 ☐ ☐을 절단하고 묶어 정자가 체외로 배출되는 것을 막는 방법이다.

- ② 체내 인공 수정을 할 경우 정자를 채취하여 여성의 ☐ ☐ 시기에 맞추어 자궁에 주입한다.

- ③ 체외 인공 수정에서 배를 자궁에 주입하기에 적합한 시기는 모체의 프로게스테론 농도가 ☐ ☐, 자궁 내벽이 ☐ ☐ ☐ 때이다.

정답

- ① 수정관
- ② 배란
- ③ 높고, 두꺼울