




9 그림은 여성의 생식 주기에 따른 난소 내의 변화와 호르몬 양의 변화를 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 배란 이후 형성된 황체에서도 에스트로겐이 분비된다.
- ㄴ. 에스트로겐은 프로게스테론의 분비를 억제한다.
- ㄷ. 여포가 성숙함에 따라 에스트로겐의 분비량은 증가한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


10 그림 (가)는 사람의 체세포 분열 과정 중, (나)는 난할 과정 중 시간에 따른 세포 1개당 DNA량의 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (나)는 수란관에서 일어난다.
- ② 간기 때 DNA의 복제는 (가)에서만 볼 수 있다.
- ③ (나)에서 세포 1개당 세포질의 양은 점차 작아진다.
- ④ (나)는 분열할 때마다 배 전체의 DNA량이 2배씩 증가한다.
- ⑤ (가)와 (나)는 분열 결과 세포 한 개당 DNA량이 변하지 않는다.

11 그림은 1950년대에 임신 중 입덧을 진정시켜 주는 약으로 개발된 탈리도마이드를 복용했을 때 생기게 된 각 기관의 기형과 기형이 일어나는 기간을 나타낸 것이다.




이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 탈리도마이드는 태반을 통과한다.
- ㄴ. 탈리도마이드는 수정 후 20~24일 기간에 귀 결손의 기형 유발원으로 작용한다.
- ㄷ. 마지막 월경일 이후 46~50일에 탈리도마이드를 복용하면 엄지 손가락 기형이 생길 수 있다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ                      ④ ㄱ, ㄴ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 그림은 생식 주기에 따라 난소 호르몬이 주성분인 피임약을 복용한 이후 혈중 피임약의 농도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 복용하는 동안 자궁 내벽이 발달한다.
- ㄴ. 복용을 중지하면 월경이 일어난다.
- ㄷ. 복용하는 동안 새로운 여포의 성숙과 배란이 억제된다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ                      ④ ㄱ, ㄴ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ