


감수 제 1 분열 과정에서 상동 염색체가 분리되며, 감수 제 2 분열 과정에서 염색 분체가 분리된다.

남성의 생식 기관인
세정관에서는 사춘기
이후 체세포 분열과
감수 분열이 일어난다.

1 그림 (가)~(마)는 남자의 생식 기관에서 생식 세포가 형성될 때 염색체가 변화되는 과정을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은? (단, 염색체의 일부만 나타내었다.)

보기

- ㄱ. 성 염색체의 분열 과정을 나타낸 것이다.
- ㄴ. (나)는 감수 제 1 분열 후기의 염색체 상태를 나타낸 것이다.
- ㄷ. (가)는 제 1 정모 세포, (마)는 정세포나 정자의 염색체를 나타낸 것이다.

- (1) $\neg$ (2) $\perp$ (3) $\sqsubset$
 (4) $\neg, \perp$ (5) $\perp, \sqsubset$

2 그림 (가)는 남성 생식 기관의 일부를, (나)는 세정관의 단면을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 부정소에서 감수 분열은 일어나지 않는다.
 ㄴ. A와 B 세포는 X와 Y염색체를 모두 갖는다.
 ㄷ. 세정관에서는 체세포 분열이 일어나지 않는다.

- (1) $\neg$ (2) $\sqsubset$ (3) $\neg, \sqcup$
 (4) $\sqcup, \sqsubset$ (5) $\neg, \sqcup, \sqsubset$