출생 시 난소에는 감수 제1분열 전기 상태로 분열이 멈춘 제1난모 세포가 존재한다.

3 그림 (가)는 난자의 형성과 수정 과정을, (나)는 시간에 따른 DNA량 변화를 나타낸 것이다.



(가) (나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기 에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. A 시기에는 2번의 체세포 분열이 일어난다.
ㄴ. A 시기의 변화는 난소에서, B 시기의 변화는 수란관에서 볼 수 있다.
ㄷ. 제 1 난모 세포의 핵 1개당 DNA 상대량은 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

배란이 일어나면 황체 호르몬인 프로게스테론의 분비량이 증가하고, 프로게스테론의 분비량이 감소하면 월경이 일어난다. 프로게스테론 농도의 변화와 기초 체온의 변화는 유사하다.

4 그림은 임신 여부에 따른 기초 체온, 난소 호르몬의 분비량, 난소와 자궁 내벽의 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① LH는 황체에 작용한다.
② 임신 직후 황체가 퇴화된다.
③ 프로게스테론의 분비 감소로 인해 월경이 일어난다.
④ 임신하지 않은 경우 월경일에 기초 체온이 올라간다.
⑤ 수정이 되지 않으면 황체는 여포로 되어 새로운 생식 주기가 시작된다.