



임신 진단 기구에는 HCG와 반응하는 항체가 있어 오줌 속에 섞여 있는 HCG가 들어오면 임신 여부 표시창에 붉은 선이 나타난다.

7 그림 (가)는 임신 중의 호르몬 분비량 변화를, (나)는 소변을 이용하여 간편하게 임신을 진단할 수 있는 임신 진단 기구의 원리를 나타낸 것이다.



(가)




(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, HCG는 인간 융모성 생식선 자극 호르몬이다.)


- ① 임신 기간 중 프로게스테론은 계속 분비된다.
- ② 사용하지 않은 임신 진단 기구에는 HCG가 존재한다.
- ③ 분만할 때까지 난소 내의 황체는 계속 유지된다.
- ④ 수정 직후 임신 진단 기구를 사용하면 임신 여부 표시창에 붉은 선이 나타난다.
- ⑤ 태반에서 분비되는 프로게스테론에 의해 HCG의 분비가 촉진된다.

태줄 동맥은 태아에서 태반 쪽으로 혈액이 이동하는 혈관이며, 태줄 정맥은 태반에서 태아 쪽으로 혈액이 이동하는 혈관이다.

8 그림 (가)는 태반의 구조를, (나)는 태반을 통한 모체와 태아 사이의 물질 교환을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 혈중 산소 분압은 태줄 동맥이 모체 동맥보다 높다.
- ㄴ. 태반에서 태아와 모체 사이의 기체 교환은 능동 수송에 의해 일어난다.
- ㄷ. 태아에서 생성된 CO_2 와 노폐물은 태줄 동맥을 거쳐 모체 정맥으로 이동한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ