



정자의 생성량이 정관 수술을 했다고 줄어드는 것은 아니며, 정관 수술을 한 경우 정액의 성분 중 약 1%가 정자이므로 사정되는 정액의 양이 약간 줄어든다.

9 그림 (가)와 (나)는 피임을 위해 수란관과 수정관을 각각 자르고 묶는 시술을 한 상태를 나타낸 것이다.



(가)




(나)

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


- ① (가)는 정상적인 배란과 월경 주기가 일어난다.
- ② (가)의 경우 정자가 여성의 체내로 들어와도 난자에 접근하지 못한다.
- ③ (나)의 경우 B를 통해 이동하는 정액의 양은 시술 전과 같다.
- ④ (나)의 경우 C에서 정자의 생성량은 시술 전과 같다.
- ⑤ A에서 분비된 에스트로겐은 자궁 내벽을 발달시킨다.

(가)는 체내 인공 수정, (나)는 체외 인공 수정이다. 둘 다 자궁이 정상이어야 하며, (가)는 정자 주입 후 수정이 되므로 일주일 후에 착상이 일어난다.

10 그림 (가)와 (나)는 불임 치료를 하기 위한 두 가지 인공 수정 방법을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 자궁에서 수정이 일어난다.
- ② (가)는 난관 수술을 한 경우에도 자궁 기능이 정상이면 시술할 수 있다.
- ③ A는 프로게스테론 농도가 가장 높을 때 실시한다.
- ④ B 과정 전에 여성에게 여포 성숙을 촉진시키는 물질을 주사한다.
- ⑤ C는 월경 직후에 실시한다.