


DDT는 자연 상태에서 잘 분해되지 않아 생물의 체내로 들어 오면 분해 및 배설이 잘 되지 않아 체내에 축적된다.

- 1 그림은 살충제로 사용된 DDT가 하천에 유입된 이후 하천의 여러 생물에서 DDT가 농축되는 과정을 조사한 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?


보기

- ㄱ. 상위 영양 단계일수록 DDT의 분해 능력이 감소한다.
 ㄴ. DDT의 사용을 줄여도 오랜 기간 생태계에 영향을 준다.
 ㄷ. 최종 소비자에게만 피해를 주기 때문에 생물 다양성에 큰 영향은 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

호기성 미생물은 유기물을 분해하고, 녹조류는 산소를 생성하고, 물벼룩은 녹조류의 증식을 막고, 어류는 물벼룩의 급증을 막는다.

- 2 그림은 생활 하수가 여러 처리 장치를 거쳐 하천에 방류되기까지의 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)의 호기성 미생물은 유기물을 무기물로 분해한다.
 ㄴ. (나)의 녹조류는 물 속의 무기물을 제거한다.
 ㄷ. (다)의 물벼룩은 녹조류를, (라)의 어류는 물벼룩의 수를 조절하는 역할을 한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ