
1000
750
500
250
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
allele count


likelihoods
lnl
−35.43798
−35.43798
−35.43798
−35.43798
0.0
2.5
5.0
7.5


parameter estimates
Values
10^{5}
10^{4}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
S_b
$-S_d$
α
b
ε
h
ω
ω_a
p_b
Parameters


discretized DFE
fraction
0.0
0.2
0.4
0.6
(−., −100)
[−100, −10)
[−10, −1)
[−1, 0)
[0, 1)
[1, .)
S


parameter estimates
Values
10^{5}
10^{4}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
S_b
$-S_d$
α
b
ε
h
ω
ω_a
p_b
Parameters


discretized DFE
fraction
0.0
0.2
0.4
0.6
(−., −100)
[−100, −10)
[−10, −1)
[−1, 0)
[0, 1)
[1, .)
S


nested model comparison
full.no anc
full.anc
dele.no anc
dele.anc
–
0.3326
–
–
–
–
–
–
0.3616
0.4386
–
0.1021
–
1
–
–
full.no anc
full.anc
dele.no anc
dele.anc
p−value
1e−01
1e−04
1e−07
1e−10


likelihoods
lnl
−79.24746
−79.24746
−79.24746
−79.24746
0.0
2.5
5.0
7.5


inferred parameters
marginal.all
marginal.pendula
marginal.pubescens
joint.pendula
joint.pubescens
Values
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
S_b
$-S_d$
α
b
ε
h
ω
ω_a
p_b
Parameters


discretized DFE comparison
marginal.all
marginal.pendula
marginal.pubescens
joint.pendula
joint.pubescens
fraction
0.0
0.2
0.4
0.6
(−., −100)
[−100, −10)
[−10, −1)
[−1, 0)
[0, 1)
[1, .)
S


inferred parameters
marginal.all
marginal.pendula
marginal.pubescens
joint.pendula
joint.pubescens
Values
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
S_b
$-S_d$
α
b
ε
h
ω
$ω_a$
p_b
Parameters


discretized DFE comparison
marginal.all
marginal.pendula
marginal.pubescens
joint.pendula
joint.pubescens
fraction
0.0
0.2
0.4
0.6
(−., −100)
[−100, −10)
[−10, −1)
[−1, 0)
[0, 1)
[1, .)
S