

මිරිස් *Capsicum annum* L.

මිරිස් කොළ කොඩවීම

Leaf curl complex

හේතු කාරක : පැළ මැක්කා, කුඩිත්තා,
මයිටාවා , සුදු මැස්සා



පැල මැක්කා - Thrips

සර්ටෝත්‍රිප්ස් ඩෝසාලිස්

(*Scirtothrips dorsalis* Hood)

- මි.මි. 1 ක් පමණ දිගැති ලා දුඹුරු පැහැති
කෘමියෙකි.

හානිය :

- වැඩුණු සතුන් හා ශිශුවන් විසින් ලපටි පත්‍ර
හා දළු වලින් යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර දාර
දිගේ උඩු අතට රෝල් වේ. වැඩුණු පත්‍ර වලට
හානි කළ විට පත්‍රවල නාරටි දිගේ දුඹුරු
පැහැයක් දක්නට ලැබේ.



- හානිය උග්‍ර වූ විට පත්‍ර හැලී යයි.

- කරල් වලට හානිකළ විට සුදු පැහැති සිරිමි
දක්නට ලැබේ. කරල් විකෘති වී දුර්වර්ණ
වේ.



මයිටාවන් - Mites

හෙමිටාර්සොනිමස් ලේටස්
(*Hemitarsonemus latus*)

පියවි ඇසට පැහැදිලිව දැකගත නොහැකි
ඕවලාකාර, ලා දුඹුරු පැහැති සතෙකි.



හානිය

- මිරිස් පත්‍රවල යටි පැත්තේ සිට යුෂ උරා
බිම නිසා පත්‍ර යටි අතට රෝල්වීම සිදු වේ.



කුඩින්තන් - Aphids

ඒපිස් ගොසිපි
(*Aphis gossypii* Glover)

මි.මි. 1-2 ක් පමණ විශාල මෘදු ශරීර සහිත,
කළු පැහැති විශේෂය.

මයිසස් පර්සිකේ
Myzus persicae (Sulzer)

මි.මි.1.25-2.5 ක් පමණ විශාල කහමය කොළ
පැහැති විශේෂය.



හානිය

- පත්‍රවලින් හා කඳෙන් යුෂ උරා බිම නිසා
පත්‍ර කෝප්පාකාර හැඩයට හැරී කහ පැහැ
වේ.
- හානිය උග්‍ර වූ විට පැළවල වර්ධනය අඩු
වේ.
- කරල් වලට හානි කිරීම නිසා විකෘති කරල්
ඇති වේ.
- කුඩින්තන් මගින් සුවය කරන ඇලෙන
සුළු පැණි වැනි තරලය මත ද්විතියිකව දිලීර
වර්ධනය වී පසුව කළු පැහැයට හැරේ.



හානිය

- හානියට පාත්‍ර වූ පැළවල පත්‍ර කහ පැහැ වේ. බෝට්ටු ආකාර වේ.
- නාරටි පැහැදිලි වේ.
- ශාකයේ පර්ව අතර පරතරය අඩු වේ.
- ශාක කුරු වී පඳුරක් ආකාරයට වර්ධනය වේ.



සුදු මැස්සා - Whitefly

බෙමීසියා ටැබැසි

Bemisia tabaci (Gennadius)

- මි.මී. 1 ක් පමණ දිග සුදු පැහැති කෘමියෙකි.
- කොළ කොඩවීමේ වයිරස් රෝගය පතුරුවා හරින වාහකයා වේ.



කොළ කොඩවීම පාලනය

- උසස් ගුණාත්මයෙන් යුත් බීජ භාවිතාකර නිසි පරිදි තවත් නඩත්තුකර නිරෝගී දිරිමත් පැළ ලබා ගැනීම.
- වගාව නියමිත කාලයට ආරම්භ කිරීම. වියළි කලාපයේ යලි කන්නයේ නම් මාර්තු මුල වන විට තවත් කේන්ද්‍රයේ පිහිටුවා අප්‍රේල් මස වන විට වගාව කේන්ද්‍රයේ පිහිටුවිය යුතුයි.
- යුරියා පොහොර වගාවට අධික ලෙස නොයොදා නිර්දේශිත පොහොර භාවිතය.
- බඩගිරිඟු, කුරක්කන් වැනි සුළං බාධක බෝග වගාව වටා සංස්ථාපනය කිරීම.

කේන්ද්‍ර බෝගවල ජෝග, පලිබෝධ හා ජෝෂක ඌණනා හඳුනා ගැනීමේ අත්පොත

- වසුන් යෙදීම.
- ජලය ඉසීම.
- වගාව අවට ඇති වල්පැළෑටි ඇතළු විකල්ප ධාරක ශාක විනාශ කිරීම.
- ඇලෙන සුළු කහ පැහැති උගුල් භාවිතය
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක නියමිත ප්‍රමාණ වලින් හා නියමිත කාලාන්තර වලින් යෙදීම.

පැල මැස්සා, කුඩිත්තා හා සුදු මැස්සා පාලනය

ඉම්ඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්.එල්.	මි.ලී 10/ ලීටර10
ගිප්රොනිල් 5 එස්.සී.	මි.ලී. 10/ ලීටර10
ලුකනියුරෝන් 5 ඊ.සී.	මි.ලී. 20/ ලීටර10
කාබොසල්ෆාන් 20 එස්.සී.	මි.ලී. 30/ ලීටර10
ප්‍රොතියොෆොස් 50 ඊ.සී.	මි.ලී. 20/ ලීටර10
ෆොසෆොන් 35 ඊ.සී.	මි.ලී. 30/ ලීටර10
ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊ.සී.	මි.ලී 6/ ලීටර10
තයමෙතොක්සාම් 25 ඩබ්.ඒ	ග්‍රෑම් 10/ ලීටර16

මයිටාවන්ගේ හානිය පාලනය

සල්ෆර් 80% කුඩු	ග්‍රෑම් 80/ ලීටර10
ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊ.සී.	මි.ලී 6/ ලීටර10

කරල් විදින දළඹුවන් - Pod borers

ස්පොඩොප්ටෙරා ලිටියුරා
Spodoptera litura (Fabricius)

- සුහුඹුලා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සලබයෙකි.
- පූර්ව පියාපත් වල දුඹුරු ලප සහිත වන අතර අපර පියාපත් සුදු පාටය.
- ලපටි කීටයින් කළු පැහැයට හුරු කොළ පැහැතිය.
- වැඩුණු කීටයින් අඳුරු අළු පැහැති වන අතර, මි.මි.40-50 පමණ දිගය.



හෙලිකොවර්පා ආමිජෙරා
Helicoverpa armigera (Hubner)

- *Helicoverpa armigera* විශේෂයේ සුහුඹුලා දුඹුරු පැහැති සලඹයෙකි.
- වැඩුනු කීටයා මි.මී. 40-50 ක් පමණ දිගැතිය.
- පාර්ශ්විකව ලා සහ තද පැහැති ඉරි වලින් සමන්විතය.



හානිය

- මෙම විශේෂ දෙකේම දළඹුවන් පත්‍ර, අංකුර, මල් හා කරල් ආහාරයට ගනී.
- හානි වූ කරල් වල රවුම් සිදුරු දක්නට ලැබේ.
- හානිය උග්‍ර වූ විට සම්පූර්ණ කරලම ආහාරය ගනී.



හානිය පාලනය

- හානිය සිදු වූ ශාක කොටස් හා කීටයින් එකතු කර විනාශ කර දැමීම
- පස හොඳින් පෙරලීම මඟින් පිලා අවස්ථා විනාශ කිරීම
- නියමිත පැල පරතර පවත්වා ගැනීම
- නිර්දේශිත පොහොර නියමිත ප්‍රමාණ වලින් භාවිතය
- වගාව අවට ප්‍රදේශය වල් පැලෑටි වලින් තොරව පවත්වා ගැනීම
- මල් පිපෙන අවස්ථාවේ දී පහත සඳහන් නිර්දේශිත කෘති නාශක යෙදීම

ක්ලෝෆ්ලොපිසියුරෝන් 5 ඊ.සී.		මි.ලී. 15/ ලීටර්10
තයෝඩිකාබී එස්.සී.	375	මි.ලී. 15/ ලීටර්10
මෙනොමිල් එස්.පී.	40%	ග්‍රෑම්. 20/ ලීටර්10

තවාන් දියමලන්කෑමේ රෝගය Damping off

රෝග කාරක :

ෆියුසාරියම්, පිතියම්, ස්ක්ලෙරෝටියම්, පයිටොප්තෙරා සහ රයිසොක්ටෝනියා යන දිලීර (*Fusarium*, *Pythium*, *Sclerotium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*)

රෝග ලක්ෂණ :

පූර්ව දියමලන් කෑම - බීජ පැල පස් මට්ටමින් එළියට ඒමට පෙර මැරීයයි.

පශ්චිම දියමලන් කෑම

- තවානේ තැනින් තැන කුඩා කලාප වශයෙන් පැල මැල වී ඇද වැටීම.
- පැලයේ පොළවට ආසන්නයේ පටක වල තෙත් කුණුවීමක් ඇති වීම.



රෝග පාලනය

- තවාන් නිසියාකාරව ජීවානුහරණය කිරීම
- බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (බීජ කි.ග්‍රෑම් එකකට)
කැප්ටාන් 50% ඩබ්.පී	6 ග්‍රෑම්
කැප්ටාන් 80% ඩබ්.පී	4 ග්‍රෑම්
තිරාම් 80% ඩබ්.පී	5 ග්‍රෑම්
තයෝෆනේට් මීතයිල් 50 + තිරාම් 30% ඩබ්.පී	4 ග්‍රෑම්

- නියමිත පැල ගහනය පවත්වා ගැනීම.
- ජල සම්පාදනයට ප්‍රථම රෝගී ශාක පස් සමග ඉවත් කර විනාශ කිරීම.
- එම ස්ථානය හා අවට පස තෙමී යන පරිදි නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් යෙදීම.

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
තිරාම් 80% ඩබ්.පී	70 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී
තයෝෆනේට් මීතයිල් 50% + තිරාම් 30% ඩබ්.පී	50 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී
තයෝෆනේට් මීතයිල් 70% ඩබ්.පී	30 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී

ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය Anthracnose

රෝග කාරකය :

කොලෙටොට්‍රිකම් කැප්සිසි දිලීරය
(*Colletotrichum capsici*)

රෝග ලක්ෂණ :

1. පසු මැරියාම

- රිකිලි අග්‍රස්ථය දුඹුරු කළු පැහැ ගැන්වී
ගොස් පසුව ශාකයද මැරී යයි

2. කරලට හානි වීම

- ඉදුණු කරල්වල ලා අළුවන් සිට යුඹුරු පැහැති කුඩා වටකුරු ගිලුණු ලප ඇතිවේ.
- කල් ගත වූ ලප වල කළු පැහැ තිත් වලින් සෑදුණු කේන්ද්‍රික වල ඇතිවේ
- ආසාදිත කරල් පිදුරු පැහැ වේ
- ආසාදිත බීජ මලකඩ පැහැයක් ගනී

පැතිරීම : බීජ , බෝග අවශේෂ හා ද්විතියික
ආසාදනය සුළඟ මගින්



රෝග පාලනය

- අස්වැන්න නෙලීමෙන් පසු රෝගී කරල් තෝරා ඉවත් කිරීම
- නිරෝගී බීජ පමණක් ලබා ගැනීම
- බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම
- බෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම
- බෝග අවශේෂ කොටස් විනාශ කිරීම
- මුල් අවස්ථාවේදීම රෝගී ශාක කොටස් ඉවත් කර විනාශ කිරීම
- මල් පිපෙන අවධියේ පටන් දින 7 - 10 ට වරක් බැගින් නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලීටර 10 කට)
මැන්කොසෙබ් 80 ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
මැනෙබ් 80 ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
තයෝෆනේට් මීතයිල් 70 ඩබ්.පී	6 ග්‍රෑම්
කාබන්ඩයිම් 50 ඩබ්.පී	7 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොනැලොනිල් 500 ග්‍රෑම් රැලි එස්ගසි	30 මි.ලී
ප්‍රොපිකොනසෝල් 250 ග්‍රෑම් රැලි ඊගසි	10 මි.ලී
කොපර් 37.5% ඩබ්ගජී	40 ග්‍රෑම්



රෝග පාලනය :

- ඇත්තුක්කෝස් රෝගය පාලනය සඳහා අනුගමනය කරන ලද ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කිරීම
- රෝගය පැතිරී යාමේ අවදානමක් පවතිනම් නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් ඉසීම

පත්‍ර පුළුල් රෝගය Cercospora leaf spot

රෝග කාරකය :

සර්කොස්පෝරා කැප්සිසි දිලීර විශේෂය
(*Cercospora capsici*)

රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍ර මත ලා අළු පැහැ මාධ්‍යයකින් සහ වට්ට වන දුඹුරු පැහැ දාරයකින් සමන්විත වටකුරු ලප ඇති වේ
- රෝගී පත්‍ර කහ පැහැ වී හැලී යයි
- රෝගය තදින් ඇති විට කඳේ, පත්‍ර හා නටු වලද මෙම පුළුල් දැකිය හැකිය

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලීටර 10 කට)
කොපර් 50 ඩබ්.පී	40 ග්‍රෑම්
මැන්කොසෙබ් 80 ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
මැනෙබ් 80 ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
ප්‍රොපිනෙබ් 70 ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
ටෙබුකොනසෝල් 250 ග්‍රෑම් රැලි ඊ. ඩබ්	6 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොනැලොනිල් 500 ග්‍රෑම් රැලි එස්ග සි	8 මි.ලී
ප්‍රොපිකොනසෝල් 250 ග්‍රෑම් රැලි ඊග සි	3.5 මි.ලී
කොපර් 37.5% ඩබ්ගජී	50 ග්‍රෑම්

රිකිලි කුණුවීමේ රෝගය Choanephora Blight

රෝග කාරකය :

කොඇනිෆෝරා දිලීර විශේෂය
(*Choanephora* spp.)

රෝග ලක්ෂණ :

- මල් පොහොට්ටු හා අග්‍රස්ථ අංකුරයන්හි පටක කළු දුඹුරු පැහැයකට හැරේ
- ආසාදිත කොටස් තෙත් කුණුවීමකට ලක්වේ
- රිකිලි ඉහල සිට පහලට මැරී යයි
- ආසාදිත රිකිලිවල කුරු වැනි රිදී පැහැයකට හුරු දිලීර ජාල දැකගත හැක



රෝග පාලනය :

- නිර්දේශිත පරතරය පවත්වා ගැනීම
- රෝගී ශාක කොටස් කඩා කෂේත්‍රයෙන් ඉවත්කර විනාශ කිරීම

කෂේත්‍ර බෝගවල ජෝග, පලිබෝධ හා රෝෂක උණනා හඳුනා ගැනීමේ අත්පොත

- නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලීටර 10 කට)
කොපර් 50 ඩබ්.පී	40 ග්‍රෑම්
කොපර් 37.5% ඩබ්ගජී	50 ග්‍රෑම්
මැන්කොසෙබ් 80 ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
මැනෙබ් 80% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
ප්‍රොපිනෙබ් 70% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්. සී	8 මි.ලී
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්ග සී	30 මි.ලී

පාදස්ථ කුණුවීම Collar rot

රෝග කාරක :

ෆියුසාරියම්, පිතියම්, ස්ක්ලෙරෝටියම් රයිසොක්ටෝනියා වැනි දිලීර (*Fusarium*, *Pythium*, *Sclerotium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*)

රෝග ලක්ෂණ :

- පැල මැලවීම හා පත්‍ර කහ පැහැ වීම
- ස්ක්ලෙරෝටියම් දිලීරය ආසාදනය වූ විට සුදු පැහැති දිලීර ජාල සහ බීජාණු කදේ පාදස්ථ කොටසේ ඇති වීම
- අවසානයේ මුල් කුණුවී ශාකය මැරී යාම



පිටිපුස් රෝගය Powdery mildew

රෝග කාරකය :

ඔයිඩියෝප්සිස් දිලිර විශේෂය

(*Oidiopsis sicula*)

රෝග ලක්ෂණ

- කහ පැහැති ලප පත්‍රයේ මතුපිට දක්නට ලැබේ
- පත්‍රයේ යටි පැත්තේ සුදු පැහැති පුස් දක්නට ලැබේ
- ආසාදනය අධික විට පත්‍ර කහ වී හැළී යයි

රෝග පාලනය :

- ජල සම්පාදනයට ප්‍රථම රෝගී ශාක පස් සමග ඉවත් කර විනාශ කිරීම.
- එම ස්ථානය හා අවට පස තෙමී යන පරිදි නිර්දේශිත දිලිර නාශකයක් යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
තිරාම් 80% ඩබ්.පී	70 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 වැ.මී
තයෝෆනේට් මීතයිල් 70% ඩබ්.පී	30 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 වැ.මී
තයෝෆනේට් මීතයිල් 50% + තිරාම් 30 ඩබ්.පී	50 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 වැ.මී



- ජල කළමනාකරණය කිරීම
- බෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම

රෝග පාලනය :

- රෝගය පැතිරී යාමේ අවදානමක් පවතී නම් නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලීටර 10 කට)
තයෝෆනේට් මිනයිල් 70% ඩබ්.පී	10 ග්‍රෑම්
සල්ෆර් 80% ඩබ්.පී	50 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම් ඊ.ලී එස්ටර් සී	30 මි.ලී



හිටු මැරීමේ රෝගය Bacterial Wilt

රෝග කාරකය :

රැල්ස්ටෝනියා විශේෂයේ බැක්ටීරියාවක්
(*Ralstonia* spp)

රෝග ලක්ෂණ :

- පලමුව පැල මලානික වී පසුව ඒවා වියලී මිය යාම
- පැතිරීම සිසුයෙන් සිදුවේ
- සත්‍ය කදේ හරස් කැපුමක් යොදා වතුර විදුරුවකට දැමූවිට කැපුම් පෘෂ්ඨයෙන් සුදු පැහැති බැක්ටීරියා ග්‍රාවය පිටතට එන ආකාරය දැකගත හැක

රෝග පාලනය :

- රෝගී ශාක පස් සමග ඉවත් කිරීම
- රෝගී කේෂ්ත්‍ර හරහා නිරෝගී කේෂ්ත්‍ර වලට ජලය සම්පාදනය නොකිරීම
- ජලය සපයන කාලාන්තරය වැඩි කිරීම
- බෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම
- පාලනය සඳහා රසායනික ප්‍රතිකාර නොමැත

කොළ කොඩිවීමේ වෛරස් රෝගය Chilli Leaf Curl Virus

රෝග කාරකය :

කොළ කොඩිවීමේ වෛරසය

රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍ර කහ වී ප්‍රමානයෙන් කුඩාවීම

- පත්‍ර බෝට්ටුවක ආකාරයට උඩු අතට වක්‍රවීම
- ශාකයේ පුරුක් අතර දුර කෙටි වීම, ශාක කුරු වීම සහ කොඩිවීම

පැතිරීම - සුදු මැස්සා මගින්



රෝග පාලනය :

- රසායනික මර්දන ක්‍රම නොමැත
- වෛරසය පතුරුවන වාහකයා පාලනය කිරීම
- රෝගී ශාක කොටස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කිරීම
- ක්ෂේත්‍රය වල් පැලෑටි වලින් තොරව තබා ගැනීම

පිපිඤ්ඤා විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය Cucumber Mosaic Virus

රෝග කාරකය :

පිපිඤ්ඤා විචිත්‍ර වෛරසය

රෝග ලක්ෂණ :

- ලපටි පත්‍ර වල ලා කොළ කහ පැහැති විචිත්‍ර පැල්ලම් ඇති වීම

- පත්‍ර පටුම් සිහින් වී පර්නාංග ශාකයක ආකාරයක් ගැනීම

පැතිරීම : කුඩිත්තන් ,ශාක යුෂ සහ ගොවි උපකරණ මගින්



රෝග පාලනය :

- රෝගී ලක්ෂණ දුටු වහාම එම ශාක ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක යොදා වාහකයා පාලනය කිරීම
- ධාරක ශාක විනාශ කිරීම
- වෛරසයට පාත්‍ර වන කෙසෙල්, පිපිඤ්ඤා කුළයේ බෝග සහ තක්කාලි වැනි බෝග සමග මිරිස් වගා නොකිරීම

ලොකු ලූන *Allium cepa* L.

පැලෑටිකෘ - Thrips

ත්‍රිප්ස් ටැබැසි *Thrips tabaci* L.

- කහ පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැති මිමි. 1 ක් පමණ දිග කෘමියෙකි.



හානිය :

- මෙම සතුන් ලූනු පත්‍රයේ පටක වලින් යුෂ උරා බොයි.
- එවිට පත්‍රය මත ඇතිවන සුදු පැහැති සලකුණු ඇතිවේ.
- හානිය වඩාත් උග්‍ර වූ විට පත්‍ර ඇඹරී වියළී යයි.
- හානියට පාත්‍ර වූ වගාවන්හි බල්බ කුඩාවී අස්වනු අඩු වේ.
- බිෂ් ලබාගැනීම සඳහා නඩත්තු කරනු ලබන වගාවන්හි මල් වලටද හානි සිදු කරන

කෘෂ්ණ බෝගවල ජෝග, ප්‍රලිබෝධ හා පෝෂක උණුහා හැදෑරා ගැනීමේ අත්පොත

නිසා බිෂ් අස්වැන්න අඩුවන අතර බිෂ්වල පැලවීමේ හැකියාවද අඩුවේ.



හානිය පාලනය :

- උසස් ගුණාත්මයෙන් යුත් බීජ භාවිතා කර නිසි පරිදි තවාන් නඩත්තු කර නිරෝගී දිරිමත් පැළ ලබා ගැනීම
- වගාව නියමිත කාලයට ආරම්භ කිරීම
- යුරියා පොහොර වගාවට අධික ලෙස නොයොදා නිර්දේශිත පොහොර භාවිතය
- විසිරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රම භාවිතය
- වගාව අවට ඇති වල් පැළෑටි ඇතුළු විකල්ප ධාරක ශාක විනාශ කිරීම
- ඇලෙන සුළු කහ පැහැති උගුල් භාවිතය
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක නියමිත ප්‍රමාණ වලින් හා නියමිත කාලාන්තර වලින් යෙදීම

තයක්ලොප්‍රිඩ් එස්ස	24	මිලි 10/ලීටර් 10
ඉම්ඩක්ලොප්‍රිඩ් එස්එල	20	මිලි 10/ ලීටර් 10
තයෝෆනෙට් මිතයිල් 70% ඩබ්.පී		30 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මි
ෆිප්රොනිල් 5 එස්සී		මිලි 10/ ලීටර් 10
ප්‍රොනියෝෆොස් 50 ඊසී	50	මිලි 30/ ලීටර් 10

ලූණ දළඹුවන් - Onion caterpillars

ස්පොඩොප්ටෙරා ලිටියුරා
Spodoptera litura (Fabricius)

- සුහුඹුලා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සලබයෙකි. පූර්ව පියාපත් වල දුඹුරු ඉරි හා ලප

සහිතය.

- අපර පියාපත් සුදු පැහැතිය.
- කිටයා අඳුරු අළු හෝ කළු පැහැයට හුරු
- කොළ පැහැතිය.
- ශරීරයේ පූර්ව කොටසේ කළු පැහැති පටියක් ඇත.
- වැඩුණු කිටයා මිමි. 40-50 දිගය.



ස්පොඩොප්ටෙරා එක්සිගුවා
Spodoptera exigua Hubner

- සුහුඹුලා දුඹුරු පැහැති සලබයෙකි.
- අළුවන් දුඹුරු පැහැ පූර්ව පියාපත් වලින් හා දිළිසෙන සුළු සුදු පැහැති අපර පියාපත් වලින් සමන්විතය.
- ලපටි කිටයින් ලා කොළ පැහැතිය.
- වැඩුණු කිටයින් අඳුරු කොළ පැහැතිය. මිමි. 37-50 දිගය.



හානිය :

- දළඹු විශේෂ දෙකෙහි කීටයින් ලූනු පත්‍ර කොපුව තුලට වී කොළ පැහැති කොටස් කා දමයි.
- ස්පොඩොප්ටෙරා එක්සිගුවා විශේෂයේ දළඹුවන් ලූනු බල්බ වලටද හානි සිදු කරයි.
- බීජ ලබාගැනීම සඳහා නඩත්තු කරනු ලබන වගාවන්හි මල් වලටද හානි සිදු කරයි.



හානිය පාලනය :

- බිත්තර කැඳලි සහිත ශාක කොටස් හා දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම
- බෝග අවශේෂ හා ධාරක ශාක විනාශ කිරීම
- හානිය තිබූ ක්ෂේත්‍ර ජලයෙන් යට කර තැබීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතා කිරීම

ඉමමෙක්ටින් බෙන්සොප්ට් 5 එස්පී	ග්‍රෑම් 4/ ලීටර් 10
ක්ලෝල්ලුප්සියුරෝන් 5 ඊසී	මිලි 10/ ලීටර් 10
ඩයසිනෝන් 50 ඊසී	මිලි 50/ ලීටර් 10
ඩෙල්ටාමෙත්‍රින් 2.5 ඊසී	මිලි 6/ ලීටර් 10
එස්ෆෙන්වලරේට් 7.5 ඊසී	මිලි 3/ ලීටර් 10

ලුණ බල්බ මයිටාවා - Onion bulb mites

රයිසොග්ලයිෆස් විශේෂ
(*Rhizoglyphus* spp.)

- මිලි මීටර් 0.5-0.8 ක් පමණ දිග මිලි මීටර් 0.3 ක් පමණ පළලකින් හා ඕවලාකාර හැඩයකින් යුත්
- කිරි පැහැති සුදු හෝ අවර්ණ ශරීරයක් දරයි.
- පළමු කීට අවධිය පාද තුනක් පමණක් දරණ අතර සුහුඹුල් මයිටාවන් පාද හතරක් දරයි.

හානිය :

- ලුණු පැල අවධියේ සිට බල්බ අවධිය දක්වා සහ ගබඩා අවධියේ දී හානිය දැක ගත හැකිය.
- බොහෝ විට ලුණු බල්බ පාදයට හා ලුණු පැලයේ මුල් වලට හානිය සිදු කරයි.
- මුල් වලට හානි වීම හේතුවෙන් ලුණු පැලයේ පත්‍ර කහ පැහැ වී කඩා වැටේ.
- වර්ධනය බාල වීම නිසා කුරු ශාක ඇති වේ.
- මයිටාවන් විසින් හානි කළ ස්ථාන වලින් දිලීර හා බැක්ටීරියා ආසාදන ඇති වී ද්විතියික කුණු වීමට ලක් වේ.



හානිය පාලනය :

- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- බල්බ මයිටාවන් හට ධාරක නොවන බෝග යක් සමග බෝග මාරුව කිරීම,
- කේෂ්ත්‍රය කන්න කිහිපයක් වගා නොකර අත් හැර දැමීම,
- කේෂ්ත්‍රය ජලයෙන් යට කර තැබීම

තවාන් දියමලන්කෑමේ රෝගය Damping off

රෝග කාරක :

ෆියුසාරියම්, පිතියම්, ස්ක්ලෙරෝටියම්, පයිටොප්තෙරා සහ රයිසොක්ටෝනියා යන දිලීර (*Fusarium*, *Pythium*, *Sclerotium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*)

රෝග ලක්ෂණ :

- බීජ ප්‍රරෝහණය නොවී කුණුවී යයි
- තවානේ තැනින් තැන කුඩා කලාප වශයෙන් පැල මැල වී ඇද වැටේ
- පැලයේ පොළවට ආසන්නයේ පටක වල තෙත් කුණුවීමක් ඇති වේ



රෝග පාලනය

- තවාන් නිසියාකාරව ජීවානුහරණය කිරීම
- බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (බීජ කි.ග්‍රෑම් එකකට)
කැප්ටාන් 50% ඩබ්.පී	6 ග්‍රෑම්
කැප්ටාන් 80% ඩබ්.පී	4 ග්‍රෑම්
තිරාම් 80% ඩබ්.පී	5 ග්‍රෑම්
තයෝෆනේට් මීතයිල් 50% + තිරාම් 30% ඩබ්.පී	4 ග්‍රෑම්

- නියමිත පැල ගහනය පවත්වා ගැනීම
- තවානෙහි වැඩි ගැඹුරකින් බීජ නොදැමීම
- ජල සම්පාදනයට ප්‍රථම රෝගී ශාක පස් සමග ඉවත් කර විනාශ කිරීම
- එම ස්ථානය හා අවට පස තෙමී යන පරිදි නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
තිරාම් 80% ඩබ්.පී	70 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී
තයෝෆනේට් මීතයිල් 50% + තිරාම් 30% ඩබ්.පී	50 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී
තයෝෆනේට් මීතයිල් 70% ඩබ්.පී	30 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී

දිලීර මගින් ඇතිවන බල්බ කුණුවීම - Bulb Rot

රෝග කාරක :

ෆියුසාරියම්, පිතියම්, ස්ක්ලෙරෝටියම්, පයිටොප්තෙරා සහ රයිසොක්ටෝනියා යන දිලීර (*Fusarium*, *Pythium*, *Sclerotium*, *Phytophthora*, *Rhizoctonia*)

රෝග ලක්ෂණ :

- මේරූ පත්‍ර ඉහළ සිට පහළට කහ පාට වේ. පසුව ඇතුළතින් ඇති පත්‍ර ද කහ පැහැ වේ
- මුල් මැරී යයි. බල්බය කුණු වේ
- සත්‍ය කදෙහි සුදු පැහැති දිලීර ජාලයක් දක්නට ලැබේ



රෝග පාලනය :

- නිරෝගී බල්බ භාවිතා කිරීම
- වගා කිරීමට යොදා ගන්නා බල්බ ෫ බීජ පැල දිලීරනාශක ද්‍රාවණයක විනාඩි 30ක් පමණ ගිල්වා තබා ඉන්පසු සිටුවීම

දිලීරනාශකය	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලී 10 කට)
තයෝෆනේට් මීතයිල් 50% + තිරාම් 30% ඩබ්.පී	18 ග්‍රෑම්
තයෝෆනේට් මීතයිල් 70% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
තිරාම් 80% ඩබ්.පී	15 ග්‍රෑම්

- වගාවේ රෝගී ශාක දක්නට ලැබුන විට ජල සම්පාදනයට ප්‍රථම රෝගී ශාක පස් සමග ඉවත් කර විනාශ කිරීම. මල් බාල්දියක් මගින් හෝ නොසලය ගැලවූ ස්ප්‍රේයරයක් මගින් හෝ එම ස්ථානය හා අවට පස තෙමී යන පරිදි දිලීර නාශක යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
තිරාම් 80% ඩබ්.පී	70 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී
තයෝෆනේට් මීතයිල් 50% + තිරාම් 30% ඩබ්.පී	50 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී
තයෝෆනේට් මීතයිල් 70% ඩබ්.පී	30 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී

- වගාවේ ජලවහනය දියුණු කිරීම
- බෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම
- ක්ෂේත්‍රයේ පැල වල වර්ධනය දුර්වල වීමෙන් රෝග වලට පාත්‍රතාවය වැඩි වේ. එබැවින්
- ක්ෂේත්‍ර සනිපාරක්‍ෂාව පවත්වා ගැනීම
- නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය නියමිත කාලය තුළ යෙදීම
- කාබනික පොහොර භාවිතය යන කරුණු වැදගත් වේ

බැක්ටීරියා මගින් ඇති වන බල්බ කුණු වීම

- Bulb rot

රෝග කාරකය :

රැස්ටෝනියා වර්ගයේ බැක්ටීරියා විශේෂයක් (*Ralstonia spp*)

රෝග ලක්ෂණ :

- ප්‍රථමයෙන් ළපටි පත්‍ර කහපැහැ වේ. පසුව මේරු පත්‍ර දක්වා පැතිරේ. බල්බය තුළ තෙත් කුණුවීමක් ඇති වේ
- පස මට්ටමෙන් පත්‍ර කඩා වැටේ
- බල්බය පිටතින් තද කළව්ව ඇතුළත ඇති කුණු වූ කොටස් පහසුවෙන් මිරිකී එළියට එයි
- බල්බ වල ගෙන්දගම් ගදට සමාන දුග්‍රහ වහනය වේ
- දිලීර නිසා ඇතිවන බල්බ කුණුවීමට වඩා වේගයෙන් පැතිරේ



රෝග පාලනය :

- රසායනික ප්‍රතිකාර ක්‍රම නොමැත
- රෝගය සහිත ප්‍රදේශ හඳුනාගෙන අවම වශයෙන් කන්න 2-3 ක් ලූනු වගා නොකළ යුතු අතර රනිල බෝග, ධාන්‍ය බෝග සමඟ බෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම
- ප්‍රවාහනයේදී හා ගබඩාකරනයේදී බල්බ වලට සිදුවන හානිය අවම කිරීම
- වගාවේ රෝගී ශාක දක්නට ලැබුන විට ජල සම්පාදනය කිරීමට ප්‍රථම රෝගී ශාක පස් සමග ඉවත් කිරීම
- රෝගී ශාක තිබූ ස්ථාන වල පස් පෙරලා තද හිරු එළියට නිරාවරනය කරීම
- ගැඹුරට කානු යොදා හොඳින් ජලවහනය වීමට සැලැස්වීම හා වාරි ජලය හැරවීමේ වාර ගණන අඩු කිරීම
- රෝගී වගාවන් හරහා නිරෝගී වගා වෙන ජලය සැපයීමෙන් වැළකීම

දම් පැල්ලම් රෝගය - Purple blotch

රෝග කාරකය :

ඕල්ටනේරියා පෝරි දිලිර විශේෂය
(*Alternaria porii*)

රෝග ලක්ෂණ :

- මුලින්ම පත්‍ර හා මල් නටුව මත කුඩා සුදු පැහැති ලප දක්නට ලැබෙන අතර ක්‍රමයෙන් දුඹුරු පැහැ වී පසුව දම් පැහැවේ
- පරිසරයේ තෙතමනය අධික වීම එම ලප මත දුඹුරු හෝ කළු පැහැති බිජුරු දක්නට ලැබේ
- අවසානයේදී එම පත්‍ර කහපැහැ වී වියළී යයි
- මල් නටුව ආසාදනය වූ විට බීජ නොසෑදී මල් හැකිලී යයි
- ආසාදනයට ලක්වූ ශාක වල බල්බය ද කුණුවේ

පැතිරීම : බීජ ,බෝග අවශේෂ සහ බල්බ මගින්



රෝග පාලනය :

- බෝග අවශේෂ කොටස් ඉවත් කිරීම
- නිරෝගී බීජ/බල්බ භාවිතා කිරීම
- සිටුවීමට පෙර බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (බීජ කි.ග්‍රෑම් එකකට)
කැප්ටාන් 50% ඩබ්.පී	6 ග්‍රෑම්
කැප්ටාන් 80% ඩබ්.පී	4 ග්‍රෑම්
තිරාම් 80 ඩබ්.පී	5 ග්‍රෑම්
තයෝෆනේට් මිනයිල් 50% + තිරාම් 30 ඩබ්.පී	4 ග්‍රෑම්

- රෝගී ලක්ෂණ දක්නට ඇති විට නිර්දේශිත දිලිර නාශක යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලී 10 කට)
ෆ්ලුසිනාම් 500 ග්‍රෑම්/එස්.පී	10 මි.ලී
පයිරක්ලොස්ටොබින් +මෙටිරාම් 60 ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්.පී	30 මි.ලී
මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
ප්‍රොපිනෙබ් 70% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්

පයිරක්ලොස්ට්‍රොබින් 250 ග්‍රෑම්/ ලී ඊ.සී	8 මි.ලී
ටෙබුකොනසෝල් 250 ග්‍රෑම්/ ලී ඊ.ඩබ්	3.5 මි.ලී

- මහ කන්නයේ සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදන වගාවන්, සුදු පොලිතින් ආවරණ මගින් වර්ෂාවෙන් හා රාත්‍රී කාලයේ දී පින්තෙන් ආරක්ෂා කිරීම

- පොලිතින් ආවරණ සැකසීමේදී ආවරණ තුළ තෙත් ගතිය ඇති නොවීමටත් ඉතා හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති වන සේත් ආවරණය මල් වල නොගැවෙන සේත් සකසා ගැනීම

- පොලිතින් ආවරණ යෙදීම අපහසු නම් උදෑසන පිනි සෝදා හැරීම

ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය - Anthracnose

රෝග කාරකය :

කොලෙට්‍රිකම් ග්ලිමස්පොරිමයිඩිස්
(*Colletotrichum gloeosporioides*)

රෝග ලක්ෂණ :

- ප්‍රථමයෙන් පත්‍ර මත සුදු කහ පැහැති ගිලුනු ලප ඇති වේ
- එම දිලීර ලප මත දිලීර බීජානු කේන්ද්‍රික වලයන් ලෙස ඇසිරී පවතී
- පත්‍ර කහ වී දඟර ගැසී ශාකයේ ගෙල ප්‍රදේශයෙන් කඩා වැටේ
- සත්‍ය බීජ නිෂ්පාදන වගාවන්ගේ නම්, මල් නටු මත දිලීර පැල්ලම් ඇති වූ විට එම ස්ථානයෙන් මල් නටුව කැඩී යයි
- පුෂ්පිකා වලට ආසාදනය වූ විට ඒවා වියළී යයි

- බල්බ කුඩාවී කුණු වීම සිදුවේ



රෝග පාලනය :

- රෝගය වැළඳුනු ඉඩම් වල අවු 2-3 ක් තෙක් රනිල හෝ ධාන්‍ය සමග බෝග මාරුව
- නිරෝගී මව් බල්බ තෝරා ගැනීම
- හොඳින් බිම් සකස් කර කානු සකසා වැඩි ජලය බැස යාමට හැකි වන සේ පාත්ති සැකසීම
- ආසාදිත කොටස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කර විනාශ කිරීම
- රෝගී ලක්ෂණ දක්නට ඇති විට නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලී 10 කට)
තයෝගනේට් මිනයිල් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්ග සී	8 මි.ලී
තයෝගනේට් මිනයිල් 70% ඩබ්.ජී	6 ග්‍රෑම්
ෆ්ලුසිනාම් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්.සී	10 මි.ලී
පයිරක්ලොස්ටොබින් +මෙටිරාම් 60 ඩබ්.ජී	20 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්. සී	30 මි.ලී
මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්

සැයු: සංස්ථානික දිලීර නාශක දිගින් දිගටම භාවිතා කිරීමෙන් දිලීර විසින් එම දිලීර නාශක සඳහා ප්‍රතිරෝධීතාවක් ගොඩනගා ගැනීමට හැකි බැවින් සංස්ථානික දිලීර නාශකයක් සහ ස්පර්ශක දිලීර නාශකයක් මාරුවෙන් මාරුවට යොදන්න.

බඩඉරිඟු *Zea mays* L.

පුරක් පණුවා Stem borer

කසිලෝ පාර්ටිලස්

Chilo partellus (Swinhoe)

- සුහුඹුලා පිදුරු පැහැති සලබයෙකි.
- සුහුඹුල් ගැහැනු සතා සුදු පැහැති පැහැති ඕවලාකාර ශල්ක ආකාර බිත්තර පත්‍රයේ මැද නාරටිය අසල පේළි වශයෙන් තැන්පත් කරයි.
- ලපටි කීටයන් ලා කහ පැහැතිය. පෘෂ්ඨීයව කළු පැහැති ලප සහිතයි.
- වැඩුනු කීටයින් මිමී 20-25 ක් පමණ දිගැතිය.
- පිලා අවධිය කඳ තුළ ගත කරයි.



හානිය :

- බෝගය සිටුවා සති 3-4 සිට කරල් මෝරන අවධිය තෙක් වගාවේ ඕනෑම අවස්ථාවක හානිය ඇති විය හැකිය.
- මුල් හැරුණු විට අනෙකුත් සියළුම කොටස් වලට කීටයා හානි සිදු කරයි.
- ලපටි කීටයින් පත්‍ර වලට හානි කිරීම නිසා

ලපටි පැළවල පත්‍ර මත පේළියට පිහිටා ඇති කුඩා සිදුරු දක්නට ලැබේ.

- වැඩුණු කීටයින් පැළවල වර්ධක ස්ථානයට හානි කිරීම නිසා ගොබය මැරී ගොස් මල හදවත නම් තත්වය ඇති වේ.
- හානියට පාත්‍ර වූ පැළවල වර්ධනය අඩුවන අතර පහසුවෙන් ඇද වැටීමට පාත්‍ර වේ.
- කරල් වලට හානි කිරීම නිසා බීජ විනාශ වේ.





හානිය පාලනය :

- මහ කන්නයේ වර්ෂාවත් සමඟ බෝගය කේන්ද්‍රයේ සිටුවීම
 - අස්වැන්න නෙලූ පසු ඉපනැල්ල විනාශ කිරීම
 - නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය
- සිටුවා සති 3 හා 5 දී ගොබය තුලට යෙදීමට නිර්දේශිත කෘමිනාශක



ඩයසිනෝන් 5% ජ්ආර්	හෙක්. කිලෝ ග්‍රෑම් 10-15
ෆිප්රොනිල් 0.3% ජ්ආර්	හෙක්. කිලෝ ග්‍රෑම් 12

සිටුවා දින 25-35 ක් හා දින 45-55 කින් පත්‍රවලට යෙදීමට නිර්දේශිත කෘමිනාශක

නොවලිසුරෝන් 10 ඊසි	මිලි 10/ ලීටර් 10
එතොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 10 ඊසි	මිලි 15/ ලීටර් 10
තයෝඩිකාඩි 375 එස්සි	මිලි 20/ ලීටර් 10



කරල් විදින දළඹුවා - Cob borer

හෙලිකොවර්පා ආමිජෙරා

Helicoverpa armigera (Hubner)

- සුහුඹුල් සහා දුඹුරු පැහැති සලබයෙකි.
- පියාපත් විහිදා සිටින විට මිමි. 40 ක් පමණ විශාලය.
- ගැහැනු සහා විසින් පුෂ්ප හා කරල් මත බිත්තර දමනු ලැබේ.

- වැඩුනු කීටයින් මිමි. 40-50 ක් පමණ දිගැතිය. පාර්ශ්විකව ලා සහ තද පැහැති ඉරි
- වලින් සමන්විතය.
- පිලා අවධිය පසෙහි ගත කරයි.



හානිය :

- කීටයින් විසින් කරල් වලට හානි කර බීජ කා දැමීම සිදු කරයි.

හානිය පාලනය :

- දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම
- හානිකල ශාක කොටස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත්කර දැමීම
- සිටුවා දින 25-35 ක් හා දින 45-55 කින් නිර්දේශිත කාමිනාශක පත්‍රවලට යෙදීම

නොවලියුරෝන් 10 ඊසි	මිලි 10/ ලීටර්10
එතොෆෙත්ප්‍රොක්ස් 10 ඊසි	මිලි 15/ ලීටර්10
තයෝඩිකාබි 375 එස්සි.	මිලි 20/ ලීටර්10

කුඩින්තා - Aphid

රොපැලොසිපම් මේඩිස්


Rhopalosiphum maidis (Fitch)

- කොළ පැහැයට හුරු නිල් පැහැති කුඩා කෘමියෙකි.
- ශරීරය මි.මී. 2 ක් පමණ දිගය. මෙම සතුන් සනාථාස ලෙස ජීවත් වේ.



හානිය :

- පත්‍ර වලින් යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර කහ පැහැ වේ.
- මෙම සතුන් බහිෂ්‍යවය කරන ඇලෙන සුළු ද්‍රව්‍ය මත ද්විතියිකව දිලීර වර්ධනය වීම නිසා කළු පැහැයට හැරේ.
- ශාකයේ වර්ධනය අඩු වී අස්වැන්න අඩු වේ.
- පුමංගී මල් වලට හානි කිරීම නිසා පරාග විසිරීමට බාධා ඇතිවේ.



හානිය පාලනය :

- අස්වැන්න නෙලූ පසු ඉතිරි ශාක කොටස් විනාශ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 10/ ලීටර් 10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ලිව්	ග්‍රෑම් 1.25/ලීටර් 10
නයමෙතොක්සාම් 25% ඩබ්ලිව්	ග්‍රෑම් 3/ ලීටර් 10

ඛඩ්දුරිඟු ගුල්ලා - Maize weevil

සයිටොපිලස් සියාමේස්

Sitophilus zeamais (Motschulsky)

- සුහුඹුලා මි.මි. 3-4 ක් පමණ දිගැතිය. දුඹුරු පැහැතිය.
- සුදු පැහැති බිත්තර බිජය තුළ තැන්පත් කරයි.
- කිටයා අඳුරු සුදු පැහැතිය. මි.මි. 4 ක් පමණ දිගය.
- පිලා අවධිය බිජය තුළ ගත කරයි.



හානිය :

- හානිකළ බිජ වල අක්රමවත් සිදුරු දක්නට ලැබේ.



හානිය පාලනය :

- නියමිත ප්‍රමිතියට බිජ වියළා පොලිතින් මලුවල ගබඩා කිරීම
- කොහොඹ, ගම්මිරිස් හෝ මී තෙල් බිජ සමඟ මිශ්‍ර කිරීම
- කොහොඹ, ගම්මිරිස්, පැහිරි ආදියේ පත්‍ර බිජ සමඟ මිශ්‍ර කිරීම
- අළු සමඟ බිජ මිශ්‍ර කිරීම
- බිජ ගබඩා කරන ස්ථාන පිරිසිදුව තබා ගැනීම
- පිරිමිඟොස් මිනයිල් 50ට්සි දියර මිලි. 25 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දියකර ගෝනි මලුවලට ඉස බිජ ගබඩා කිරීම
- මහා පරිමාණ වශයෙන් බිජ නිෂ්පාදනය සිදු කිරීමේදී ඟොස්ටොක්සින් යොදා ධූමායනය කර ගැනීම

හෙල්මින්තස්පෝරියම් පත්‍ර පුල්ලි රෝගය

Helminthosporium leaf spot

රෝග කාරකය :

හෙල්මින්තස්පෝරියම් ඔරයිසේ

(*Helminthosporium oryzae*) දිලීර විශේෂය

රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍ර දාරය රතු පැහැයක් ගැනීම
- පත්‍ර මත දිගටි දුඹුරු පුල්ලි ඇති වීම



රෝග පාලනය :

- ජලවහනය දියුණු කිරීම
- නියමිත පැල ගහනය පවත්වා ගැනීම
- රෝගී ශාක කොටස් විනාශ කිරීම



පත්‍ර හා කොපු කුණවීම Banded leaf and sheath blight

රෝග කාරකය :

රයිසොක්ටෝනියා (*Rhizoctonia*) දිලීර
විශේෂ

රෝග ලක්ෂණ :

- දිගටි අණ්ඩාකාර අළුවන් කොළ පාට පුල්ලි පත්‍රයේ හෝ කොපුවල ඇතිවීම
- පසුව පැල්ලම් පැතිරී යාම හා කළු දුඹුරු පාට ස්ක්ලෙරෝමියා අඛ ඇට වැනි ව්‍යුහ ලෙස දක්නට ලැබීම



රෝග පාලනය :

- වසුන් යෙදීම
- නියමිත පැල ගහනය පවත්වා ගැනීම
- නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය යෙදීම

සදර්න් මලකඩ රෝගය Southern Rust

රෝග කාරකය :

පක්ෂිනියා පොලිසෝරා (*Puccinia polysora*) දිලීර විශේෂය

රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍ර පත්‍ර කොපුව කඳ හා කරල් වල කොපු වල කුඩා රවුම් දිස්නමත් තැඹිලි පැහැයට හුරු බිබිලි ඇති වීම
- පසුව මෙම බිබිලි පුපුරා තැඹිලි පැහැ බිජානු පිටතට විසිරීම
- භානිය අධිකවිට පත්‍ර වියලී පත්‍ර හා පත්‍ර කොපු වියලී ශාකය මැරී යාම



පීසොඩර්මා දුඹුරු පුල්ලි රෝගය **Physoderma brown spot**

රෝග කාරක :

පීසොඩර්මා මෙයිඩිස් :ජයතිදායුරප් ප්‍රිනාසි*
දිලීර විශේෂය

රෝග ලක්ෂණ :

- පළමුව පත්‍ර තලයේ කහ පැහැති කුඩා ලප ඇතිවීම
- පත්‍ර මැද නාරටිවල රවුම් ලප වොක්ලට් දුඹුරු පැහැවීම
- හානිය අධිකවිට ආසාදිත ස්ථාන වලින් කුණුටි කඩා වැටීම



රෝග පාලනය :

- කන්නයට වගා කිරීම
- රසායනික මර්දන ක්‍රම ආර්ථිකව අවාසිදායකය



රෝග පාලනය :

- බෝග අවශේෂ කොටස් විනාශ කිරීම
- බෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම

බැක්ටීරියා කඳ කුණුවීම

Erwinia stalk rot

රෝග කාරකය :

අර්වින්යා (*Erwinia* spp) බැක්ටීරියාව

රෝග ලක්ෂණ :

- පසට ආසන්නයේ අන්තර් නාරටිය තද දුඹුරු පැහැයක් ගැනීම
- තෙත් කුණුවීමක් පාමුල දක්නට ලැබීම
- කඳ හා කරල කුණු වී කඩා වැටීම
- පාමුලින් ලාක්ෂණික ගන්ධයක් දැනීම



රෝග පාලනය :

- රෝගී ශාක පස් සමග ඉවත් කිරීම
- රෝගී ප්‍රදේශ හරහා නිරෝගී කේෂ්ත්‍ර වලට ජල සම්පාදනය නොකිරීම
- බෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම

නොදර්න් පත්‍ර අංගමාරය

Northern Leaf Blight

රෝග කාරකය :

හෙල්මින්තස්පෝරියම් ටර්කිකම් (*Helminthosporium turcicum*) දිලීර විශේෂය

රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍ර මත දිගටි අළු පැහැති පුල්ලි ඇතිවීම
- හානිය අධික වීට ලප එකතු වී පත්‍රය වියළී යාම
- ලප මත කළු පැහැති බීජානු දක්නට ලැබීම





පැතිරීම : සුදු මැස්සා

රෝග පාලනය

- ජලවහනය දියුණු කිරීම
- නියමිත පැල ගහනය පවත්වා ගැනීම
- රෝගී ශාක කොටස් විනාශ කිරීම

කුරක්කන්

Eleusine coracana (L.) Gaertn

පුරක් පණුවා Stem borer

කසිලෝ පාර්ටිලස් Chilo partellus
(Swinhoe)

- සුහුඹුල් සතා සලබයකු වන අතර පිදුරු පැහැතිය.
- ගැහැණු සලබයා පත්‍ර මත සුදු පැහැති ශල්ක ආකාර බිත්තර තැන්පත් කරයි.
- බිත්තර පුපුරා පිටවන ලපටි කීටයින් ලා කහ පැහැතිය. පෘෂ්ඨියව කළු පැහැති ලප සහිතයි.
- වැඩුනු කීටයින් මිමි. 20-25 ක් පමණ දිගැතිය.
- පිලා අවධිය කඳ තුළ ගත කරයි.



හානිය :

- බෝගයේ පැල අවධියේ සිට කරල් මෝරන අවධිය තෙක් වගාවේ ඕනෑම අවස්ථාවක මෙම හානිය ඇති විය හැකිය.
- කීටයින් විසින් කඳට හානි කිරීම නිසා ගොබය මැරී ගොස් මල හඳවන තත්වය ඇති වේ.
- ශාක පහසුවෙන් ඇද වැටීමට පාත්‍ර වේ.
- හානියට පාත්‍ර වූ පැලවල වර්ධනය අඩු වේ.
- කරල් වලට හානි කිරීම නිසා කරල් වියළී

සුදු කරල් ඇති වේ. එම නිසා බීජ හට නොගනී.



හානිය පාලනය :

- ධාන්‍ය කුලයට අයත් නොවන බෝග (උදා: රනිල බෝග) සමඟ බෝග මාරුව
- නයිට්‍රජන් අඩංගු පොහොර නිර්දේශිත ප්‍රමාණයට භාවිතා කිරීම
- හානි වූ ශාක කොටස්, මුල් අවධියේදීම ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කර විනාශ කිරීම
- අස්වනු නෙලීමේදී පසට ආසන්නයෙන්ම ශාක කැපීමෙන් කීට හා පිලා අවධි විනාශ කිරීම
- අස්වනු නෙලූ විගස ක්ෂේත්‍රයේ පස පෙරලීමෙන් ඉතිරි වී ඇති ශාක කොටස් මත කීට හා පිලා අවධි වර්ධනය වීම වැළැක්වීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක සිටුවා දින 25-35 ක් හා දින 45-55 කින් පත්‍රවලට යෙදීම

නොවලියුරෝන් 10 ඊසි	මිලි 10/ ලීටර් 10
එතොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 10 ඊසි	මිලි 15/ ලීටර් 10
තයෝඩිකාබ් 375 එස්සි	මිලි 20/ ලීටර් 10

කුඩින්තා - Aphid

රොපැලොසිපම් මේඩිස් Rhopalosiphum maidis (Fitch)

- නිල් පැහැයට හුරු කොළ පැහැති කුඩා කෘමියෙකි.



හානිය :

- පත්‍ර වලින් හා කරල් වලින් යුෂ උරා බීම සිදු කරයි.
- පත්‍ර කහ පැහැයට හැරේ.
- හානිය උග්‍ර වූ විට ශාකයේ වර්ධනය බාල වේ.

හානිය පාලනය :

- අස්වැන්න නෙලූ පසු ඉතිරි ශාක කොටස් විනාශ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 10/ ලීටර් 10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ලි	ග්‍රෑම් 1.25/ ලීටර් 10
තයමෙතොක්සාම් 25% ඩබ්ලි	ග්‍රෑම් 3/ ලීටර් 10

කොළ පාඵ රෝගය Leaf Blast

රෝග කාරකය :

මැග්නොපොර්තේ ග්‍රිසියේ (Magnaporthe grisea) දිලීර විශේෂය



රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍ර මත තර්කු ආකාර ප්‍රමාණයෙන් අසමාන අළුවත් කොළ පැහැති මධ්‍යකින් හා කහ පැහැති දාරයකින් වටවී ඇති ලප ඇතිවීම
- පසුව මධ්‍යය සුදු පැහැයට හැරීම
- කරලෙහි ගෙල හා ඇඟිලි හානිවූ විට එම ස්ථාන කළු පැහැ වී කඩා වැටීම (ගෙල කුණුවීම)
- බීජ බොල් වීම



රෝග පාලනය

- රෝගයට ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද වගා කිරීම - ඕෂධ (මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිරෝධී)
- නියමිත පැල ගහනය පවත්වා ගැනීම
- නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය යෙදීම
- බෝග අවශේෂ කොටස් විනාශ කිරීම

රනිල බෝග

කවිචි (*Vigna unguiculata* (L.) Walp

මුං (*Vigna radiata* (L.) Wilczek

උඳ (*Vigna mungo* (L.) Hepper

සෝයා බෝංචි (*Glycine max* (L.)

Merr.

පැල අවධියේදී හානිකරන පළමුවැන්න

බෝංචි මැස්සා - Bean fly

ඔෆියමියා ෆේසිමලයි *Ophiomyia phaseoli* (Tryon)

- මි.මි. 2 ක් පමණ දිග දිළිසෙන සුළු කළු පැහැති මැස්සෙකි. සුහුඹුල් සතුන් බිත්තර තනි වශයෙන් ලපටි පත්‍ර මත තටුවට ආසන්නව තැන්පත් කරයි.

- කීටයා සුදු පැහැතිය. පාද රහිතය. කීටයා පොලවට ආසන්නව කඳෙහි කෝෂ ගත වේ.

- පිලවා තද දුඹුරු පැහැතිය.



හානිය :

- පැල අවධියේදී හානි සිදු කරයි.

- කඳේ සනාල පටක වලට හානි සිදු වීම නිසා ශාකයට ආහාර හා ජලය ගමන් කිරීමට බාධා පැමිණේ. ඒ හේතුවෙන් ශාකය මැල වී පසුව කහපාට වී මැරී යයි.



බිත්තර දැමූ ස්ථාන

පාදයට ප්‍රදේශයේ ඉදිමම් සහිත ස්ථාන

හානිය පාලනය :

- වගාව නියමිත කාලයට කේන්ද්‍රයේ පිහිටුවීම
- යල කන්නයේදී මෙම හානිය අධික බැවින් වගාව නියමිත කාලයට (අප්‍රේල් මුල) කේන්ද්‍රයේ පිහිටුවීම
- බෝග අවශේෂ හා ධාරක ශාක විනාශ කිරීම
- බීජ ප්‍රතිකාරක භාවිතය
- බීජ ප්‍රතිකාරකයක් ලෙස තයමෙනොක්සාම් 70% ඩබ්එස් ග්‍රෑම් 15 ක් ජලය මිලි. 20-30 ක දිය කර බීජ කිලෝ ග්‍රෑම් 10 ක් සඳහා යෙදීම
- නිර්දේශිත කාමි නාශක යෙදීම

ඩයසිනෝන් 50 ඊසී	මිලි 40/ලීටර් 10
කාබොසල්ෆාන් 20 එස්සී	මිලි 30/ලීටර් 10

මල් පිපීමට පෙර අවධියේ හානිකරන පලිබෝධකයින්

කුඩින්තා - Aphid

ඒපිස් ක්‍රැක්සිවෝරා Aphis craccivora Koch

- මි.මි. 2 ක් පමණ දිග කළු පැහැති සතුන් වේ.



හානිය :

- ශාක කඳ, මල් හා කරල් වලින් යුෂ උරා බීම නිසා ශාක මැල වී පත්‍ර කහපාට වේ.
- කවිපි පත්‍ර විවිත්‍ර වෛරස් රෝගය පතුරුවා හරින රෝග වාහකයා ලෙසද ක්‍රියා කරයි.



හානිය පාලනය :

- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 10/ ලීටර් 10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්පී	ග්‍රෑම් 1.25/ලීටර් 10
තයමෙනොක්සාම් 25% ඩබ්පී	ග්‍රෑම් 3/ලීටර් 10



හානිය පාලනය :

- වල් පැළෑටි ඇතුළු අනෙකුත් ධාරක ශාක විනාශ කිරීම

- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

සුදු මැස්සා - Whitefly

බෙමිසියා ටැබැසි Bemisia tabaci
(Gennadius)

- මි.මි. 1 ක් පමණ දිග සුදු පැහැති ඉතා කුඩා කෘමියෙකි.



හානිය :

- සුහුඹුලන් හා ශිශුවන් පත්‍ර වලින් යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර කහ පැහැ වී මැලවී යයි.

- මුං පත්‍ර විචිත්‍ර වෛරස් රෝගයේ වහකයා වේ.

ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 10/ලීටර්10
ඉමිඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්පී	ග්‍රෑම් 1.5/ලීටර් 10
තයමෙනොක්සාම් 25% ඩබ්පී	ග්‍රෑම් 5/ ලීටර් 10
ඇසිටැමිප්‍රිඩ් 20% එස්පී	ග්‍රෑම් 10/ලීටර් 10

පත්‍ර කීඩෑව - Leaf hoppers

ඇම්රස්කා ඩිවස්ටන්ස් Amrasca
devastans (Distant)

- සුහුඹුලා මිමි. 2.5 ක් පමණ විශාල ලා කොළ පැහැති සිහින් කෘමියෙකි.

- සුහුඹුල් සතුන් පත්‍ර වල යටි පැත්තේ හෝ පත්‍ර වෘත්තයේ බිත්තර තැන්පත් කරයි.

- බිත්තර වලින් පිටවන ශිශුවන් කහ පැහැ-
යට හුරු කොළ පැහැයක් ගන්නා අතර
අපර පියාපත් වල කළු පැහැති ලප දෙකක්

දක්නට ලැබේ.



හානිය :

- පත්‍ර වල යටි පැත්තේ සිට යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර දාර කහ පැහැ වේ.
- පසුව පත්‍ර දාරය රැලි වීම සිදු වේ.
- හානිය උග්‍ර වූ විට පත්‍ර දාර පිළිස්සී වියළී ශාක කුරුවී යාම සිදු වේ.

හානිය පාලනය :

- නියමිත පැළ ගහනයක් පවත්වා ගැනීම
- නිර්දේශිත ප්‍රමාණයට පොහොර භාවිතය
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඇසිටැම්ප්‍රිඩ් 20% එස්පී	ග්‍රෑම් 10/ ලීටර් 10
ඇසිලෝට් 75% එස්පී	ග්‍රෑම් 10/ ලීටර් 10

රතු මයිටාවා - Red mites

ටෙට්‍රානිචස් විශේෂ *Tetranychus* spp.

- ඉතා කුඩා, රතු පැහැති ඕවලාකාර සතුන් වේ



හානිය :

- පත්‍ර වල යටි පැත්තේ සමූහ වශයෙන් සිට යුෂ උරා බොයි.
- හානි වූ පත්‍ර රැලි වීම හා කහ වීම සිදු වේ.



හානිය පාලනය :

- නිර්දේශිත මයිටානාශක භාවිතය

සල්ෆර් 80% ඩබ්පී	ග්‍රෑම් 80/ ලීටර් 10
හෙක්සිනයොසොක්ස් 10% ඩබ්පී	ග්‍රෑම් 5/ ලීටර් 10
ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී	මිලි 6 / ලීටර් 10

පත්‍ර කහින්නා - Leaf miner

ලිරියොමයිසා විශේෂ *Liriomyza* spp.

- මි.මී. 1.5 ක් පමණ දිග කළු කහ පැහැති මැස්සෙකි සුහුඹුල් ගැහැණු සතා පත්‍ර සිදුරු කර සුදු පැහැති බිත්තර දමයි.
- කිටයා කහ පැහැතිය.
- ඉතා කුඩාය.
- පිලවා මි.මී. 2 ක් පමණ දිගැතිය. කහ පැහැයට හුරු තැඹිලි පැහැතිය.



හානිය :

- කිටයා පත්‍රයේ සර්පිලාකාර කැණීම් සාදයි.
- හානිය උග්‍ර වූ විට පත්‍ර කහ පැහැ වී වැටී යයි.



හානිය පාලනය :

- බෝග අවශේෂ විනාශ කිරීම
- කහ පැහැති ඇලෙන සුළු උගුල් භාවිතය
- පත්‍ර සේදී යන ආකාරයට ජල සම්පාදනය කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඇබමෙක්ටින් 1.8 ඊසී	මිලි 6/ ලීටර් 10
සයිරොමයිසින් 75% ඩබ්ලී	ග්‍රෑම් 30/ ලීටර් 10
ඇසඩ්.ක්ටින් 5 එස්එල්	මිලි 20/ ලීටර් 10

පැල මැස්කන් - Thrips

මැගලුරොත්‍රිප්ස් ජොස්ටෙඩ්ට්

Megalurothrips sjostedti

ෆ්‍රැන්කිනෙල්ලා ෂුල්ට්සි *Frankiniella schultzei* (Trybom)

- *Megalurothrips jostedti* විශේෂයේ සතුන් කළු පැහැ වන අතර *Frankiniella schultzei* විශේෂයේ සතුන් ලා කහ පැහැතිය.
- සුහුඹුල් සතුන් මි.මී. 1 ක් පමණ විශාලය.



හානිය :

- සුහුඹුලන් හා ශිශුවන් පත්‍ර සුරා යුෂ උරා බිම සිදු කරයි.
- හානි කළ පත්‍ර මත ලා දුඹුරු ලප ඇති වී පසුව රළු වී වියළී යයි.
- හානි කළ පුෂ්ප අංකුර දුඹුරු පැහැයට හැරී වැටී යයි.
- හානි කළ පුෂ්ප විකෘති වී දුර්වර්ණ වී වැටී යයි.



හානිය පාලනය :

- වගාව නියමිත කාලයට ආරම්භ කිරීම වියළි කලාපයේ යලි කන්නයේ නම් අප්‍රේල් මස වන විට වගාව කේෂ්ත්‍රයේ පිහිටුවිය යුතුයි.
- නිර්දේශිත පොහොර භාවිතය
- විසිරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රම භාවිතය
- ඇලෙන සුළු කහ පැහැති උගුල් භාවිතය
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඉම්ඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි. 10/ලීටර් 10
ඉම්ඩක්ලොප්‍රිඩ් 70% ඩබ්ලි	ග්‍රෑම් 1.25/ලීටර් 10
තයමෙතොක්සාම් 25% ඩබ්ලි	ග්‍රෑම් 5/ලීටර් 10
ෆිප්රොනිල් 50 එස්සී	මිලි. 10/ලීටර් 10

මල් හටගන්නා අවධියේ සිට කරල් පිරෙන අවධිය දක්වා හානිකරන පලිබෝධකයින්

බිබිලි කුරුමිණියා - Blister beetle

මිලාබ්රිස් විශේෂ *Mylabris* spp.

- මිමි. 25 ක් පමණ දික් වූ පටු ශරීරයක් සහිත කුරුමිණි විශේෂයකි.
- පියාපත් මත කළු, රතු හෝ කළු කහ පැහැති පටි සහිතයි.



හානිය :

- මල් ආහාරයට ගැනීමෙන් වගාවට හානි පමුණුවයි.
- කරල් සංඛ්‍යාව අඩු වී අස්වැන්න අඩුවේ.

හානිය පාලනය :

- කුරුමිණියන් අතංගුවකින් එකතු කර විනාශ කිරීම

කරල් විදින මකුණන් Pod sucking bugs

Nezara viridula (L.)

- මිමි. 15 ක් පමණ දිග කොළ පැහැති මකුණන්



Anaplocnemis phasiana (F.)

- මිමි. 30 ක් පමණ දිග තද කළු හෝ දුඹුරු පැහැති මකුණන්



Riptortus pedestris (Fabricius)

- මිමි. 18 ක් පමණ දිග දුඹුරු පැහැති මකුණන්



Clavigralla gibbosa (Spinola)

- අළු පැහැති මකුණන් රනිල බෝග වලට හානි කරයි.



හානිය :

- ශිශුවන් හා සුහුඹුලන් විසින් කරල් තුළ තිබෙන බීජ වලින් යුෂ උරා බීම නිසා කරල් වල අඳුරු පැහැති ලප ඇතිවේ.
- කරල් තුළ තිබෙන බීජ හැකිලී දුර්වර්ණ වී යයි.
- බීජ වල ගුණාත්මය අඩු වී පරිභෝජනයට නුසුදුසු තත්ත්වයට පත් වේ. බීජ වල ප්‍රරෝහණ ශක්තියද අඩු වී යයි.



කරල් විදින දළඹුවන් - Pod borers

මරුකා විට්‍රාටා *Maruca vitrata* (Fabricius)

- සුහුඹුලා දුඹුරු පැහැති සලබයෙක් වන අතර පියාපත් දිගහැරිය විට මිමි. 25 ක් පමණ විශාලය.
- සුරුව පියාපත් වල විනිවිද පෙනෙන සුළු ලප දක්නට ඇත.
- සුදු පැහැති විනිවිද පෙනෙන බිත්තර තනි තනිව මල් මත හෝ දළු මත දමයි.
- කීටයා කහ පැහැයට හුරු සුදු පැහැයක් ගන්නා අතර පෘෂ්ඨීයව කළු පැහැති තිත්

පේලි දෙකක් පිහිටා ඇත.

- හොඳින් වැඩුණු කීටයා මිමි. 16 ක් පමණ දිගය.
- පිලා අවස්ථාව කරල තුල හෝ පසෙහි ගතකරයි.




හානිය :

- කීටයා පත්‍ර අංකුර හා මල් එකතු කර දැලක් මෙන් සාදා එය තුළට වී ශාක කොටස් කා දමයි.
- කරල් වලටද හානි සිදු කරයි.



හෙලිකොවර්පා ආම්පේරා *Helicoverpa armigera* (Hubner)

- සුහුඹුලා දුඹුරු පැහැති සලබයෙකි.
- මිමි. 40-50 ක් පමණ දිග කිටයා විවිධ වර්ණ ගනී.
- පාර්ශ්විකව ලා සහ තද පැහැති ඉරි වලින් සමන්විතය.
- පිලා අවධිය පස කුල ගත කරයි.



හානිය :

මෙම දළඹුවන් පත්‍ර, අංකුර, මල් හා කරල් ආහාරයට ගනී.

ලැම්පිඩස් බොළටිකස් *Lampides boeticus* (L.)

- සුහුඹුලා නිල් පැහැති සමනලයෙකි.
- කිටයා මිමි. 12 ක් පමණ දිග,කොළ පැහැති ඕවලාකාර පැහැලි සතෙකි.



හානිය :

- කිටයා විසින් පත්‍ර, අංකුර, මල් හා කරල් ආහාරයට ගනී.

හානිය පාලනය :

- කීටයින් එකතු කර විනාශ කිරීම
- හානි කළ කරල් හා ශාක කොටස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත පැල පරතර පවත්වා ගැනීම
- ක්ෂේත්‍රය සැකසීමේ දී පස හොඳින් පෙරලීම
- මහ කන්නයේ වගාව කල් ඇතිව ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතා කිරීම

ක්ලෝප්ලුඑසියුරෝන් 5 ඊසී	මිලි 10/ ලීටර් 10
තයෝඩිකාබ් 375 එස්සී	මිලි 20/ ලීටර් 10
එතොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 10 ඊසී	මිලි 15/ ලීටර් 10
නොවලියුරෝන් 10 ඊසී.	මිලි 10/ ලීටර් 10

ගබඩා අවධියේ හානිකරන ප්‍රමෝදකයින්

රනිල ගුල්ලා Cowpea weevil

කැලසොබ්‍රචස් විශේෂ *Callosobruchus* spp

- මි.මී. 3 ක් පමණ දිග සුහුඹුල් සකා දුඹුරු පැහැති කුරුමිණියෙකි.
- කීටයා සුදු පැහැතිය.
- පිලා අවධිය බීජය තුළ ගතකර ඉන් ඇතිවන සුහුඹුලත් බීජයේ රවුම් සිදුරු සාදා පිටවී යයි.



හානිය :

- බීජ ගබඩා කර තැබූ විට මෙම සතුන් සැලකිය යුතු හානියක් සිදු කරයි.
- සුහුඹුලා බීජ වල පිටපැත්තේ සුදු පැහැති බිත්තර තැන්පත් කරන අතර ඉන් ඇතිවන කීටයින් බීජයේ ඇතුළත කොටස් ආහාරයට ගනී.
- ප්‍රමාදවී අස්වනු නෙලීමේදී රනිල ගුල්ලාගේ හානිය ක්ෂේත්‍රයේදීම සුළු වශයෙන් ඇති විය හැකිය.
- බීජ මත ඇති සුදු පැහැති බිත්තර වලින් හා රවුම් සිදුරු වලින් හානිය හඳුනා ගත හැකිය.



හානිය පාලනය :

- නියමිත අවස්ථාවේදීම අස්වනු නෙළීම
- නියමිත ප්‍රමිතියට බීජ වියළා පොලිතින් මලුවල ගබඩා කිරීම
- කොහොඹ, ගම්මිරිස් හෝ මීනෙල් බීජ සමඟ මිශ්‍ර කිරීම
- කොහොඹ, ගම්මිරිස්, පැහැරි ආදියේ පත්‍ර බීජ සමඟ මිශ්‍ර කිරීම
- අඤ්ඤ සමඟ බීජ මිශ්‍ර කිරීම
- පිරිමිඟොස් මිනයිල් 50෮සී දියර මිලි. 25 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දියකර ගෝනි මලුවලට ඉස බීජ ගබඩා කිරීම
- මහා පරිමාණ වශයෙන් බීජ නිෂ්පාදනය සිදු කිරීමේදී ඟොස්ටොක්සින් යොදා ධූමායනය කර ගැනීම



**පත්‍ර පුල්ලි රෝගය
Cercospora leaf spot**

රෝග කාරකය :

සර්කොස්පෝරා කැනෙසන්ස් (*Cercospora canescens*) හා සර්කොස්පෝරා කැළුන්ටා (*Cercospora cruenta*) දිලීර විශේෂ

රෝග ලක්ෂණ :

- සර්කොස්පෝරා කැනෙසන්ස් මගින් හටගත් විට අක්‍රමවත් රතු පැහැති ලප පත්‍රය යට ඇති වීම
- සර්කොස්පෝරා කැළුන්ටා මගින් හටගත් විට පලමුව හරිතක්ෂීය ලප ඇති වී පසුව දුඹුරු වර්ණයක් ගැනීම
- රෝගී පත්‍ර කහ පැහැ වී හැලී යයි

රෝග පාලනය

- රෝගය පැතිරී යාමේ අවදානමක් පවතිනම් නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් ඉසීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලීටර 10 කට)
කොපර් 50 ඩබ්.පී	40 ග්‍රෑම්
මැන්කොසෙබ් 80 ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
මැනෙබ් 80 ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
ප්‍රොපිනෙබ් 70 ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
තයෝෆැනට් මිනයිල් 70 ඩබ්.පී	6 ග්‍රෑම්

ටෙබ්බකොනසෝල් 250 ග්‍රෑම් ෫.ලී ඊ. ඩබ්	3෨5 මි.ලී
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම් ෫.ලී එස්ග සී	8 මි.ලී
ප්‍රොපිකොනසෝල් 250 ග්‍රෑම් ෫.ලී ඊග සී	3෨5 මි.ලී
කොපර් 37෨5 ඩබ්ගපී	50 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම් ෫.ලී එස්ග සී	30 මි.ලී

පිටිපුස් රෝගය Powdery mildew

රෝග කාරකය :

එරිසිප්ටේ පොලිගෝනි දිලිර විශේෂය
(Erysiphe polygoni)

රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍ර මත සුදු පැල්ලම් වැනි දිලිර ජාල ඇති වීම

- පසුව පැල්ලම් අළු පැහැයට හැරීම



රෝග පාලනය :

- රෝගය පැතිරී යාමේ අවධානමක් පවතිනම් නිර්දේශිත දිලිර නාශකයක් ඉසීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලීටර 10 කට)
තයෝෆනේට් මිනයිල් 70% ඩබ්.පී	10 ග්‍රෑම්
සල්ෆර් 80% ඩබ්.පී	50 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්ග සී	30 මි.ලී
කාබන්ඩයිම් 50% ඩබ්.පී/ ඩබ්ගපී	7 ග්‍රෑම්

ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය Anthracnose

රෝග කාරකය :

කොලෙටෝට්‍රිකම් ලින්ඩමුතියානම්
දිලිර විශේෂය (Colletotrichum lindemuthianum)

රෝග ලක්ෂණ :

- රෝගී ශාක වල දම් පැහැයට හුරු දුඹුරු පැල්ලම් පත්‍ර, පත්‍ර නටු, පත්‍ර නාරටි, කඳෙහි හා කරල් මත ඇති වීම
- පැල්ලම් මත කළු පැහැති බීජානු දක්නට ලැබීම
- රෝගී පත්‍ර වියළි හැලී යාම

පැතිරීම : බීජ , බෝග අවශේෂ හා ද්විතියික ආසාදනය සුළඟ මගින්



රෝග පාලනය :

- නිරෝගී බීජ පමණක් ලබා ගැනීම
- බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම
- බෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම
- බෝග අවශේෂ කොටස් විනාශ කිරීම
- මුල් අවස්ථාවේදීම රෝගී ශාක කොටස් ඉවත් කර විනාශ කිරීම
- මල් පිපෙන අවධියේ පටන් දින 7 - 10 ට වරක් බැගින් නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලීටර 10 කට)
මැන්කොසේබ් 80% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
මැනෙබ් 80% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
තයෝෆනේට් මීතයිල් 70% ඩබ්.පී	6 ග්‍රෑම්
කාබන්ඩයිම් 50% ඩබ්.පී	7 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්. සී	30 මි.ලී
ප්‍රොපිකොනසෝල් 250 ග්‍රෑම් / ලී ඊ. සී	10 මි.ලී
කොපර් 37.5% ඩබ්.පී	40 ග්‍රෑම්

පාදස්ථ කුණුවීම - Collar rot

රෝග කාරක :

ෆියුසාරියම් (Fusarium), පිතියම් (Pythium), ස්ක්ලෙරෝටියම් (Sclerotium), රයිසොක්ටෝනියා (Rhizoctonia), පයිටොප්තොරා (Phytophthora) වැනි දිලීර විශේෂ

රෝග ලක්ෂණ :

- ශාක මැලවීම හා පත්‍ර කහ පැහැ වීම
- පාදස්ථ කොටස දුඹුරු පැහැ වීම හා සුදු පැහැති දිලීර ජාල දැකීම
- ස්ක්ලෙරෝටියම් දිලීරය ආසාදනය වූ විට බීජාණු කඳේ පාදස්ථ කොටසේ දැකීම
- අවසානයේ මුල් කුණුවී ශාකය මැරී යාම



ඇස්කොකයිටා අංගමාරය Aschochyta blight

රෝග කාරකය :

ඇස්කොකයිටා පේසියලෝරම් දිලීර විශේෂය
(Aschochyta phaseolorum)

රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍ර මත කළු පැහැති ලප දක්නට ලැබීම
- එම ලප කඳ, පත්‍ර නටු, කරල හා කරලෙහි නටුව දක්වා පැතිරීම
- පත්‍ර වියළී හැලීම
- කරලෙහි ලප එකතු වී වියළී යාම
- විකෘති කුඩා බීජ ඇති වීම

රෝග පාලනය :

- ජල සම්පාදනයට ප්‍රථම රෝගී ශාක පස් සමග ඉවත් කර විනාශ කිරීමද එම ස්ථානය හා අවට පස තෙමී යන පරිදි නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
තිරාම් 80% ඩබ්.පී	70 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී
මිතයිල් 70% ඩබ්.පී	30 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී
තයෝෆනේට් මිතයිල් 50% ඩබ්.පී + තිරාම් 30% ඩබ්.පී	50 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකර/ 10 ව.මී

- ජලවහනය දියුණු කිරීම
- බෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම

පැතිරීම : බීජ හා බෝග අවශේෂ මගින්



රෝග පාලනය :


- නිරෝගී බීජ පමණක් ලබා ගැනීම
- බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම
- බෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම
- බෝග අවශේෂ කොටස් විනාශ කිරීම
- මුල් අවස්ථාවේදීම රෝගී ශාක කොටස් ඉවත් කර විනාශ කිරීම

කහ විවිත්‍ර වෛරස් රෝගය Yellow mosaic virus

රෝග ලක්ෂණ :

- දීප්තිමත් කහ සහ කොළ විවිත්‍ර ලක්ෂණ පත්‍ර මත ඇති වීම
- කරල් බොහෝ විට කහ පාටවන අතර කරල් විනාශ වීම
- බීජ හැකිලීම
- ශාක කුරු වීම

පැතිරීම : සුදු මැස්සා



රෝග පාලනය :

- රසායනික මර්දන ක්‍රම නොමැත
- වෛරසය පතුරුවන වාහකයා පාලනය කිරීම
- රෝගී ශාක කොටස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කිරීම
- නිසි කලට බෝගය ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම
- ක්ෂේත්‍රය වල් පැලෑටි වලින් තොරව තබා ගැනීම
- ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද වගා කිරීම (MI 6- මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිරෝධී)

පත්‍ර රැලිවීමේ වෛරස් රෝගය Leaf crinkle virus

රෝග ලක්ෂණ :

- ලපටි පත්‍ර වල ලා කොළ කහ පැහැති විවිත්‍ර පැල්ලම් ඇති වීම
- පළමුව ලපටි පත්‍ර වල නාරටි ආශ්‍රිතව ඇතිවන හරිතක්ෂය
- නාරටි හා අන්තර් නාරටි කෙටි වීම
- පත්‍ර දාරය යටි අතට වක්‍රවීම
- පත්‍ර දඟර ගැසුණු ස්වරූපයක් ගැනීම
- පත්‍රයේ යටි පැත්තේ නාරටි රතු දුඹුරු පැහැයක් ගැනීම
- සති 05 ක් තුළ රෝගය වැළඳුන විට ශාකය කුරැවීම හා අංකුරයේ සිට ඇරඹී සති 1-2 ක් ඇතුළත ශාකය මිය යාම
- පසුව වැළඳුන විට පත්‍ර වක්‍රවීම හා දඟර ගැසීම විශාලව ඇති නොවූනද පත්‍ර වල නාරටි ආශ්‍රිතව ඇතිවන හරිතක්ෂය
- ආසාදිත ශාක කුරු වීම හා පඳුරක ආකාරය ගැනීම
- මල් විකෘති වීම, කුඩා වීම හා විවෘත නොවීම

පැතිරීම : සුදු මැස්සා, කුඩිත්තා, බීජ මගින් හා සෛල යුෂ මගින්



රෝග පාලනය :

- රෝග ලක්ෂණ ඇතිවූ මුල් අවස්ථාවේදීම රෝගී ශාක ඉවත් කිරීම (දින 45ක් දක්වා)
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක යොදා වාහකයා පාලනය
- වාහකයාගේ ධාරක ශාක විනාශ කිරීම
- රෝග ලක්ෂණ ඇතිවූ මුල් අවස්ථාවේදීම රෝගී ශාක ඉවත් කිරීම (දින 45ක් දක්වා)

බැක්ටීරියා බිබිලි රෝගය Bacteria pustules

රෝග කාරක :

සැන්තොමොනාස් පේසිඩලි (Xanthomonas phaseoli) බැක්ටීරියා විශේෂ

සෝයා බෝංචි වගාවේ විශේෂයෙන් දැකිය හැක

රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍ර වල උඩ හා යටි පැත්තේ පළමුව ලා කොළ පාට කුඩා ලප ඇති වීම
- පසුව කහ වලල්ලකින් වටවූ දුඹුරු පාට බිබිලි බවට පත්වීම

- හානිය උග්‍ර වූ විට පත්‍ර හැලී යාම
- කරල් මත කුඩා රතු පැහැති ලප ඇති වීම

රෝග පාලනය :

- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- බෝග මාරුව



බීජ දම් පැල්ලම් රෝගය Purple seed stain

රෝග කාරක :

සර්කස්පෝරා කිකුචි (*Cercospora kikuchi*)
දිලීර විශේෂය

සෝයා බෝංචි වගාවේ විශේෂයෙන් දැකිය හැක

රෝග ලක්ෂණ :

- බීජ මත රෝස දම් පැහැ පැල්ලම ඇති වීම
- ඒවායේ ප්‍රමාණය කුඩා තිත් ලෙස හෝ මුළු බීජයම වැසී යන පරිදි ඇති වීම
- බීජ වල ප්‍රරෝහනය අඩු වීම

- වැඩුණු ශාක වල පත්‍ර මත රතු පැහැයට හුරු දම් පැහැයක් දක්නට ලැබීම
- පසුව මෙම ස්ථාන එකට එකතුවී වියළී යාම



රෝග පාලනය :

- නිරෝගී බීජ භාවිතය
- බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම (තිරාම් හෝ තයොගිනයිට් මීතයිල් + තිරාම්)
- රෝගී ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන අවස්ථාවේ නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් පත්‍ර මතට යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලීටර 10 කට)
මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්. සී	30 මි.ලී

රටකපු *Arachis hypogaea* L.

රතු කේශර දළඹුවා - Red hairy caterpillar

ඇමිසැක්ටා ඇල්බිස්ට්‍රිගා *Amsacta albistriga* Walk.

- දුඹුරු පැහැයට හුරු සුදු පාට සලබයෙකි.
- පියාපත් දිගහැරිය විට මිමි, 40-50 ක් පමණ විශාලය.
- ළපටි කීටයින් ලා දුඹුරු පාට වන අතර සම්පූර්ණයෙන් වැඩුණු විට රතු පැහැයක් ගනී. වැඩුණු කීටයින්ගේ කේශර දැකිය හැකිය.
- පිලා අවධිය පසෙහි ගත කරයි.



හානිය :

- කීටයින් පත්‍ර ආහාරයට ගනී.



කෘෂ්ණ බෝගවල ජෝග, පලිබෝධ හා රෝගීන් උණනා හඳුනා ගැනීමේ අත්පොත

හානිය පාලනය :

- දළඹුවන් හා බිත්තර එකතු කර විනාශ කිරීම

සමූහ පත්‍රවා - Army worm

ස්පොඩොප්ටෙරා ලිටිසුරා *Spodoptera litura* (Fabricius)

- සුහුඹුලා දුඹුරු පාටය. පියාපත් දිග හැරිය විට මිමි. 30 ක් පමණ විශාලය.
- බිත්තර සමූහ වශයෙන් පත්‍ර මත දමයි.
- ලපටි කීටයින් ලා කොළ පාට වන අතර පසුව කොළ-දුඹුරු පැහැයට හැරේ.
- වැඩුණු කීටයින් මිමි. 50 ක් පමණ දිග වන අතර පෘෂ්ඨයට කළු පැහැති ලප ඇත.



හානිය :

- ලපටි කීටයින් පත්‍ර සුරා කයි. වැඩුණු කීටයින් කරල් වලට හානි සිදු කරයි.

කුඩිත්තා - Aphid

ඒපිස් ක්‍රැක්සිවෝරා *Aphis craccivora* Koch

- මිමි. 1-2 ක් පමණ දිග කළු පැහැති කෘමියකි.



හානිය :

- සුහුඹුලන් හා ශිශුවන් විසින් ශාකයේ පත්‍ර හා කඳ ප්‍රදේශයෙන් යුෂ උරා බීම නිසා විකෘති පත්‍ර හා කඳන් සහිත කුරු ශාක ඇති වේ.
- වෛරස් රෝග පතුරුවා හරින වාහකයින් ලෙසද ක්‍රියා කරයි.


පැලමැක්කන් - Thrips

සර්ටෝත්‍රිප්ස් ඩෝසාලිස් Scirtothrips dorsalis Hood

ත්‍රිප්ස් පාම් Thrips palmi Karny

ෆ්‍රැන්කිනිල්ලා ෂූල්ට්සි Frankiniella schultzei (Trybom)

- මිමි. 1-2 ක් පමණ දිග කෘමීන් වේ.
- බිත්තර ශාක පටක මත තැන්පත් කරයි.



හානිය

- සුහුඹුලන් හා ශිශුවන් පත්‍ර වලින් යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර වල සුදු පාට පැල්ලම් ඇතිවේ. අංකුර මැරීයාමේ වෛයිරස් රෝග යේ වාහකයෙකු ලෙසද ක්‍රියා කරයි.



වේයන් - Termites

ඔඩොන්ටොටර්මිස් විශේෂ Odontotermes spp.

පසෙහි ගනාවාස ලෙස ජීවත් වේ.



හානිය :

- කඳ හා මූල පද්ධතියට ඇතුළු වී හානි සිදු කරයි.
- කරල් වල සිදුරු සාදා බීජ කා දමයි.



හානිය පාලනය :

- නිර්දේශිත කෘමි නාශක යෙදීම

ඉම්ඩක්ලොප්‍රිඩ් 20 එස්එල්	මිලි 5/10 ලීටර්
------------------------------	-----------------

පුර්ව කොළ පුල්ලි රෝගය Early Leaf Spot

රෝග කාරකය :

සර්කස්පෝරා ඇරච්ඩිකෝලා (Cercospora arachidicola)

රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍ර තලය මත තද දුඹුරු පැහැති පුල්ලි ඇති වීම
- පත්‍ර වල උඩු පෘෂ්ඨයේ බීජානු සෑදීම



පශ්චිම කොළ පුල්ලි රෝගය Late Leaf Spot

රෝග කාරකය :

සර්කස්පෝරා පර්සොනාටා (Cercospora personata)

රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍රයේ යටි පැත්තේ තද දුඹුරු පැහැති පුල්ලි ඇති වීම
- පත්‍ර තලයේ යටි පැත්තේ බීජානු සෑදීම



රෝග පාලනය :

- බෝග මාරුවක් අනුගමනය කිරීම
- රෝගය පැතිරී යාමේ අවධානමක් පවතිනම් නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලීටර් 10 කට)
ඩිටර්ටනෝල් 300 ග්‍රෑම්/ ලී ඊ සී	10 මි.ලී
ප්‍රොපිනෙබ් 70% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්ග් සී	30 මි.ලී
මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්

මැනෙබ් 80 %ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
ප්‍රොපිකොනසෝල් 250 ග්‍රෑම්/ ලී ඊ සී	35 මි.ලී

මලකඩ රෝගය Rust

රෝග කාරකය :

පක්ෂිනියා ඇරකිඩිස් (Puccinia arachidis)

රෝග ලක්ෂණ :

- පත්‍ර යටි පැත්තේ තැඹිලි පැහැති බිබිලි ඇති වීම
- භානිය අධික වූ විට පත්‍ර උඩ පැත්තේ ද, කඳේ ද බිබිලි දක්නට ලැබේ
- පත්‍ර ක්‍රමයෙන් වියලී ගොස් මිය යාම



රෝග පාලනය :

- රෝගය පැතිරී යාමේ අවදානමක් පවතිනම් නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය (ජලය ලීටර 10 කට)
බීටර්ටනෝල් 300 ග්‍රෑම්/ ලී ඊ සී	10 මි.ලී
ටෙබුකොනසෝල් 250 ග්‍රෑම්/ ලී ඊ. ඩබ්	3.5 මි.ලී
කොපර් 50%ඩබ්.පී	40 ග්‍රෑම්
මැන්කොසෙබ් 80% ඩබ්.පී	20 ග්‍රෑම්
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්ග සී	30 මි.ලී

පාදස්ථ කුණුවීම Colloar Rot

රෝග කාරකය :

ස්ක්ලෙරෝටියම් දිලීර විශේෂය (Sclerotium rolfsii)

රෝග ලක්ෂණ :

- ගස් මැලවීම හා පත්‍ර කහ පැහැ වීම
- අවසානයේ මුල් කුණුවී ශාකය මැරී යාම
- සුදුපැහැති දිලීර ජාලයක් කඳ පාමුල සහ මුල් මත දක්නට ලැබීම



අංකුර අංගමාරය Peanut Bud Necrosis

රෝග කාරකය :

Peanut Bud Necrosis Virus

රෝග වාහකයා : පැලමැක්කා

රෝග ලක්ෂණ :

- ලපටි පත්‍ර වල හරිතක්ෂය ලප ඇති වීම
- පසුව එම ස්ථානවල පටක මිය ගොස් දුඹුරු පාටක් ගැනීම
- අග්‍රස්ථ අංකුරයද දුඹුරු පැහැ වී මිය යාම
- ශාක කුරු වී මිය යාම

රෝග පාලනය :

- ජල සම්පාදනයට ප්‍රථම රෝගී ශාක පස් සමග ඉවත් කර විනාශ කිරීම.
- එම ස්ථානය හා අවට පස තෙමී යන පරිදි නිර්දේශිත දිළිර නාශකයක් යෙදීම

රසායනික නම	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
කිරාම් 80% ඩබ්.පී	70 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකරු/ 10 ව.මී
තයෝෆතෝට් මීතයිල් 70% ඩබ්.පී	30 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකරු/ 10 ව.මී
තයෝෆතෝට් මීතයිල් 50% + කිරාම් 30% ඩබ්.පී	50 ග්‍රෑම්/ ජලය ලී 50 ක දියකරු/ 10 ව.මී



රෝග පාලනය :

- ඔරොත්තු දෙන ප්‍රභේද සිටුවීම
- ක්ෂේත්‍රය අවට ඇති වල්පැල ඉවත් කර පිරිසිදුව තබා ගැනීම
- ක්ෂේත්‍රය වටා ආවරණ බෝගයක් ලෙස බඩ ඉරිගු පේලි 3 ක් පමණ යෙදීම
- ආසාදිත පැල ගලවා ඉවත් කිරීම
- නිර්දේශිත කාමි නාශක භාවිතා කර වාහක පැලමැක්කා පාලනය කිරීම

තල

සෙසමම් ඉන්ඩිකම් - *Sesamum indicum* L.

පත්‍ර දැල් බඳින්නා Leaf webber

ඇන්ටිගැස්ට්‍රා කැටලොනාලිස් *Antigastra catalaunalis* (Dup.)

- සුහුඹුලා තැඹිලි පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැති සලබයෙකි.
- සුහුඹුල් සතුන් පත්‍ර හෝ පුෂ්ප මත බිත්තර තැනි තැනිව දමයි.
- ලපටි කීටයින් සුදු පැහැතිය. වැඩුණු කීටයින් කොළ පැහැති වන අතර කළු ලප සහිතයි.

හොඳින් වැඩුණු කීටයා මිමි. 14ක් පමණ දිගය.



හානිය :

- ශාකයේ වර්ධක ස්ථානයේ පත්‍ර එකතු කර දැලක් මෙන් බඳීයි.
- මල් හා අංකුර වල කීටයින් විසින් හානිකරන ලද සිදුරු දැකිය හැකිය.



පාලනය :

- නියමිත කාලයට වගාව ආරම්භ කිරීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශක භාවිතය

ඇසිලෝට් 75% එස්පී	ග්‍රෑම් 20/ ලීටර 10
ටෙබුලොනොසයිඩ් 20 එස්පී	මිලි 15/ ලීටර 10
ක්ලෝප්‍රොප්‍රිප්‍රොරෝන් 5 ඊපී	මිලි 30/ ලීටර 10
ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 ග්‍රෑම්/ ලී එස්. සී	30 මි.ලී
කොහොඹ නිස්සාරකය	ග්‍රෑම් 400/ ලීටර 10

පිලෝඩ් Phyllody

රෝග කාරකය :

මයිකොප්ලාස්මා (Mycoplasma)

රෝග ලක්ෂණ :

- පුෂ්ප කොටස් කොළ පැහැති පත්‍ර බවට පත්වීම
- පසුව සම්පූර්ණ පුෂ්ප මංජරියම දැහර ගැසුණු කුඩා පත්‍ර සහිත ස්වරූපයක් ගැනීම
- පර්ව කුඩා වී අසාමාන්‍ය ස්වරූපයකින් පඳුරක් ආකාරයෙන් දිස් වීම



රෝග පාලනය :

- රෝගී ශාක විනාශ කිරීම