දකුණුලක රැකව, උස්සන්ගොඩ කලමැටිය ආශ්‍රිත ජෛව විවිධත්වය

ලෝකයේ ජෛව විවිධත්වය අතින් ඉහලම කලාප අතරින් ලංකාවට හිමි වන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. ඒ අතරින් ලංකාවේ ගිනිකොන දිග වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති රැකව, තළමැටිය උස්සන්ගොඩ වෙරළ තීරයට හිමි වන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. මෙම ප්‍රදේශයේ වෙරළ තීරය වැලි සහිත දීර්ඝ වෙරළකින් ද ඒ අතරට පවතින ගල් සහිත මුහුදට නෙරාගිය වෙරළට සමාන්තරව ඇති වැලි ගල් පරවලින් ද සමන්විත වේ. මෙම වෙරළ කලාපයෙහි පවතින මුහුද දෙසට නෙරා ගිය ගල් සහිත ස්ථානයන් ආශ්‍රිතව උසස් තත්වයේ පවතින කොරල්පර රාශියක් හඳුනාගත හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල පවතින ප්‍රධාන කොරල් පරවලට සාපේක්ෂව මෙම ප්‍රදේශයේ කොරල්පර වල ජෛව විවිධත්වය අඩු මට්ටමක පැවතීම විශේෂ ලක්ෂණයකි. අනෙක් අතට මියගොස් ඇති කොරල් පර විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම ප්‍රදේශයේ දැකගත හැකිය. මේවා 1988 කාලයේ දී ඇති වූ කොරල් විරංජනය නිසා මිය ගිය කොරල් ලෙස අනුමාන කල හැකිය. රැකව, උස්සන්ගොඩ, කලමැටිය ප්‍රදේශය කැස්බෑවන් බිත්තර දමන වෙරළ තීරයක් ලෙස ද වැදගත්කමක් උසුලයි. මෙම වෙරළ කලාපයේ පවතින කොරල්පර අතරින් උස්සන්ගොඩ කොරල්පරයට හිමිවන්නේ පාරිසරික වශයෙන් ඉහල වටිනාකමකි. මන්ද මෙම ප්‍රදේශයේ පවතින කොරල්පර අතරින් ජෛව විවිධත්වයෙන් ඉහලම කොරල්පරය ලෙස මෙම උස්සන්ගොඩ කොරල්පරය හඳුන්වා දිය හැකිය. එමෙන්ම වඩාත් හොඳ තත්වයේ පවතින කොරල්පරය වන්නේ ද මෙයයි. මෙම උස්සන්ගොඩ වෙරළ තීරය මෙන්ම ඒ ආශ්‍රිත කලාපය පාරිසරික වශයෙන් මෙන්ම ඓතිහාසික හා පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් ද වැදගත් බිම් තීරයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. විශේෂයෙන් සංචාරක ආකර්ශනය ඉහලින් දිනාගත් ප්‍රදේශයක් වන මෙම කලාපය පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්තයේ මනා කලමනාකරණයක් තුළ දියුණු කල හැකි කලාපයක් ලෙස ද පෙන්වා දිය හැකිය. මෙම උස්සන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ සංචාරක ආකර්ශනය පිළිබඳ දැනගත් සමහර ව්‍යාපාරිකයින් මෙම සංවේදී පරිසරය පිළිබඳ කිසිදු සැලකිල්ලක් නොදනක්වමින් සංචාරක හෝටල් ඉදිකිරීමට ගත් උත්සාහයන් ද නැතුවා නොවේ. උදාහරණයක් වශයෙන් පරිසර නීතීන්ට පයින් ගසමින් උස්සන්ගොඩ ඉදිකිරීමට ගිය පීකොක් රාවනා හෝටල් සංකීර්ණය මෙයට කදිම උදාහරණයකි. එම දීන උත්සාහය පරිසරයට ආදරය කරන මිනිසුන්ගේ දැවැන්ත උද්ඝොෂණය හමුවේ පරාජයට පත්විය. මන්ද මෙම කොරල්පර ආශ්‍රිත කලාපය තුළ විනාශකාරී ක්‍රියාවන් ඇති වුවහොත් එය පාලනය කිරීම ඉතාම අපහසු වනු ඇත. මේ නිසා මෙම කලාපය තුළ කොරල්පර ආරක්ෂණය හා කලමනාකරණය කෙරෙහි බලධාරීන්ගේ අවධානය වහාම යොමු විය යුතුව තිබේ.

භූ විෂමතාවය දේශගුණය හා භෞතික ලක්ෂණ

මෙම පාරිසරික කලාපය කොළඹ සිට කි.මී. 200 පමණ දුරින් ගණිකොන දිග මුහුදු තීරයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය ආශ්‍රිතව පිහිටා තිබේ. මෙම වෙරළ කලාපයේ කලපු, තෙත් බිම්, මෙන්ම මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද පරිසර පද්ධති රාශියක් දැකිය හැකිය. මෙම රැකව, උස්සන්ගොඩ, කලමැටිය ආශ්‍රිත වෙරළ කලාපය තුළ තෙත් බිම් පරිසර පද්ධති රාශියක් දැකිය හැකිය. ඒ අතරින් ලුනම (හෙක්ටයාර් 192) කලමැටිය (හෙක්ටයාර් 600), රැකව (හෙක්ටයාර් 250), වලව ගං මෝය ආශ්‍රිතව ඇති තෙත් බිම් පද්ධතිය ඉතාම වැදගත් වේ. මෙම ප්‍රදේශයට මි.මී. 1270 - මි.මී 1910 පමණ වාර්ෂික වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන අතර සාමන්‍ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය සෙන්ටිග්‍රේට් අංශක 26.6 සිට සෙන්ටිග්‍රෙට් අංශක 27.2 ක් දක්වා පරාසයක විහි දී යනු දැකිය හැකිය. කලමැටිය කලපුව මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද පටු ගං මෝයක් මගින් මුහුදට සම්බන්ධව පවතින අතර කිලෝමීටර් 2 ක් පමණ දිග නොගැඹුරු ඇල මාර්ගයක් මගින් ලුනම කලපුව හා සම්බන්ධව පවතී. එම ඇල මාර්ගය

මගින් ලුනම කලපුවේ වැඩි ජලය කලමැටිය කලපුව දක්වා ගමන් කිරීම තුල ලුනම කලපුවේ ස්ථාවර භාවය මෙන්ම ප්‍රදේශයේ කුඹුරුවල ආරක්ෂාව ද තහවුරු වී තිබේ. නමුත් වර්තමානය වන විට මෙම නොගැඹුරු ඇල මාර්ගය ගොඩවීම නිසා ලුනම ආශ්‍රිත කුඹුරු වලට විභාල තර්ජනයක් ඇතිව තිබේ. මෙම කලපු පද්ධති සාමාන්‍යයෙන් නොගැඹුරුය. සාමාන්‍ය ගැඹුර මීටර් 1 ක් පමණ වන අතර කච්චිගල් ආර මගින් පෝෂණය වනු ලැබේ. මෙම කලපුව වටා හා ඒ ආශ්‍රිතව වගුරු හා කඩොලාන වෘක්ෂලතා දර්ශයන් තීරුවක් ලෙස පිහිටා තිබීම ද විශේෂයකි. උස්සන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ භූ දර්ශනය ද සුවිශේෂී ලෙස පිහිටා තිබේ. උස්සන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ භූමිය තුල තැන්පත්ව ඇති රතු පස් නිධියක් දැකිය හැකිය. මෙය සර්පන්ටිනයිට් පාෂාණය ජීරණය වීම නිසා සෑදී ඇති බව භූ විද්‍යාඥයන්ගේ මතය වේ. උස්සන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ වෘක්ෂලතා පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීමේ දී ප්‍රධාන වශයෙන් තෘණභූමි ශාක ප්‍රජාවක් දැකිය හැකි අතර තැනින් තැන කටු පඳුරු සහිත ශාක ප්‍රජාවන් ද දැකිය හැකිය. තෘණ භූමි තුළ විශ්ණු ක්‍රාන්ති නම් ඖෂධීය පැලැටිය විශාල වශයෙන් දැකිය හැකි වේ. රැකව, කලමැටිය, උස්සන්ගොඩ වෙරළ තීරයන්හි වැලි බහුල සමුද්‍රිය වෙරළ ප්‍රධාන වන අතර මේ ආශ්‍රිතව කොරල් බහුල වශයෙන් ව්‍යප්තව පවතී. මෙයට අමතරව මෙම ප්‍රදේශයේ ගංගා මෝය කලපු පද්ධතීන්, වෙරළාශ්‍රිත වැලිගල් පරයන් ද දැකිය හැකිය. මෙම කලාපයේ වෙරළ අධික බෑවුම් සහිත වීම ද විශේෂයකි. උස්සන්ගොඩ වෙරළ තීරයේ මෙම ලක්ෂණය ඉතාම පැහැදිලිව දැකිය හැකිය.

කලමැටිය රැකව හා උස්සන්ගොඩ පරිසර කලාපය තුල වනජීවී විවිධත්වය විශේෂයෙන් සැලකිල්ලට ගෙන වන සත්ව හා තුරුලතා ආඥා පනත යටතේ මෙම ප්‍රදේශය තුළ හෙක්ටයාර් 700 ක පමණ ප්‍රදේශයක් 1984 වර්ෂයේ දී අභයභූමියක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදි. අද වන විට එහි පරිපාලන කටයුතු වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරනුලබයි. මෙයට අමතරව වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් රැකව කලපුව විශේෂ පරිසර කලමනාකරණ ප්‍රදේශයක් ලෙස 1990 දශකයේ මැද භාගයේ දී නම් කරන ලදි.

<u>උස්සන්ගොඩ රැකව හා කලමැටිය ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිත ජෛව විවිධත්වය</u>

උක්ත පරිසර පද්ධති ජෛව විවිධත්වයෙන් හා පාරිසරික වටිනාකමකින් අනූන පරිසර පද්ධතියක් ලෙස විවිධ අභ්‍යාසයන් මගින් සනාථ කර තිබේ. ලෝක සංරක්ෂණ සංගමය (IUCN) ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය මගින් 2003 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත් කල වාර්තාව මෙහි දී ඉතාම වැදගත් හා පර්යේෂණාත්මක වාර්තාවක් ලෙස සැලකිය හැකිය. මෙම වාර්තාවට අනුව කුල 65 ක් යටතේ ගැනෙන ගන 222 කට අයත් ශාක විශේෂ 287 ඉහත සඳහන් වෘක්ෂලතා දර්ශ/වාසස්ථාන තුලින් වාර්තා වී ඇත. මෙහි වාර්තා වන ශාකවල ජීවන ආකාරයන් නිරීක්ෂණය කිරීමේ දී වෘක්ෂ විශේෂ 82 ක් පඳුරු විශේෂ 55 ක් පැලෑටි විශේෂ 122 ක් වැල් විශේෂ 40 ක් ලෙස හඳුනා ගෙන තිබේ. මෙම පරිසර කලාපය තුළ සුවිශේෂී ශාක ප්‍රජාවක් ලෙස කඩොලාන ශාක ප්‍රජාව පෙන්වා දිය හැකිය. කඩොලාන යනු නිවර්තන කලාපීයව හමුවන කලපු සහ ගංමෝය ආශ්‍රිතව දැකිය හැකි ලවණතාවයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති කාෂ්ඨීය ශාක ප්‍රජාවක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් කඩොලාන මීටර් 6 - 10 අතර උසක් දක්වා වර්ධනය වන අතර කිරල (Sonneratia caseolaris) වැනි විශේෂ ඊටත් වඩා උසට වර්ධනය වේ. රැකව හා උස්සන්ගොඩ කලමැටිය ප්‍රදේශයේ විවිධ උප ප්‍රජාවන්ට අයත් කඩොලාන ප්‍රජාවන් දැකිය හැකිය. මේ යටතේ Lumnitzer ප්‍රමුඛ දර්ශය (රැකව), Ceriops ප්‍රමුඛ දර්ශය (රැකව), Aricennia ප්‍රමුඛ දර්ශය (රැකව), මිශ්‍ර කලා දර්ශය (රැකව හා කහඳ), Excoecaria ප්‍රමුඛ දර්ශය (කලමැටිය), කිරල (Sonneratia) වශයෙන් දැකිය හැකිය.

වර්තමානය වන විට මෙම පරිසර පද්ධති ආශ්‍රිතව දැකිය හැකි කඩොලාන පරිසර පද්ධති දැවැන්ත තර්ජනයට මුහුණ පා තිබේ. මෙම කඩොලාන පද්ධතිය විනාශ වීම යනු මෙම සමස්ථ පරිසර පද්ධතියේම සමතුලිතතාව බිඳීයාමක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මෙම කඩොලාන පරිසර පද්ධතියේ ප්‍රයෝජනයන් ද මෙහි දී කෙටියෙන් විමසා බැලිය යුතුය. මෙම කඩොලාන ශාක පද්ධතිය වන ජීවීන්ගේ ප්‍රජනන මධ්‍යස්ථාන, ලැගසිටීමේ ස්ථාන, එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට සංක්‍රමණය වීමේ දී ආරක්ෂිත ලැගුම් ස්ථාන වශයෙන් විශාල සේවයක් සපයයි. එමෙන්ම සාගර ජීවීන්ට විලෝපීයකයන්ගෙන් බේරීම සඳහා කඩොලාන වල ඇති කරු මුල්, දණහිස් මුල් වැනි ව්‍යුහ ආරක්ෂිත ස්ථාන ලෙස ප්‍රයෝජනවත් වේ. එමෙන්ම ධීවර කර්මාන්තය සඳහා වැදගත් වන ජලීය සත්ව විශේෂවල ලදරු අවස්ථාවන් පෝෂණය කරන වාසස්ථාන ලෙස ක්‍රියා කිරීම ද ඉතාම වැදගත් ප්‍රයෝජනයකි. එමෙන්ම සුලං සාදනයෙන් ආරක්ෂාව ලබා දීම ද විශේෂ ප්‍රයෝජනයකි.

සත්ව විවිධත්වය

මෙම කලාපය ඉහල සත්ව විවිධත්වයක් දැකිය හැකි ඉතාම සංවේදී කලාපයක් ලෙස නම් කල හැකිය. ලෝක සංරක්ෂණ සංගමය ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය මගින් 2003 වර්ෂයේ දී දීර්ඝ අධ්‍යයනයක් සිදු කර තිබේ. ඒ අනුව රුකව, උස්සන්ගොඩ, කලමැටිය ප්‍රදේශය තුළින් පෘෂ්ඨවංශීන් විශේෂ 328 ක් වාර්තා වී ඇත. එයින් 14 ක් (4%) ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික විශේෂයන් වන අතර විශේෂ 27 ක් (8%) ජාතික වශයෙන් තර්ජනයට ලක්ව ඇති විශේෂයන් වීම විශේෂයෙන් අවධානයට ගතයුතුව ඇත. මෙම පෘෂ්ඨවංශීන් අතර විශේෂ 52 ක් මත්ස්‍යයන් වන බවට පර්යේෂණය මගින් තහවුරු කර තිබේ. විශේෂ 17 ක් උභයජීවීන් වන අතර විශේෂ 49 ක් උරගයන් බවට වාර්තා වී ඇත. හඳුනාගෙන ඇති පක්ෂීන් විශේෂ ගණන 184 ක් වේ. ක්ෂීරපායීන් විශේෂ 26 ක් ද අපෘෂ්ඨ වංශීන් අතරින් සමනලුන් විශේෂ 72 ක් ද භෞමික බෙල්ලක් විශේෂ 25 ක් ද ජලජ බෙල්ලන් විශේෂ 09 ක් ද හඳුනාගෙන තිබේ. එමෙන්ම මෙම ප්‍රදේශයේ කලපු, ගංගා, ඇල, දොළ, ආශ්‍රිතව මත්ස්‍ය විශේෂ 52 ක් වාර්තා වී තිබේ. මෙම මත්ස්‍යන් අතර කරදිය මත්ස්‍යයන් (කටිල්ලා, පරවා) මිරිදිය මත්ස්‍යයන් අතර (ලූලා, ගංකොපෙතියා), කිවුල්දිය මත්ෂ්‍යයන් අතර (වේක්කයා) ආදිය නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. මෙම කලාපය තුලින් ආවේණික මෙන්ම දැනට වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති උභය ජීවීන් විශේෂ 03 ක් හඳුනාගත හැකි අතර සම්පූර්ණ උභය ජීවී විශේෂ 17 ක් වාර්තා වී තිබේ. රුකව, උස්සන්ගොඩ කලමැටිය ප්‍රදේශයේ උභය ජීවීන් විශේෂ අතර ගෙම්බන් විශේෂ රාශියක් හඳුනාගෙන තිබේ. උදාහරණ වශයෙන් පොදු ගෙම්බා (Bufo melanostictus) මැඩියන් (පොදු මැඩියා Euphlyctis Cyanophlyctis) ගස් මැඩියන් (හුණු ගෝමර ගස් මැඩියා Polypedates maculatus) ආදී විශේෂ දැක්විය හැකිය. උරගයන් විශේෂ 49 ක් මෙම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර ආවේනික විශේෂ 05 ක් හා දේශීය වශයෙන් වඳවී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති විශේෂ 17 ක් ද මෙම ප්‍රමාණයට ඇතුලත්ව තිබේ. මෙම උරගයින් මෙම ප්‍රදේශයේ විවිධ පාරිසරික වාසස්ථාන භාවිතා කරන බව දැක ගන්නට ඇත. උදාහරණයක් ලෙස සාගරික (සාගරික කැස්බෑවන්, මුහුදු සර්පයන්) මිරිදිය (කිරි ඉබ්බා, හැල කිඹුලා) භෞමික (තාරකා ඉබ්බා), පොළොව තුල (හිකනලුන්), වෘක්ෂිය (ඇහැටුල්ලන්) යන විශේෂ පෙන්වා දිය හැකිය. මෙම කලාපය තුල දැකිය හැකි සර්පයින් අතර මාරාන්තික විෂ සහිත සර්ප විශේෂ 03 ක් වාර්තා වී තිබේ. (නයා, තිත් පොළඟා, තෙල් කරවලා) මෙම කලාපය තුල බිත්තර දැමීම සඳහා පැමිණෙන කැස්බෑ විශේෂ 05 ක් දේශීයව පමණක් නොව අන්තර් ජාතිකව වඳවී යාමේ තර්ජනයට මුහුණ පා ඇති විශේෂ වන බවට තහවුරු වී තිබේ.

රැකව, උස්සන්ගොඩ කලමැටිය ආශ්‍රිත මෙම අතිශය සංවේදී පරිසර පද්ධතිය දේශීය මෙන්ම සංචාරක පක්ෂී විශේෂ රාශියකට වාසස්ථාන සපයා තිබේ. මෙම ප්‍රදේශයෙන් දැනට දළ වශයෙන් පක්ෂී විශේෂ 184 ක් වාර්තා වී ඇති අතර පක්ෂින් විශේෂ 130 ක් නේවාසික විශේෂ වන අතර විශේෂ 54 ක් පමණ සංචාරක පක්ෂීන් වේ. නේවාසික විශේෂ අතරින් විශේෂ 02 ක් ලංකාවට ආවේනික අතර විශේෂ 05 ක් ජාතික වශයෙන් තර්ජනයට ලක්ව තිබීම විශේෂ අවධානය යොමු විය යුත්තකි. සංචාරක පක්ෂීන්ගෙන් 49 ක් නිරන්තරයෙන් මෙම පරිසර පද්ධතියට සංචාරය කරන පක්ෂීන් බවට ද හඳුනාගෙන තිබේ. මෙම ප්‍රදේශයේ හමු වන පක්ෂීන් විවිධ කාණ්ඩවලට බෙදා දැක්විය හැකිය. එනම් ජලාශ්‍රිත පක්ෂීන් (කොක්කු, සියක්කාරයන්, ලිහිණියන්, වල් තාරාවන්, මහ කොකුන්, අලි කොකුන්), වනාන්තර වාසී පක්ෂීන් (කෑරලුන්, කොට්ටෝරුවන්, බටගොයන්), පඳුරු ආශ්‍රිත පක්ෂීන් (කොන්ඩකුරුල්ලන්), තෘණ ආශ්‍රිත පක්ෂීන් (වී කුරුල්ලන්) ආදී වශයෙනි.

මෙම කලාපය තුළ ඉහල ක්ෂීරපායී විධත්වයන් ද පර්යේෂකයින් විසින් හඳුනාගෙන තිබේ. මෙම කලාපය තුළ ක්ෂීරපායී විශේෂ 26 ක් වාර්තා වන අතර ඉන් එක් විශේෂයක් ආවේනික වේ. එයින් විශේෂ 04 ක් පමණ තර්ජනයට ලක්ව තිබේ. මෙම ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන ක්ෂීරපායීන් අතර කුඩා ක්ෂීරපායීන් (මීයන්, වවුලන්) විශාල ශාක භක්ෂක සතුන් (තිත්මුවා) කසල භක්ෂක සතුන් (හිවලා, වල් ඌරා), මාංශ භක්ෂක සතුන් (හඳුන් දිවියා, කොළ දිවියා) සහ රුක්වාසීන් (රිළවා, අලු ගිරවා) පෙන්වා දිය හැකිය.

මෙම උස්සන්ගොඩ කලමැටිය හා රැකව ප්‍රදේශය තුළ ලෝක සංරක්ෂණ සංගමය (IUCN) ලංකා කාර්යාලය මගින් කල අධ්‍යයනය අනුව මෙම ප්‍රදේශය තුළින් සමනලුන් විශේෂ 72 ක් වාර්තා වී තිබේ. මෙම සමනලුන් අතර ලංකාවේ විශාලතම සමනයා ලෙස හැඳින්වෙන සහ ආවේනික මෙන්ම වඳවී යාමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති මහ කුරුළුපිය පැපිලියා ද (Troides darsius) අයත් වේ. මෙ කලාපයේ පඳුරු ආශ්‍රිත මධ්‍යස්ථානවල විශාල සමනල් විශේෂ ප්‍රමාණයක් දැක ගත හැකිය. සුදන කුලයට අයත් (Family - Pieridac) කුඩා සුදනා (Appias paulina) කහ මහ සුදනා (Ixias pyrene) හා පුංචි රෝස සුදනා (Olotis amata) යන විශේෂ ඉතා බහුලව හමු වේ.

භෞමික බෙල්ලන් විශේෂ 25 ක් රැකව, උස්සන්ගොඩ හා කලමැටිය ආශ්‍රිතව වාර්තා වී තිබේ. ඉන් විශේෂ 08 ක් ලංකාවට ආවේනික වන අතර ඒ අතරින් විශේෂ 03 ක් ජාතික ලෙස තර්ජනයට ලක්ව ඇති විශේෂ බවට වාර්තා වී තිබේ. Sitala phyllophila (Fami - Ariophantidae) යන විශේෂය පළමු වරට මෙම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබේ. එසේම Cyclophorus manhianus විශේෂයේ කවච ද කලමැටිය සිප්පි නිධි අතර වාර්තා වී ඇත. මෙම විශේෂ 03 මෙම ප්‍රදේශයෙන් වඳ වී ගොස් ඇති බවට උපකල්පනය කල හැකිය. මෙයට අමතරව ජලජ බෙල්ලන් විශේෂ 10 ක් රැකව, උස්සන්ගොඩ, කලමැටිය ප්‍රදේශයේ කරදිය හා කිවුල් දිය පද්ධති තුළින් වාර්තා වී ඇත.

කැස්බෑවුන් බිජුලන වැදගත් ස්ථානයන්

වැඩිම තර්ජනයකට හා වඳවී යාමේ අවධානමකට ලක්ව ඇති ලොව විශාලතම කැස්බෑවා වන දාර කැස්බෑවා (Dermochelys coriacea) බිජුලන වැදගත්ම ස්ථානයක් ලෙස ගොඩවාය සිට උස්සන්ගොඩ දක්වා ඇති මුහුදු තීරය හැඳින්විය හැකිය. රුකව මුහුදු තීරයේ ප්‍රධාන වශයෙන් කොළ කැස්බෑවවා (Chelonia mydas) බිජු ලෑමට පැමිණෙන ස්ථානයක් ලෙස මෙම වෙරළ තීරය හැඳින්විය හැකිය.

උස්සන්ගොඩ, කලමැටිය හා රුකව ප්‍රදේශ පිළිබඳව කර ඇති අධ්‍යයනයන්

උක්ත පරිසර පද්ධතියේ ඇති ජෛව විවිධත්වය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම නිසාම මෙම පරිසර පද්ධතිය පිළිබඳ විශාල පර්යේෂණ සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට සිදු කර තිබේ. විද්‍යාර්ථයින්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස ඒ පිළිබඳව ද සොයා බැලීම ඉතාම වැදගත්වේ. ආසියානු තෙත් බිම් නාමාවලියේ (ස්කොට්, 1989) මගින් ලුනව, කලමැටිය තෙත් බිම් පද්ධතීන් හා කලපු සංරක්ෂණය කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව විශේෂයෙන් සලකා බලා තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් 1995 දී කලමැටිය හා ලුනව කලපු පද්ධතිය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක ස්ථානීය වාර්තාවක් සහ සංරක්ෂණ කලමනාකරණ වාර්තාවක් සකස් කර ඇත. 1995 වසරේදී ගනේවත්ත සහ පිරිස විසින් රුකව කලපුව සම්බන්ධයෙන් සිදුකල පර්යේෂණ මත පදනම්ව රුකව කලපුව සඳහා පරිසර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. 1999 දී ප්‍රියදර්ශන විසින් රුකව කලපුවේ ජීව විද්‍යාත්මක තත්වය හා ජලයේ ස්වභාවය පිළිබඳ පුලුල් අධ්‍යයනයන් සිදු කර තිබේ. 1992 වර්ෂයේ ජයකොඩි සහ ජයසිංහ විසින් රුකව කලපුවේ මත්ස්‍යයන් සහ ඉස්සන් විශේෂ පිළිබඳව විද්‍යාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. 2006 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකා හරිත ව්‍යාපාරය මගින් උස්සන්ගොඩ ඇති පරිසර විද්‍යාත්මක වැදගත්කම හා එයට ඇති අභියෝග පිළිබඳ මහජන විකල්ප විනිශ්චය සභාවක් (APT) කැඳවා සවිස්තර වාර්තාවක් එළි දක්වා තිබේ. 1998 දී පතිරණ විසින් උස්සන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ශාක විශේෂ 35 ක් හා පෘෂ්ඨවංශී සත්ව විශේෂ 76 පිළිබඳව වාර්තා ගත කර තිබේ. හම්බන්තොට ඒකාබද්ධ වෙරළ ප්‍රදේශ සංරක්ෂණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මගින් ද මෙම ප්‍රදේශ පිළිබඳ පුළුල් අධ්‍යයනයන් රාශියක් සිදුකර තිබේ.

විශේෂ ස්තුතිය - IUCN - ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය

නීතිඥ නිශාන්ත සමන් කුමාර