කප්රැකි අත්පොත

1928 CALL US

www.cri.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

இலங்கை தெங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

COCONUT RESEARCH INSTITUTE - SRI LANKA

කප්රුක පෙරමග

කොකොස් නුසිෆෙරා (*Cocos nucifera*) යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වනු ලබන පොල් ගස නිවර්තන හා අර්ධ නිවර්තන කලාපවල බහුලව දැකිය හැකි ශාකයකි. ආසියානු සහ පැසිෆික් දූපත් ආශ්‍රිතව ආරම්භය සනිටුහන් කරන මෙම ශාකය මේ වන විට රටවල් 92 ක පමණ වගාවක් ලෙස ව්‍යාප්තව ඇත. එම රටවල් අතරින්, ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හතරවන විශාලතම පොල් නිෂ්පාදකයා වේ. වසර 3000 කට අධික ඉතිහාසයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සනිටුහන් කරන පොල් ශාකයෙහි ප්‍රභේද 23 ක් මේ වන විට රට තුළ හඳුනාගෙන ඇත. ඉන් තැඹිලි යනු ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේණික ප්‍රභේදයකි. අඩු උෂ්ණත්වයක් ඇති නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහළ කොටස හැර සෙසු ප්‍රදේශ තුළ අක්කර ලක්ෂ 11 ක භූමි ප්‍රමාණයක් පුරා සාර්ථකව ව්‍යාප්තව ඇති මෙම වගාව, වගා කර ඇති භූමි ප්‍රමාණය අනුව, දෙවැනි වන්නේ වී වගාවට පමණි. මෙම භූමි ප්‍රමාණය තුළ මිලියන 60 ක් පමණ පොල් ගස් ප්‍රමාණයක් පවතින අතර ඉන් වාර්ෂිකව ගෙඩි මිලියන 2800 ක පමණ පොල් අස්වැන්නක් ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඒක පුද්ගල පොල් පරිභෝජනය වසරකට ගෙඩි 114 ක් වැනි ඉහළ අගයක පවතින බැවින්, උක්ත වාර්ෂික පොල් නිෂ්පාදනයෙන් 70% පමණ වැයවනුයේ ගෘහස්ථ පරිභෝජනය වෙනුවෙනි. ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දෛනික මේද අවශ්‍යතාව මූලිකවමත්, ශක්ති අවශ්‍යතාව දෙවනුවත් සහ ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවයෙන් 5% ප්‍රමාණයකුත් සපයා ගනු ලබන්නේ පොල් පරිභෝජනය තුළින් වීම හේතුවෙන් රට තුළ ඒක පුද්ගල පරිභෝජනය ඉහළ අගයක පවතී.

කෙසේ නමුදු, පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික පොල් අස්වැන්න සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් ඉහළ යාමක් දක්නට නොලැබුණි. වර්තමානයේදී, එක් ගසකින් වසරකදී නිපදවන අස්වැන්න ගෙඩි 48 - 50 අතර වෙනස් වේ. විභවයට අඩු මෙම ඵලදායීතාව යටතේ, ජාතික පොල් කර්මාන්තය සඳහා යෙදවිය හැකි ගෙඩි ප්‍රමාණය මිලියන 1000 කට පමණ සීමාකාරී වේ. එබැවින්, පොල් වගාවෙහි ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම තුළින් එක් ගසක වාර්ෂික අස්වැන්න අවම වශයෙන් ගෙඩි 80 දක්වාවත් ඉහළ නැංවීමේ අවශ්‍යතාවයක් මතුව ඇත. මේ අනුව වසර 2023 අවසානයේදී අමතර ගෙඩි මිලියන 1000 ක් අපනයන කර්මාන්තයට දායක කිරීමේ ඉලක්කගත සැලසුම් සකස් කළ යුතුව ඇත. ඒ සඳහා, ගෙවතු වගාකරුවන්ගේ සිට මහා පරිමාණ පොල් වගාකරුවන් ඇතුළු පොල් ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ සියළුම පුරවැසියන්ට අප්‍රතිහත කැපවීමකින් යුත් සමාජ වගකීමක් පැවරී ඇත. ඒ තුළින්, දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ තුන්වන අපනයන වැවිලි බෝගය වශයෙන් පවතින පොල්, පළමු අපනයන බෝගය බවට පත්කිරීම අපගේ අරමුණයි.

මෙයට සමගාමීව, ගෘහස්ථ මට්ටමේ නාස්තිය අවම කිරීම තුළින් අමතර ගෙඩි මිලියන 300 - 400 ක ප්‍රමාණයක්ද, රෝග හා පළිබෝධ හානි අවම කිරීම තුළින් ගෙඩි මිලියන 200 - 300 ක ප්‍රමාණයක්ද, නිවැරදි ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රම භාවිතයට හුරු කිරීම තුළ අවම වශයෙන් එක පොල් වල්ලකට එක් ගෙඩිය බැගින් වැඩි කිරීම තුළින් ගෙඩි මිලියන 500 - 600 ක ප්‍රමාණයක්ද කඩිනමින් කර්මාන්තයට යොමු කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස්කර ඇත. එමෙන්ම **Ceylon Coconut** සන්නාමය ලෝකය තුළ ස්ථාපිත කිරීමටත්, නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමටත්, නාස්තිය අවම කිරීමටත්, නව අගය එකතුකළ නිෂ්පාදන හඳුන්වාදීමටත්, නව වෙළඳපල සොයා ගැනීමටත් ඉලක්ක කර ගත් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් දියත් කෙරෙමින් පවතී. විද්‍යාත්මක කරුණු මත පදනම් වූ දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මකට අනුව භූමියෙන් උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජන ලබා ගනිමින්, වසර 2030 වන විට පොල් නිෂ්පාදනය ගෙඩි මිලියන 6000 ක් දක්වා ඉහල නැංවීමට අවශ්‍ය සැලසුම් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද සහ සමාජ මූලධර්ම භාවිතා කරමින් සකස් කර ඇත. මෙම ඓතිහාසික කාර්යභාරයේ ගෞරවනීය කොටස්කරුවන් වන්නට මිත්‍රශීලීව ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරමු.

නිවැරදි තාක්ෂණයට අනුව
පොල් වගා කරමු

පොල් පිරුණු සාරවත්

පොල් ගස් ඔබේ වත්තටත්.....

තිරසාර පොල් වගාවක් සඳහා

- ගුණාත්මක පැළයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද?
- නිවැරදිව පැළයක් සිටුවන්නේ කෙසේද?
- නිවැරදිව පැළයට/ගසට පෝෂණය සහ ජලය සපයන්නේ කෙසේද?
- පොල් වගාවේ ප්‍රධාන පළිබෝධ හා රෝග පාලනය කරන්නේ කෙසේද?
- අතුරු බෝග වගාව, සත්ත්ව පාලනය සහ වල් පැළෑටි කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?
- ගෘහස්ථ පරිභෝජන නාස්තිය අවම කරගන්නේ කෙසේද?



ගුණාත්මක බවින් ඉහළ පැළයක්
තෝරා ගන්නේ කෙසේද ?

ගුණාත්මයෙන් ඉහළ
පොල් පැළයක
තිබිය යුතු ලක්ෂණ

- ★ මහත්වූ ශක්තිමත් කඳක් තිබීම
- ★ තද කොළ පැහැති පුළුල් පත්‍ර තිබීම
- ★ පත්‍ර දාර තියුණු ලෙස පිහිටීම
- ★ පත්‍ර උත්තල වීම
- ★ අතු කඳට සම්බන්ධ වන පිත්ත කෙටිව තිබීම
- ★ රෝග සහ පළිබෝධ හානි වලින් තොරවීම

පොල් පැළ ලබාගත හැකි ස්ථාන

ඔබට ආසන්න තවානකින් පැළ ලබාගැනීම
පිළිබඳව දැනුවත්වීම සඳහා අමතන්න
011 2861011 - පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය (www.coconut.gov.lk)
031 2262006 - පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

1928 CALL US
www.cri.gov.lk

VIDEO SCAN ME!

පොල් වගාදර්ශ (වර්ග) හඳුනාගන්නේ කෙසේද ?
ඕනෑම වර්ගයක් ඕනෑම ප්‍රදේශයක සිටුවිය හැකිද ?

ඉඩම පිහිටා ඇති කෘෂි දේශගුණික කලාපය, පාංශු සාධකයන් හා ඉඩමේ ප්‍රමාණය අනුව වගාදර්ශ තෝරාගත යුතුය. ඒ ඒ වගාදර්ශය සඳහා විශේෂිත වර්ණයකින් යුත් ස්ටිකරයකින් සෑම පැළයකම තත්ත්වය සහතික කර ඇත.

සී. ආර්. අයි. සී. 60

උසස් ශාක පොල්

මෙම උස වගාදර්ශයන් ලංකාවේ සියලුම පොල් වගා කරන ප්‍රදේශ සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.

සී. ආර්. අයි. එස්. එල්. 98

මොරොක් උස

මෙම උස වගාදර්ශයන් ලංකාවේ තෙත් හා අතරමැදි තෙත් කලාප වල මහා පරිමාණ වගාවන් සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.

සී. ආර්. අයි. සී. 65

කප්රුවන

කප්සෙත

කප්සුවය

මෙම උසින් අඩු දෙමුහුම් වගාදර්ශ ගෙවතු වගාවන් සඳහා ඕනෑම ප්‍රදේශයකටත්, මහා පරිමාණ වගාවක් ලෙස තෙත් සහ අතරමැදි තෙත් කලාප සඳහාත් නිර්දේශ කෙරේ. ස්ථිර ජල සැපයුමක් සහිතව උසස් වගා කළමනාකරණ තත්ත්ව යටතේ ලංකාවේ සෙසු ප්‍රදේශ සඳහාද නිර්දේශ කළ හැක.

සී. ආර්. අයි. එස්. එල්. 2020

දෙමුහුම් වගාදර්ශයන්ගේ බීජ පොල් සිටුවා දෙමුහුම් වගාදර්ශ ලබාගත නොහැකි බැවින්, මෙම වගාදර්ශ බීජ පොල් ලබා ගැනීම සඳහා කිසිසේත්ම නිර්දේශ නොකෙරේ.

මෙම පැළ සිටුවිය යුත්තේ කෙසේද ?

- තනි වගාවක් ලෙස ක්ෂේත්‍රය තුළ පොල් වගා කිරීමේදී ඕනෑම වගාදර්ශයක් සඳහා නිර්දේශය වන්නේ පැළ අතර පරතරය අඩි 26 × අඩි 26 (අක්කරයකට පැළ 64) ලෙස පවත්වා ගැනීම වේ. මෙම පරතරය, වාර්ෂික, අර්ධ බහු වාර්ෂික හා පොල් සමඟ තරඟකාරිත්වය අඩු බහු වාර්ෂික අතුරු බෝග සමඟ පොල් වගාව සඳහාද නිර්දේශ කළ හැක.

- පොල් සමඟ අතුරු බෝග වගාවේදී, බහු වාර්ෂික බෝග යොදා ඉන් වැඩි අස්වැන්නක් ලැබීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, පැළ අතර පරතරය අඩි 26 × අඩි 32 (අක්කරයකට පැළ 52) පවත්වා ගනිමින් අතුරු බෝග ප්‍රමාණය ඉහළ නැංවීමේ හැකියාවද පවතී.

- තේ ඉඩමක සෙවණ සඳහා පොල් වගා කරන්නේ නම්, අඩි 26 × අඩි 40 පරතරයක පැළ සිටුවීම නිර්දේශ කෙරේ.

- කුරුඳු ඉඩමක පොල් වගා කරන්නේ නම් අඩි 26 × අඩි 32 පරතරයක පැළ සිටුවීම නිර්දේශ කෙරේ.

නිවැරදිව පොල් පැළයක් සිටුවන්නේ කෙසේද?

- සිටුවන පැළයකින් ආකර්ෂණීය ඉක්මන් වර්ධනයක් ලබා ගැනීමට නම්, එයට අවශ්‍ය හිතකර පරිසරයක් ලබා දීම සඳහා පහත ආකාරයෙන් පස සකසා ගැනීම කළ යුතු වේ.

- වගා ක්ෂේත්‍රය බොරළු හෝ කබොක් වැනි තද පස් සහිත නම් අඩි 4 × 4 × 4 ප්‍රමාණයෙන්ද, වැලි ලෝම සාමාන්‍ය පස් සහිත ඉඩමක් නම් අඩි 3 × 3 × 3 ප්‍රමාණයෙන්ද වළවල් පිළියෙල කර ගත යුතුය.

- වළ සැකසීමේදී පළමුවෙන් ඉවත් කරන අඩි 1 ක පමණ මතුපිට පස වළෙහි එක පැත්තකටත්, යටි පස තව පැත්තකටත් දමාගත යුතුය.

- කෙඳි පැත්ත උඩට සිටින සේ වළෙහි පතුලට පොල් ලෙලි තට්ටුවක් දමා ඒ මතට මතුපිට පස් තට්ටුවක්ද දැමිය යුතුය. අනතුරුව, කෙඳි පැත්ත උඩට සිටින සේ නැවතත් පොල් ලෙලි තට්ටුවක් දමා ඉතිරි වූ මතුපිට පස් සියල්ල ඒ මතට දැමිය යුතුය. මේ සඳහා වළකට පොල් ලෙලි 30 - 35 ක් පමණ ප්‍රමාණවත්ය.

- යටි පස, වියළි ගොම කිලෝග්‍රෑම් 20 ක් හෝ එළු පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 15 ක්, එප්පාවල රොක් පොස්පේට් කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් සහ ඩොලමයිට් කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් සමඟ මිශ්‍ර කළ යුතුය. මෙම මිශ්‍රණයෙන් වළෙහි ඉතිරි කොටස පුරවා, එහි පැළය සිටුවිය යුතුය.

- අකාබනික පොහොර යොදා ගනිමින් මෙම මිශ්‍රණය සකසන්නේ නම්, යටි පස හා කාබනික පොහොර (වියළි ගොම කිලෝග්‍රෑම් 10 ක් / එළු පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 5 ක්) සමඟ,

  i) යූරියා ග්‍රෑම් 250 ක්, මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් ග්‍රෑම් 250 ක් හා ඩොලමයිට් කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් සමඟ තෙත් හා අතරමැද කලාප සඳහා නම් එප්පාවල රොක් පොස්පේට් ග්‍රෑම් 750 ක් ද, වියළි කලාපය සඳහා නම් ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් ග්‍රෑම් 350 ක් ද වශයෙන් හෝ

  ii) ඩොලමයිට් කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් සමඟ තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා වයි.පී.එම් - ඩබ්ලිව් (YPM – W) ග්‍රෑම් 1250 ක් ද, වියළි කලාපය සඳහා වයි.පී.එම් - ඩී (YPM – D) ග්‍රෑම් 850 ක් ද වශයෙන් යෙදිය හැක.

වළෙහි පොල් ලෙලි තට්ටු වශයෙන් ඇතිරීම

පස් මිශ්‍රණය සකස් කිරීම

පැළය සිටුවීම

සිටවූ පැළය වසුන් කිරීම

නිවැරදිව ශාක පෝෂක සපයන්නේ කෙසේද?

පොල් සඳහා භාවිත කළ හැකි
පොහොර වර්ග

පොල් වගාවට නිර්දේශිත නයිට්‍රජන් (N) පෝෂකය ලබා දීමට යූරියා හෝ ඝන කාබනික ප්‍රභව වන ගොම, එළු, කුකුල් වැනි සත්ත්ව පොහොරත්, ග්ලිරිසිඩියා වැනි කොළ පොහොරත්, කොම්පෝස්ට් වැනි ද්‍රව්‍යත් භාවිත කළ හැකිය.

පොස්පරස් (P) පෝෂකය ලබා දීමට, තෙත් හා අතරමැදි කලාප සඳහා එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP) ද, වියළි කලාපය සඳහා ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් (TSP) ද, මැග්නීසියම් (Mg) පෝෂකය ලබා දීම පිණිස ඩොලමයිට් ද නිර්දේශිත අයුරින් භාවිත කළ යුතුය.

පොටෑසිටම් (K) පෝෂකය, පොල් ලෙලි, වල් සූරියකාන්ත, කෙසෙල් කඳන් හා සත්ත්ව පොහොර වල යම් ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වුවද, එය පොල් ගසේ වර්ධන අවශ්‍යතාවයන්ට ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP), ස්වාභාවික පොටෑසියම් කලෝරයිඩ් (KCl) හෝ ස්වාභාවික සල්ෆේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (SOP) යන පොටෑසියම් ප්‍රභව භාවිත කළ යුතුය.

පොල් ගසක පෝෂක අවශ්‍යතාවය එහි වර්ධක අවධියන් අනුව වෙනස් වන බැවින්, ඒ ඒ අවධි සඳහා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය මගින් ප්‍රධාන ප්‍රභව පදනම් කරගෙන නිර්දේශ හඳුන්වාදී ඇත. මේ සඳහා ක්ෂේත්‍රයෙන් සපයා ගත හැකි කාබනික ප්‍රභව, අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍ය පෝෂක අඩංගු පොහොර වර්ග සමඟ නිර්දේශිත අයුරින් මිශ්‍ර කළ පොහොර සංකලනයක් භාවිත කළ හැක.

පැළ අවධිය සඳහා පොහොර නිර්දේශ

පැළ අවධිය සඳහා නයිට්‍රජන්, පොස්පරස් හා පොටෑසියම් (N,P,K) අවශ්‍යතාවය, යූරියා, එප්පාවල රොක් පොස්පේට්/ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් හා මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් යොදා ගනිමින් අමිශ්‍ර පොහොර ලෙස හෝ පොහොර මිශ්‍රණ වශයෙන් සැකසු නිර්දේශ පවතී. නිර්දේශිත අකාබනික පොහොර මිශ්‍රණ තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා වයි.පී.එම් - ඩබ්ලිව් (YPM – W) ලෙසද, වියළි කලාපය සඳහා වයි.පී.එම් - ඩී (YPM – D) ලෙසද හඳුන්වා දී ඇත. අමිශ්‍ර හෝ මිශ්‍ර පොහොර නිර්දේශ භාවිතයේදී මැග්නීසියම් (Mg) පෝෂකය ලබා දීමට නිර්දේශිත ඩොලමයිට් ප්‍රමාණයන් යෙදිය යුතුය. මෙයට අමතරව කාබනික හා අකාබනික පොහොර මිශ්‍රණ වශයෙන්ද නිර්දේශයන් හඳුන්වා දී ඇති අතර ඒවා පහත සඳහන් වගුවල දක්වා ඇති පරිදි පැළ වලට යෙදිය යුතුය.

නිර්දේශ අංක 01
පැළ වගාව සඳහා අකාබනික පොහොර

පෝෂකය	පොහොර වර්ගය	පොල් පැළයේ වයස (වසර)							වසර 4 සිට වල දරන තෙක්
		1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	
N	යූරියා (ග්‍රෑම්)	190	235	235	305	305	375	375	470
K	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) (ග්‍රෑම්)	190	235	235	305	305	375	375	470
Mg	ඩොලමයිට් (ග්‍රෑම්)	500	500	500	500	500	500	500	500
P	එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP) (ග්‍රෑම්)	420	530	530	690	690	850	850	1060
	හෝ								
	ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් (TSP) (ග්‍රෑම්)	160	200	200	300	300	360	360	400

නිර්දේශ අංක 02
පැළ වගාව සඳහා වයි. පී. එම් - ඩබ්ලිව්. (YPM – W) හා වයි. පී. එම් - ඩී. (YPM – D) පොහොර මිශ්‍රණ භාවිත කරන්නේ නම්, පහත වගුවේ පරිදි පැළයේ වයසට අනුව නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය සමඟ ඩොලමයිට් ග්‍රෑම් 500 බැගින් යෙදිය යුතුය

පොහොර වර්ගය	මාස 06	වසර 01	වසර 1 1/2	වසර 02	වසර 2 1/2	වසර 03	වසර 3 1/2	වසර 4 සිට වල දරන තෙක්
තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා								
වයි.පී.එම් - ඩබ්ලිව් (YPM – W)	800	1000	1000	1300	1300	1600	1600	2000
වියළි කලාපය සඳහා								
වයි.පී.එම් - ඩී (YPM – D)	540	670	670	905	905	1110	1110	1340

නිර්දේශ අංක 03
නයිට්‍රජන් (N) පෝෂකය, ගොම පොහොර පදනම් කරගෙන භාවිත කරන්නේ නම්

පෝෂකය	පොහොර වර්ගය	මාස 06	වසර 01	වසර 02	වසර 03	වසර 4 සිට වල දරන තෙක්
N	ගොම පොහොර (කිලෝග්‍රෑම්) (තෙතමනය 20% - 30%)	05	12	16	20	25
P	එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP) (ග්‍රෑම්)	200	450	600	750	1000
Mg	ඩොලමයිට් (ග්‍රෑම්)	250	250	250	250	250
K	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) (ග්‍රෑම්)	30	200	250	325	400
	හෝ					
	ස්වාභාවික පොටෑසියම් සල්ෆේට් (K_2SO_4) (ග්‍රෑම්)	50	240	300	390	480

නිර්දේශ අංක 04
නයිට්‍රජන් (N) පෝෂකය, එළු පොහොර පදනම් කරගෙන භාවිත කරන්නේ නම්

පෝෂකය	පොහොර වර්ගය	මාස 06	වසර 01	වසර 02	වසර 03	වසර 4 සිට වල දරන තෙක්
N	එළු පොහොර (කිලෝග්‍රෑම්) (තෙතමනය 20% - 30%)	03	07	09	11	13
P	එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP) (ග්‍රෑම්)	220	500	670	850	1150
Mg	ඩොලමයිට් (ග්‍රෑම්)	500	500	500	500	500
K	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) (ග්‍රෑම්)	50	130	170	230	300
	හෝ					
	ස්වාභාවික පොටෑසියම් සල්ෆේට් (K_2SO_4) (ග්‍රෑම්)	60	150	200	270	370

නිර්දේශ අංක 05
නයිට්‍රජන් (N) පෝෂකය, පදම් කළ කුකුල් පොහොර පදනම් කරගෙන භාවිත කරන්නේ නම්

පෝෂකය	පොහොර වර්ගය	මාස 06	වසර 01	වසර 02	වසර 03	වසර 4 සිට වල දරන තෙක්
N	පදම් කළ කුකුල් පොහොර (කිලෝග්‍රෑම්) (තෙතමනය 20% - 30%)	05	12	15	20	23
P	එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP) (ග්‍රෑම්)	100	225	300	400	600
Mg	ඩොලමයිට් (ග්‍රෑම්)	250	250	250	250	250
K	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) (ග්‍රෑම්)	50	125	150	190	240
	හෝ					
	ස්වාභාවික පොටෑසියම් සල්ෆේට් (K_2SO_4) (ග්‍රෑම්)	60	150	180	230	290

නිර්දේශ අංක 06
නයිට්‍රජන් (N) පෝෂකය, ග්ලිරිසිඩියා පදනම් කරගෙන භාවිත කරන්නේ නම්

පෝෂකය	පොහොර වර්ගය	මාස 06	වසර 01	වසර 02	වසර 03	වසර 4 සිට ඵල දරන තෙක්
N	ග්ලිරිසිඩියා (කිලෝග්‍රෑම්) (තෙතමනය 60% - 70%)	05	12	16	20	25
P	එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP) (ග්‍රෑම්)	275	630	830	1040	1375
Mg	ඩොලමයිට් (ග්‍රෑම්)	250	250	250	250	250
K	මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) (ග්‍රෑම්)	60	150	200	250	270
	හෝ					
	ස්වාභාවික පොටෑසියම් සල්ෆේට් (K_2SO_4) (ග්‍රෑම්)	75	180	250	300	375

ඵල දරන පොල් ගස් සඳහා පොහොර නිර්දේශ

ඵල දරන ගස් සඳහා නයිට්‍රජන්, පොස්පරස් හා පොටෑසියම් අවශ්‍යතාවය, යූරියා, එප්පාවල රොක් පොස්පේට්/ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් හා මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් යොදා ගනිමින් අමිශ්‍ර පොහොර ලෙස හෝ පොහොර මිශ්‍රණ වශයෙන් නිර්දේශ පවතී.

ඵල දරන ගසක් සඳහා අමිශ්‍ර අකාබනික පොහොර නිර්දේශය යූරියා ග්‍රෑම් 800ක්, මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) ග්‍රෑම් 1600ක්, ඩොලමයිට් ග්‍රෑම් 1000ක් සමඟ තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා නම් එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP) ග්‍රෑම් 900 ක් ද වියළි කලාපය සඳහා නම් ට්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් (TSP) ග්‍රෑම් 400 ක් ද වශයෙනි.

ගසකට අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණයන් ඒ.පී.එම් - ඩබ්ලිව් (APM – W) හෝ ඒ.පී.එම් - ඩී (APM – D) මිශ්‍රණ සමඟ ලබා දෙන්නේ නම්, තෙත් සහ අතරමැදි කලාප සඳහා ගසකට, ඒ.පී.එම් - ඩබ්ලිව් (APM – W) කිලෝග්‍රෑම් 3.3 ක්ද, වියළි කලාපය සඳහා ඒ.පී.එම් - ඩී (APM – D) කිලෝග්‍රෑම් 2.8 ක්ද ඩොලමයිට් කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් සමඟ යෙදිය යුතුය. ක්ෂේත්‍රයට පහසුවෙන් සපයාගත හැකි කාබනික ද්‍රව්‍ය අනුව, ඵල දරන ගස් සඳහා පහත වගුවේ සඳහන් නිර්දේශයන්ද භාවිත කළ හැක.

කාබනික පොහොර වර්ගය	ප්‍රමාණය (කිලෝග්‍රෑම්)	පොටෑසියම් (K) පෝෂකය	
		මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (ග්‍රෑම්) හෝ	ස්වාභාවික පොටෑසියම් සල්ෆේට් (ග්‍රෑම්)
ගොම පොහොර (තෙතමනය 20% - 30%)	30	1250	1500
එළු පොහොර (තෙතමනය 20% - 30%)	25	800	1250
පදම් කළ කුකුල් පොහොර (තෙතමනය 20% - 30%)	30	750	1000
ග්ලිරිසිඩියා (තෙතමනය 60% - 70%)	30	1000	1350
එප්පාවල රොක් පොස්පේට් (ERP)	0.7		
ඩොලමයිට්	0.5		

වැඩි දියුණු කළ සහ දෙමුහුම් වගාදර්ශ සඳහාත්, පොල් ගසක අස්වැන්න වසරකට ගෙඩි 75 කට වඩා ඉහළ අගයක් පෙන්වන අවස්ථා වලදීත්, ඉහත සඳහන් පෝෂක ප්‍රමාණය මෙන් 1.5 ගුණයක් ගසකට ලබා දිය යුතුය.

කෘෂිකාර්මික කොම්පෝස්ට් අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක අඩංගු පොහොර වර්ග සමඟ පොල් වගාවන් සඳහා භාවිතා කළ හැකි නමුත්, කොම්පෝස්ට් වල පෝෂණ සංයුතිය එය නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය මත සැලකිය යුතු මට්ටමෙන් වෙනස් වීම හේතුවෙන්, ඒ සඳහා පොදු නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කළ නොහැක. කෘෂිකාර්මික කොම්පෝස්ට් වල සංයුතිය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව එයට අදාළ වන නිර්දේශ නිකුත් කළ හැක.

පොල් අතු සහ පොල් වලු එල්ලා වැටීම වළක්වා ගත හැක යන විශ්වාසය මත ලුණු යෙදීම පොල් වගාකරුවන් අතර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයක් බවට පත්ව ඇත. ලුණු යෙදීමෙන් නයිට්‍රජන් පසෙහි රඳවා තබා ගැනීම ඉහළ නැංවිය හැකි නිසා, සාමාන්‍ය ලුණු (NaCl) (අයඩින් අඩංගු නොවන හෝ මඩ ලුණු නොවන) කිලෝග්‍රෑම් 1 ක්, වැඩුණු ගසක් සඳහා වාර්ෂික පොහොර නිර්දේශය සමඟ ගසට යෙදීම වගාකරුවාට වාසිදායක වේ.

වසරකට වරක්, පොල් වගාවේ වයස අනුව නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණ නිර්දේශිත ආකාරයට යෙදිය යුතුය. අධික වර්ෂාවකින් පසු පසේ තෙතමනය පවතින කාලය, පොහොර දැමීම සඳහා යෝග්‍ය වේ. ජලසම්පාදනය කළ හැකි නම්, වසරේ ඕනෑම කාලයක පස තෙත්කර පොහොර යෙදිය හැක.

පැළයේ/ගසේ වයස	පාදස්ථයේ සිට දුර (පොහොර කවය)	
	(අඩි)	(සෙ.මී.)
මාස 06	1	30
වසර 01	2	60
වසර 02	3	90
වසර 03	4	120
වසර 04 සිට මල් හටගැනීම දක්වා	5	150
ඵල දරන ගස්	6	180

පොල් ගසකට පොහොර දැමිය යුතු ආකාරය

පැළ/වැඩුණු ගසක පොහොර කවය (ගසේ සිට පොහොර දමන දුර) ගසේ වයසත් සමඟ වෙනස්වන ආකාරය දකුණු පස වගුවේ සඳහන් කර ඇත.

පොහොර යෙදීම, මතුපිට පොහොර යෙදීම හෝ පාත්තියක් කපා පොහොර යෙදීම යන ආකාර දෙකකින් සිදු කළ හැක.

මතුපිට පොහොර යෙදීම

පැළ/ වැඩුණු ගස් වල වයස අනුව නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය පොහොර කවයේ සෑම තැනම විසුරුවා පොහොර පස් සමඟ හොඳින් මිශ්‍රවන සේ අඟල් 4 - 6 ක් පමණ ගැඹුරට පස කෙටිය යුතුය. ඉන් අනතුරුව, පොහොර දැමූ ප්‍රදේශය වියළි පොල් අතු, පොල් ලෙලි, තණකොළ රොඩු හෝ පාහින ලද අතු වැනි දෙයකින් වසුන් කළ යුතුය.

තෙතමන සංරක්ෂණය සඳහා පොහොර කවයන්හි පෙර යොදා තිබූ වසුන්, පොහොර දැමීමට පෙර රේක්කයකින් ඇද ඉවත් කළ යුතුය. පොහොර කවය තුළ වල් පැළෑටි වැවී ඇත්නම්, ඒවා විසි ගසා මතුපිට පස ඉවත් නොවන අයුරින් ඉවත් කළ යුතුය (මතුපිට පස ඉවත් විය හැකි බැවින් වසුන් ඉවත් කිරීමේදී උදැල්ල භාවිතය හැකිතාක් සීමා කළ යුතුය).

පාත්තියක් කපා පොහොර යෙදීම

මෙහිදී, ගසේ සිට අඩි 3 ක දුරකින් පළල අඩි 3 ක්වූ හා ගැඹුර අඩි 1/2 ක් වූ පාත්තියක් කපා, තෝරාගත් පොහොර මිශ්‍රණය පාත්තිය තුළ විසුරුවා හැර පස් වලින් වසා, පොහොර කවය වසුන් කළ යුතුය. වසුන් යෙදීමේදී, ගසෙහි පාමුල සිට අරය සෙන්ටිමීටර් 15 ක කවයක් වසුනෙන් ආවරණය නොකිරීමට වග බලා ගත යුතුය.



පීදුණු ගසක අඩි 6 ක පොහොර කවය

පාත්තියක් කපා පොහොර යොදන ආකාරය

වසුනක් යොදා කවය ආවරණය කිරීම

පොල් ගසක ජල අවශ්‍යතාවය

වැඩුණු පොල් ගසකට දිනකට ජලය ලීටර් 40 - 60 ක් පමණ අවශ්‍යවේ. මෙම දෛනික ජල අවශ්‍යතාවය සැපයීම ප්‍රායෝගිකව අපහසු බැවින්, පසෙහි තෙතමනය ආරක්ෂා කර ගැනීමට වගාකරුවන් වගබලා ගත යුතුය. වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිලිලීටර් 1200 ට වැඩි කලාප වල තෙතමන සංරක්ෂණය මගින් ගසෙහි ජල අවශ්‍යතාවය සැපයිය හැක. මේ සඳහා, ගස වටා පොහොර කවය වසුන් කිරීම, පොල් ලෙලි වළවල් සැකසීම, ආවරණ බෝග වැවීම, කාණු කැපීම, වැසි ජලය එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රම වැනි පොල් වගාවේ තෙතමන සංරක්ෂණ ක්‍රම යොදා ගත හැක. මෙවැනි ක්‍රම මඟින් තෙතමන සංරක්ෂණයට අමතරව පසට කාබනික ද්‍රව්‍ය එකතුවීම, පෝෂක රඳවා ගැනීම, ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩිවීම, උෂ්ණත්වය පාලනය, වල් පැළෑටි කළමනාකරණය හා පසේ ගුණාත්මය දියුණු වීම වැනි වාසි රැසක් ලැබේ.

තෙතමන සංරක්ෂණය සඳහා පොල් ලෙලි වළවල් සැකසීමේදී, පොල් ගස් දෙකකට එක වළක් බැගින් ස්ථාපනය කරන්නේ නම් වළක ප්‍රමාණය අඩි 8 × 4 × 3 වශයෙන් (පොල් ලෙලි 400 - 450 පමණ) ගස් දෙකට සම දුරින්ද (අක්කරයට වළවල් 32), සෑම පොල් ගසකටම එක වළක් බැගින් නම් වළක ප්‍රමාණය අඩි 4 × 4 × 3 වශයෙන් (පොල් ලෙලි 200 - 250 පමණ) ගසෙහි පොහොර කවයට මායිම්වද (අක්කරයට වළවල් 64) සකස් කර ගත යුතුය..

සාර්ථක පොල් වගාවක් සඳහා වසර පුරා ඒකාකාරීව විසිරුණු වර්ෂාපතනය වඩාත් හිතකර බැවින්, වියළි කාලය මාස දෙකකට වඩා දීර්ඝ වන අවස්ථා වලදී ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් භාවිත කිරීමෙන් වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැක.

VIDEO SCAN ME!

පොහොර කවය පොල් ලෙලි වලින් වසුන් කිරීම

පොල් ලෙලි වළවල් දැමීම

පොල් වගා කරන ප්‍රදේශ වලට වර්ෂාපතනය ලැබෙන කාල වලදී ප්‍රමාණය ඉක්මවා වර්ෂාවක් ලැබුණද එම වැසි ජලය වැඩි ප්‍රමාණයක් වගා භූමියෙහි රඳවා නොගෙන අපතේ යෑම හේතුවෙන් ඉන් පසුව පැමිණෙන වියළි කාලවලදී ජල හිඟතාවයන්ට මුහුණ දෙන වගාව අහිතකර බලපෑම් වලට ලක් විය හැක. එබැවින් වැසි ජලය සංරක්ෂණය සඳහා ඉඩමේ පහත් ස්ථාන වල කුඩා වැව් හෝ පතස් ඉදි කොට නියං කාලවලදී ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ලෙස ජලය එකතු කර ගැනීම කළ යුතුය.

වගාවට ජල සම්පාදනය කළ යුතු අවස්ථාවන්හිදී, ඉඩමෙහි පිහිටීම, පසෙහි ස්වභාවය, ජල ප්‍රභවය, දේශගුණික සාධක, ක්‍රියාකාරී මූල පද්ධතියේ ස්වභාවය සහ තාක්ෂණික සුලබතාවය මත සුදුසු ක්‍රමයක් තීරණය කළ යුතුය.

ක්ෂේත්‍රය තුළ දැනට භාවිතා වන ජල සම්පාදන ක්‍රම අතර නළ (හෝස්) ජල සම්පාදනය, බේසම් ජල සම්පාදනය, බඳුන් ජල සම්පාදනය, විසිරුම් ජල සම්පාදනය, ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදන ක්‍රම (මතුපිට හා භූගත) හා බඳවට විසිරුම් ජල සම්පාදනය යන ක්‍රම පොල් වගාව සඳහා සාර්ථක ක්‍රම ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත.

පොල් වගාව පළිබෝධකයන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගන්නේ කෙසේද ?

කළු කුරුමිණි හානිය

වැඩුණු කළු කුරුමිණියා ගස්වල ගොබය ප්‍රදේශය සිදුරු කරගෙන ළපටි කොටස් ආහාරයට ගැනීම නිසා දිග නොහැරුණු පොල් අතු හා පිතිවලට හානි සිදුවීම හේතුවෙන් අතු දිග හැරීමේදී කතුරකින් කැපුවා සේ දිස්වේ. වැඩුණු ගස් වල හානිය වර්ධනයට බලපෑමක් ඇති නොකළද පොල් පැළ හා නොමේරූ ගස් වල මෙම හානිය නිසා වර්ධනයේ සැළකිය යුතු අඩුවීමක් සිදුවේ. තවද, කුඩා පැළවල වැඩෙන අග්‍රස්ථ අංකුරයට හානි කිරීම නිසා පැළ මියයාමට පවා ලක්විය හැකිය.

කළු කුරුමිණි හානිය වළක්වා ගැනීමට නම්

මෙම කුරුමිණියා බිත්තර දැමීම සිදු කරන්නේ, ගොම, කොහුබත්, දිරායන පොල් ලෙලි ගොඩවල්, දිරාගිය කොටන් ආදියෙහි වන බැවින්, දිගු කාලයක් මෙවැනි දේවල් ක්ෂේත්‍රයෙහි ගොඩ ගසා නොතැබිය යුතුය. පොල් ගස් කැපූ පසු කඳෙහි කොටස් ඉතිරි වී ඇත්නම් ඒවාද ගලවා පුළුස්සා දැමිය යුතුය.

කුඩා පැළ නිතර (සතියකට වරක්වත්) පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය. ගොබය ප්‍රදේශයේ හෝ පැළ ගස් වල පාදස්ථයේ කුරුමිණියන් ඇතුලු වූ සිදුරු වටා වේලී නොගිය අලුත් කෙඳි හෝ හප තිබේනම්, එය කුරුමිණියන් ඇතුලේ සිටින බවට සලකුණක් බැවින්, ඊතලයක් වැනි කම්බි කූරක් භාවිතයෙන් (කුරුමිණි කටුව) සතුන් ඉවත් කළ යුතුය.

කුඩා සිදුරු සහිත මාළු දැල් කැබැල්ලක් ගොබය වටා සහ පිති අතර එතීම මඟින් කුරුමිණියන් ගොබය කරා ළඟා වීම වළක්වා ගත හැකිවේ. පැළයේ වයස වසර 4 ක් පමණ වනතුරු මෙමගින් ආරක්ෂා කර ගත හැකි අතර පැළයේ වර්ධනය සමඟ දැල් කැබැල්ල බුරුල් කර එසවීමට කටයුතු කළ යුතුය.

කුඩා පැළවල පතු බිඩංගය තුළට කපුරු බෝල 2 බැගින් (පැළයකට කපුරු බෝල 6 ක් පමණ) දැමීම මගින් කුරුමිණියන් විකර්ෂණය කර ගත හැකිය.

භූමි තෙල් මිශ්‍ර නොවූ දැවිතෙල් (භාවිතයට ගන්නා ලද එන්ජින් තෙල්) ගොබය ප්‍රදේශයේ පිති වටාත්, කඳෙහි ඇති කැපුම් හා පැළුම් වලත් ආලේප කිරීම කළ යුතුය.

කුඩා කොටු සහිත කම්බි දැලක් (කුකුල් දැල්) පැළය වටා එතීම මගින් කුරුමිණියන්ගෙන් පැළය ආරක්ෂා කර ගත හැකි අතර එය අඟල් 6 ක් පමණ පොළොවට යට කිරීමෙන් ඉත්තෑවන්ගෙන්ද පැළය ආරක්ෂා කර ගත හැක.

කුරුමිණි හානිය අධිකව පවතී නම් සහ වගාව තුළ වැඩුණු කෘමීන් දක්නට ලැබේ නම්, අක්කර 05 කට වඩා වැඩි ඉඩම් සඳහා, අක්කර 05 කට එක් උගුලක් බැගින්, පෙරමෝන උගුල් සවි කළ හැකිය. මෙය ක්ෂේත්‍රයෙහි පැළ වගාවෙන් ඈත්ව හෝ වැට මායිම් වල ස්ථාපිත කළ හැක.

උගුලෙහි ඇති පෙරමෝනය මාස 3 - 4 කට වරක්වත් මාරු කළයුතු අතර මෙම පෙරමෝන අඳාළ ප්‍රදේශයේ පොල් සංවර්ධන නිලධාරීන්ගෙන් සහ කෘෂිරසායන අලෙවි සැල් වලින් මිලදීගත හැක.

කළු කුරුමිණි හානිය දරුණු ලෙස පවතින අවස්ථා වලදී, මෙම පළිබෝධකයා රසායනික ක්‍රම මඟින්ද මර්දනය කළ හැකි අතර ඒ සඳහා සංස්ථානික කැට වශයෙන් අලෙවි කරන කෘමිනාශකයක් යෙදිය යුතුය.

රතු කුරුමිණි හානිය

වයස අවුරුදු 3 - 15 අතර වගාවන්ට හානි කරන මෙම පළිබෝධකයා නිසි අවස්ථාවේ මර්දනය නොකළ හොත් වගාවට මාරාන්තික හානි පැමිණේ. රතු කුරුමිණියාගේ කීට අවස්ථාව කඳෙහි පටක ආහාරයට ගැනීම නිසා ගොබය මැළවී කඩා වැටීමෙන් ගස මිය යාම හෝ කඩා වැටීම සිදුවේ.

මූලික අවධියේදි හානිය හඳුනාගන්නේ කෙසේද ?

මූලික අවධියේදී හානිය හඳුනා ගැනීම පිණිස වගාව නිතර (සතියකට වරක්වත්) හොඳින් පරීක්ෂා කිරීමත්, කඳ ප්‍රදේශය පිරිසිදුව තබා ගැනිමත් කළ යුතුය. පොල් ගස් වල කඳන් වල ඇතිවන කුඩා සිදුරු තුළින් පිටතට ගලා එන දුඹුරු පැහැයෙන් යුත් ඕජස් මගින් හානිය පළමුව හඳුනා ගත හැකිය.

පොල් පිති කඳට සම්බන්ධ වන ස්ථානවල කෙඳිමය කෝෂ හමුවීම, අතු කහ පාටවීම, ගොබය මැළවී පැත්තකට ඇලවීම, කඳට කන තබා බැලීමේදි කීටයින් ආහාර ගන්නා ශබ්දය ඇසීම හානිය හඳුනාගත හැකි තවත් ලක්ෂණයි. හොඳින් පුහුණු නොවූ කනකට කඳ තුළ සිටින කීටයන්ගේ ශබ්දය හඳුනා ගැනීම අපහසු විය හැකි බැවින් ඒ සඳහා රතු කුරුමිණියන් හඳුනා ගැනීමේ උපකරණය භාවිතා කළ හැක.

රතු කුරුමිණියන් බිත්තර දමන්නේ ගසේ අලුතින් ඇති වූ තුවාල මත හෝ පිතිවල නිරාවරණය වූ ළපටි කොටස් මත බැවින්, කළු කුරුමිණි හානිය වළක්වා ගැනීම නිවැරදිව කිරීම තුළින්, රතු කුරුමිණි හානිය බොහෝ සෙයින් වළක්වා ගත හැක.

මෙහිදී, කඳන් මත හා පිතිමත ඇති කැපුම්/පැළුම් මත දැවිතෙල් ආලේප කිරීම, කඳෙන් ඕජස් වෑස්සීමක් පවතී නම් ඒවාට ප්‍රතිකාර කිරීම හා හානියට පත්වූ ගස් ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත්කර පුළුස්සා දැමීම කළ යුතුය.

රතු කුරුමිණියන් මර්දනයටද පෙරමෝන උගුල් යොදාගත හැක. මේවා පළිබෝධ ගහනය ඉතාමත් අධික අවස්ථාවේදී වගාව තුළ වැඩුණු කෘමීන් දක්නට ලැබේනම්, අක්කර 05 ට වැඩි ඉඩම් සඳහා භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කෙරේ. අක්කරයට පෙරමෝන උගුල් දෙක බැගින් ක්ෂේත්‍රය තුළ ස්ථාපිත කළ යුතු අතර, පෙරමෝනය මාස 3 - 4 කට වරක්වත් මාරු කළ යුතුය. මෙම පෙරමෝනය පොල් පර්යේෂණ ආයතනයෙන්, පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයෙන් සහ කෘෂි රසායන අලෙවි සැල් වලින් මිලදී ගත හැක.

රතු කුරුමිණියා රසායනික ක්‍රම මඟින් මර්දනය කිරීම සඳහා මොනොක්‍රොටොෆොස් 60 එස්. එල්. නම් කෘමිනාශකය නිර්දේශ කොට ඇත. කඳ නොබේරුණු ගසකට කෘමිනාශකය මිලිලීටර් 10 ක ප්‍රමාණයක් ජලය මිලිලීටර් 500 ක් සමඟ මිශ්‍ර කර ගසේ ගොබය ප්‍රදේශය හොඳින් තෙත් වන ලෙස කරටියට දැමීම කළ යුතුය. හොඳින් කඳ බේරී ඇති ගස් සඳහා, කඳ පාමුල වට ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 100 ට අඩු ගසකට මිලිලීටර් 30 ක් හා කඳ පාමුල වට ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 100 ට වැඩි ගසකට මිලිලීටර් 40 ක් වශයෙන් කෘමිනාශකය යෙදිය යුතුය. මේ සඳහා හානියට භාජනය නොවූ නිරෝගී පටක ඇති ස්ථාන දෙකක් හානිවූ ගසේ දෙපැත්තෙන් තෝරා ගෙන යවකාරයක් හෝ විදුලි විදිනයක් භාවිතා කර සිදුරක ගැඹුර සෙන්ටිමීටර් 10 ක් පමණද, විෂ්කම්භය මිලිමීටර් 13 ක් පමණ ද වන සිදුරු දෙකක් අංශක 45 ක කෝණයක හැඩයට විද සිරින්ජරයක් භාවිතා කර ඉහත සඳහන් නිර්දේශිත කෘමිනාශක ප්‍රමාණ ජලය මිශ්‍ර නොකර සිදුරු 02 ට සමානව යෙදිය යුතුය.

ඉහත කෘමිනාශකයට අමතරව තයෝමෙතොක්සාම් 20% + ක්ලෝරැන්ට්‍රැනිලිප්‍රෝල් 20% මිශ්‍රණය (වෙළඳ නාමය - වර්ටැකෝ 40% ඩබ්. ජී.) ග්‍රෑම් 04 ක් වතුර මිලිලීටර් 250 ක දිය කර සාදා ගත් ද්‍රාවණයෙන් මිලිලීටර් 60 ක්, රතු කුරුමිණි හානියට ලක් වූ ගසක හානිවූ ස්ථානයට ආසන්නව කඳ දෙපස උස මට්ටම් 2 කින් ගැඹුර සෙන්ටිමීටර් 10 ක් පමණ හා විෂ්කම්භය මිලිමීටර් 13 ක් පමණ සිදුරු 2 ක් අංශක 45 ක ආනතියකින් විද සිරිංජයක් මඟින් සිදුරු දෙකට සමානව යෙදිය යුතුය. පොල් ගසේ කඳේ උස අඩි 5 කට වැඩිනම් තවත් එවැනිම සිදුරු දෙකක් අඩි 5 මට්ටමට ඉහළින් සාදා තවත් මිලිලීටර් 60 ක් සමානව ඒවාට යෙදිය යුතුය.

කෘමිනාශක යොදා සතියකින් පමණ පසුව එම සිදුරු වැලි, සිමෙන්ති මිශ්‍රණයකින් වසා දැමිය යුතුය. එයට අමතරව රතු කුරුමිණි හානිය නිසා කඳේ ඇති වී තිබෙන සිදුරු වසා දැමීමට කටයුතු කළ යුතුය. හානිය දරුණු අවස්ථා වලදී සහ කෘමිනාශකය යෙදුවද ඕජස් ගැලීම් වැනි තත්ත්වයන් තවදුරටත් පවතී නම් නැවත සති 02 කින් අලුත් සිදුරු 02 ක් පෙර ආකාරයට විද නැවත කෘමිනාශකය නිර්දේශිත ප්‍රමාණ වලින්ම යෙදිය යුතුය.

පොල් මයිටා හානිය

ශ්‍රී ලංකාවට පිටරටින් ආක්‍රමණය වූ පළිබෝධකයෙක් වන ඇසේරියා පොල් මයිටාවා, පොල් ගෙඩියේ තැරිය යට ජීවත් වෙමින් පොත්තේ මෘදු පටකවලින් යුෂ උරා බොන පියවි ඇසට නොපෙනෙන අන්වීක්ෂීය ජීවියෙකි.

පොල් මයිටාවන්ගේ අන්වීක්ෂීය පෙනුම

මයිටා හානියේ ලක්ෂණ හඳුනාගන්නේ කෙසේද ?

- මාස 3 - 6 අතර වයසෙහි ගෙඩි වැඩිපුර ආසාදනයට ලක්වේ.
- හානිය ආරම්භයේදී තැරියට පහළින් කුඩා කහ/සුදු පැහැති ත්‍රිකෝණාකාර ලපයක් ඇති වෙන අතර දිගින් දිගටම යුෂ උරා බීම නිසා ගෙඩියේ වර්ධනයත් සමග මෙම ලපය ක්‍රමයෙන් විශාල වී දුඹුරු පැහැ ගැන්වේ.
- පසුව ගෙඩියේ මතුපිට ඉරිතැලී, වියළී යාම නිසා ගෙඩියේ වර්ධනයට බාධාවී ගෙඩිය කුඩාවීම, විකෘතිවීම හා පැලීයාම සිදුවිය හැක.

හානියට ලක්වූ පොල් වල්ලක්

හානිය සහිත ගෙඩියක්

VIDEO SCAN ME!

මයිටා හානිය අවම කිරීම

හානිය මුළුමනින්ම තුරන් කිරීමට අපහසු අතර, පාම්/එළවළු තෙල් සහ ගෙන්දගම් මිශ්‍රණය ඉසීම මගින් අවම කළ හැක. මෙම මිශ්‍රණයෙන් ලීටරයක් සාදා ගැනීම සඳහා වතුර මිලිලීටර් 800 කට, සබන් කුඩු ග්‍රෑම් 12 ක් සහ ජලයේ දියවන ගෙන්දගම් කුඩු ග්‍රෑම් 05 ක් දියකර සාදා ගන්නා ද්‍රාවණයට පාම්/ එළවළු තෙල් මිලිලීටර් 200 ක් එක්කර හොඳින් මිශ්‍ර කළ යුතුය. මෙම මිශ්‍රණය ලීටර් 1 ක් මයිටා හානිය ඇති ගසක කරටියේ සියලුම වලු හොඳින් තෙමෙන සේ ඉසිය යුතුය. මාස 6 කට වරක් අලුතින්ම ඇරුණු මල හැර අනෙකුත් වලු වලට (බැට්ටා වලුද ඇතුළුව) ඉසීම කළ යුතුය (විශේෂයෙන් පෙබරවාරි, ජූලි - අගෝස්තු කාල වලදී ඉසීම නිර්දේශ කෙරේ).

පොල් මයිටා හානිය අවම කිරීම සඳහා පේව පාලන ක්‍රමයක් ලෙස දේශීයව සොයා ගන්නා ලද විලෝපික මයිටාවකු පොල් පර්යේෂණ ආයතනය මගින් නිර්දේශයක් ලෙස හඳුන්වා දී ඇත. මෙම විලෝපික මයිටාවන් විද්‍යාගාරයේ නිෂ්පාදනය කර, කුඩා පොලිප්‍රොපිලීන් බෑගයක වගාකරුවන්ට ලබාදෙන අතර ගස් නැගුම්කරුවෙකු ලවා හෝ කෙක්කක ආධාරයෙන් විලෝපික මයිටාවන් සහිත කුඩා පොලිප්‍රොපිලීන් බෑගයේ කොනක් සිදුරුකර හානිය සහිත බැට්ටා අතර රැඳවීම කළ යුතුය. විලෝපික මයිටාවන් නිදහස් කිරීමේ නිර්දේශය වන්නේ, වගාවේ සෑම ගස් හතරකින් හානිය සහිත එක් ගසකට එක් පැකැට්ටුක් බැගිනි. උදාහරණයක් ලෙස හානිය සහිත ගස් සියයක් ඇත්නම් මයිටා හානිය දැකගත හැකි ගස් 25 කට වගාව පුරා ව්‍යාප්ත වන ලෙස පැකට් 25ක් දැමිය යුතුයි. වර්ෂාව අවසන් වී වියළි කාලය ආරම්භ වන විට මෙම ප්‍රතිකාරය කිරීමෙන් වඩා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැක. එසේම අවම වශයෙන් එක දිගට වසර දෙකක්වත් මාස 3 - 4 කට වරක් (වර්ෂා කාලය හැර) විලෝපික මයිටාවන් යෙදීම කළ යුතුය. මෙම විලෝපික මයිටාවන් පොල් පර්යේෂණ ආයතනයෙන් සහ පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයෙන් මිලදීගත හැක.

සුදු මැස්සාගේ හානිය

සුදු පැහැති කුඩා කෘමියකු වන සුදු මැස්සා පොල් පැළ සහ වැඩුණු ගස් වල පත්‍රිකා වලින් යුෂ උරා බී හානිය සිදු කරයි. පත්‍රවල යටි පැත්තේ සුදු පැහැගත් පුළුන් මෙන් දක්නට ලැබෙන මෙම කෘමියාගේ ජීවන චක්‍රයේ විවිධ අවස්ථා මගින් හානිය හඳුනා ගත හැක. සුදු මැස්සාගේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පිට කරන පැණි වැනි ඇලෙන සුළු ද්‍රාවණයක් ගස්වල පහළ මාලයේ අතුවල මතුපිට තැන්පත් වීමෙන් එම පත්‍රිකා කළු දිලිර රෝගයට ලක්වේ. මෙම පළිබෝධකයා රසායනික ක්‍රම මගින් මර්දනය කළ යුතු අතර මේ සඳහා තයෝමෙතොක්සාම් ග්‍රෑම් 3 ක් හෝ කාබොසල්ෆාන් මිලිලීටර් 20 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දියකර පත්‍රිකාවල යටි පැත්ත හොඳින් තෙමෙන පරිදි ඉසිය යුතුය. මෙයට අමතරව, ක්ලෝරැන්ට්‍රැනිලිප්‍රෝල් සහ තයෝමෙතොක්සාම් අඩංගු කෘමිනාශකයකින් ග්‍රෑම් 2.5 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දියකර පත්‍රිකාවල යටි පැත්ත හොඳින් තෙමෙන පරිදි ඉසීමද කළ හැක.

ප්ලෙසිස්පා කුරුමිණි හානිය

තවාන් පැළ සහ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන ලද කුඩා පැළවලට හානිකරන ප්ලෙසිස්පා කුරුමිණියා මගින් පැළවල වර්ධනය බාලවීම සිදුවේ. හානියට ලක්වූ පොල් පැළවල පත්‍රිකා ක්‍රමයෙන් දුඹුරු පැහැ ගැන්වී වියළී යාමක් නිරීක්ෂණය කළ හැක. මෙම හේතුවෙන් තවාන් පැළ වල ගුණාත්මයෙහි අඩු වීමක් සිදුවේ.

පත්‍ර වලට සිදුවූ ප්ලෙසිස්පා හානිය දැකගත හැකි වන්නේ ගොබය විවෘත වූ පසුවය. හානිය හා ජීවී සතුන් දක්නට ලැබේ නම් කාබොසල්ෆාන් (Carbosulfan) එස්. සී. 20 (වෙළඳ නාමය - මාෂල් 20 එස්. සී.) මිලිලීටර් 3 - 4 ක් ජලය ලීටරයක මිශ්‍ර කර ගොබය ප්‍රදේශය හෙඳින් තෙමෙන සේ ඉසීම අත්‍යාවශ්‍යය. ප්‍රතිකාර කළ පසුවද තවදුරටත් ක්ෂේත්‍රය තුළ කෘමී හානිය දක්නට ලැබේ නම්, සති 03 කට පමණ පසු නැවත වරක් නිර්දේශයට අනුව කෘමිනාශක ඉසිය යුතුය

පොල් දළඹු හානිය

පොල් පත්‍රිකා වල යටිපැත්තේ පටක ආහාරයට ගැනීම මගින් හානිය සිදුකරයි. විශාල වශයෙන් පත්‍රවල හානි කිරීම නිසා පොල් අස්වැන්න අඩුවීමකට ලක්වේ. හානිය හේතුවෙන් පත්‍රිකා ක්‍රමයෙන් දුඹුරු පැහැ ගැන්වී වියළී යාමක් නිරීක්ෂණය කළ හැක. ක්ෂේත්‍රය තුළ විශාල වශයෙන් පොල් දළඹු හානිය පවතීනම් පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ උපදෙස් මත පර්යේෂණාගාර වල අභිජනනය කළ පරපෝෂිතයෙකු මගින් මෙම හානිය මර්දනය කළ හැකිය.

පොල් දළඹුවා රසායනික ක්‍රම මඟින් මර්දනය කිරීම පිණිස හානියට පත් පැළ සහ නොමේරූ පොල් ගස් සඳහා කාබොසල්ෆාන් (Carbosulfan) එස්. සී. 20 (වෙළඳ නාමය - මාෂල් 20 එස්. සී.) කෘමිනාශකය මිලිලීටර් 4 ක් ජලය ලීටරයක දියකර ඉසීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

පරපෝෂිතයන් මගින් මර්දනය කළ නොහැකි වසංගත තත්ත්වයන් හිදී වැඩුණු පොල් ගස් සඳහා මොනොක්‍රොටොෆොස් 60 එස් එල් මිලිලීටර් 8 ක් කඳ විද එන්නත් කළ යුතුය.

වෙනත් හානි

ඉහත සඳහන් ප්‍රධාන කෘමි හානි වලට අමතරව ඉත්තෑවන් වැනි ක්ෂීරපායී සතුන්ද කෂේත්‍රය තුළ වගා හානියන්ට දායක වෙයි. කුඩා කොටු සහිත කම්බි දැල් (කුකුල් දැල්), බැරල් වැනි ආරක්ෂිත යාන්ත්‍රික ක්‍රම මගින් පොල් පැළ වල මුල ප්‍රදේශය ආවරණය කිරීම මගින් හානිය වළක්වාගත හැක. රිළවුන්, වඳුරන්, දඬුලේනුන් හෝ අලින්ගෙන් සිදුවන හානිය අවම කිරීමට එම සතුන් බිය ගැන්වීම මගින් පළවා හැරීම කළ යුතුය. මේ සඳහා රතිඤ්ඤා දැමීම හෝ වායු රයිෆල භාවිත කිරීම සිදු කළ හැක. අලින් නිරතුරුවම ගැවසෙන ප්‍රදේශ වල නම් අලි වැට ඉදිකිරීම මගින් සතුන් ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළුවීම වැළැක්වීම කළ යුතුයි.

පොල් වගාවේ
ප්‍රධාන රෝග පාලනය

වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගය

වැලිගම පොල් කොළ මැලවීමේ රෝගය, 2006 වසරේදී වැලිගම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී මේ වනවිට දකුණු පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ බහුතරයක පැතිරී ඇති ෆයිටොප්ලාස්මා නම් ව්‍යාධිජනකයා විසින් ඇතිකරන රෝගී තත්ත්වයකි. මෙම රෝගය, පත්‍රිකා පැතලිව ඉළ ඇට මෙන් වක් වීම, පහත මාලයේ අතු කහ වීම (කලාතුරකින් මැද මාලයේද දැකිය හැක) හා කහ පැහැවූ පත්‍රිකාවල දාරයන් වියළී යාම යන රෝග ලක්ෂණ මගින් හඳුනා ගත හැක. රෝගී ගස් හඳුනාගෙන ක්ෂේත්‍රය තුළින් ඉවත්කර, කරටිය කොටස පුළුස්සා දැමීම මගින් අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට රෝගය පැතිරීයාම පාලනය කරනු ලබයි.

ගොබ කුණුවීමේ රෝගය

ගොබ කුණුවීම "පයිටොප්තොරා පාමිවොරා" නම් දිලීරය ආසාදනය වීමෙන් පොල් ගසට සෑදෙන මාරාන්තික රෝගයකි. පළමුව ගොක් අත්තේ දිලිසෙන ස්වභාවය නැති වී ඇති වන මැළවීම ක්‍රමයෙන් අවට අතු දක්වා විහිදෙන අතර ගොබය ප්‍රදේශයෙහි පත්‍රිකා වල දුඹුරු පැහැති පැල්ලම් දැකගත හැකි වේ. රෝගය උත්සන්න වූ විට ගොබය පහසුවෙන් අතට ගැලවී එන අතර එයින් තද දුඟඳක් ද වහනය වේ. පසුව මැළවී ගිය ගොබය හා අතු වියළී, ගොබය කඩා වැටීම සිදුවේ. රෝගය බොහෝ විට හඳුනාගත හැක්කේ අග්‍රස්ථ අංකුරය කුණු වී විනාශ වූ පසුව බැවින් එවැනි ගස් ආරක්ෂා කර ගත නොහැකිය.

රෝගයේ උච්ච අවස්ථාවේදී හඳුනා ගන්නා පොල් ගස්, දිලීරය විනාශ කිරීම සඳහා කපා පුළුස්සා දැමීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුය. රෝගය මුල් අවධියේම හඳුනා ගැනීමට හැකිවුණි නම්, බෝඩෝ මිශ්‍රණයෙන් හෝ ඩයි තයෝ කාබමේට් අඩංගු දිලීර නාශකයකින් ග්‍රෑම් 5 - 6 ක් / මෙටලැක්සිල් අඩංගු දිලීර නාශකයකින් ග්‍රෑම් 4 ක් / ටෙබියුකොනසෝල් අඩංගු දිලීර නාශකයකින් මිලිලීටර් 4 ක් වතුර ලීටරයක දියකර සාදාගත් මිශ්‍රණයකින් පිති ඈත් කර ගොබය හොඳින් තෙමා හැරිය යුතුය. ඉහත සඳහන් දිලීර නාශක වල ගිල්වන ලද කොහුබත් අඩංගු දිලීර නාශක පොට්ටනියක් ගොබයට ආසන්නම පිති අතර තැබීමෙන්ද රෝගය වළක්වා ගත හැකිය.

කොළ පුල්ලි රෝගය

"පෙස්ටලෝෂියොප්සිස් පාමේරම්" සහ "බයිපොලාරිස් ඉන්කවේටා" නම් පරපෝෂිත දිලීර මඟින් ඇති කරන කොළ පුල්ලි රෝගය පොල් පැළ සහ ළපටි පොල් වගාවන් වල සුලභව දක්නට ලැබෙන රෝග යකි. රෝගයේ මුල් අවස්ථාවේදී පත්‍ර වල දක්නට ලැබෙන කුඩා කහ පැහැයට හුරු දුඹුරු පුල්ලි ක්‍රමයෙන් විශාල හා දුඹුරු පැහැවී කාලයත් සමඟ එකට සම්බන්ධවී විශාල දුඹුරු පැහැති පැල්ලම්ව පත්‍ර වියළී යාම සිදුවේ. පොල් ගසේ පහත මාලයේ අතු වල රෝග ලක්ෂණ වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබේ.

දුර්වල පොල් ගස් වල මේ රෝගය වැඩි වශයෙන් දක්නට ඇති බැවින් නිර්දේශිත කාලාන්තර වලින් පොහොර යෙදීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුය. පොහොර යොදන ඉඩම් වලද මෙම රෝගය දක්නට ඇත්නම් පොල් පැළයකට/ පැළ පොල් ගසකට මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (60% K_2O) ග්‍රෑම් 250 ක් හෝ මුළුතැන්ගෙයි අළු කිලෝග්‍රෑම් 5 ලෙසද, වැඩුණු පොල් ගසකට නම් මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (60% K_2O) ග්‍රෑම් 500 ක් හෝ මුළුතැන්ගෙයි අළු කිලෝග්‍රෑම් 10 වශයෙන්ද සෑම මාස හයකට වරක්, පස තෙත් කාලයේදී අලුතින් රෝග ලක්ෂණ ඇතිවීම පහවන තුරු යෙදිය යුතුය. රසායනික පොහොර යෙදීමෙන් පසුව ද කොළ පුල්ලි රෝගය අඩු නොවේ නම් දිලීර නාශකයක් යෙදීම ගැන සලකා බැලිය යුතුය.

පොල් ඉඩමක
අතුරු බෝග
වගාවක් කළ හැක්කේ කෙසේද?

ශ්‍රී ලංකාවේ බහුතරයක් පොල් ඉඩම් හිමියන්, තනි වගාවක් ලෙස පොල් වගාව පවත්වා ගෙන යයි. තනි වගාවක් ලෙස පොල් වගා කිරීම මඟින් ඉඩමේ ඵලදායීතාවය අඩු වන අතර එය අකාර්යක්ෂම භූමි කළමනාකරණයක් ද වේ.

පොල් වගා භූමිය උපරිම ලෙස යොදා ගැනීම තුළින් ඉන් ලැබෙන ආර්ථික ප්‍රතිලාභය ඉහළ මට්ටමක රඳවා තබා ගැනීම සඳහා අතුරු බෝග වගා කිරීම විකල්ප විසඳුමක් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත. ගැලපෙන අතුරු බෝග එකක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් පොල් වගාව සමඟ වගා කිරීම මඟින් භූමිය උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනෙන අතර එමඟින් අතිරේක වාසි රැසක් සැලසේ. පොල් වගාවේ යොදා ගැනෙන පාංශු යෝග්‍යතා පංතීන් වන S_3, S_4 ,S_5 යන පංතීන් වලට අයත් පස් සහිත ඉඩම්වල පොල් තනි වගාවක් ලෙස වගා කිරීමේ දී වගාව ලාභදායී ලෙස නඩත්තු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ආදායමක් නොලැබෙන හෙයින් එවැනි ඉඩම්වල අතුරු බෝග වගා කිරීමෙන් වඩා හොඳ ආදායමක් ලබාගත හැක.

පොල් ඉඩමක සාර්ථකව වගා කළ හැකි අතුරු බෝග සහ වගා පද්ධති 100 ක් පමණ ප්‍රමාණයක් ඇති නමුත්, වගාව ආරම්භ කිරීමට පෙර වගාකරුවා විසින් එම ප්‍රදේශයේ කෘෂි දේශගුණික තත්ත්වයන්, වගා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතුරු බෝගයට ඇති ඉල්ලුම, ගුණාත්මක රෝපණ ද්‍රව්‍ය වල සුලබතාවය, පොල් වගාවේ වයස, වගා බිමෙහි පසෙහි ස්වභාවය, ජල හා පෝෂක ද්‍රව්‍ය සැපයීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුය.

පැළ සිටුවා වසර 5 ක් දක්වා පොල් වගාවක් තුළ අන්නාසි, වැල් දොඩම්, ගස්ලබු, කෙසෙල්, එළවළු, මැස්සැඳෑක්කා, සෝයා බෝංචි, බඩ ඉරිඟු, සූරියකාන්ත හා බෙහෙත් පැළෑටි වගා කළ හැක.

වයස අවුරුදු 6 - 20 දක්වා වයසැති පොල් වගාවක් තුළ සෙවණට ඔරොත්තුදෙන කිරි අල, කොච්චි, නයිමිරිස්, ඉඟුරු සහ කහ ඉතා සාර්ථකව වගා කළ හැක.

වයස අවුරුදු 20 හි සිට යටි වගාව හෝ නැවත වගාව අරඹන තෙක් පොල් වගාවක් තුළ බහුවාර්ෂික හෝ අර්ධ බහුවාර්ෂික අතුරු බෝග වගා කිරීමට හැකියාව පවතී (උදා: ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කෙසෙල්, අන්නාසි, අඹ, කජු, ඉඟුරු, වැල් දොඩම්, අලිපේර, දුරියන්, හෝ පේර වැනි).

යටි වගාව හෝ නැවත වගාව අරඹන අවදියේදී පොල් වගාවක් තුළ ඒ සඳහා අවකාශ සැපයිය යුතු බැවින් වාර්ෂික හෝ අර්ධ බහුවාර්ෂික වැනි කෙටිකාලීන අතුරු බෝගයන් වගා කළ හැක.

පොල් වගාව තුළ
සත්ත්ව පාලනය
කරන්නේ කෙසේද?

VIDEO SCAN ME!

පොල් ඉඩම් වල ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීම, කාබනික පොහොර සපයා ගැනීම හා වල් පැළෑටි කළමනාකරණය සඳහා වැයවන පිරිවැය අඩුකිරීම අරමුණුකොට ගෙන සත්ත්ව පාලනය කළ හැක.

එළ ගවයන්, මීගවයන්, එළුවන් හා බැටළුවන් වැනි රෝමාන්ථික සතුන් පොල් වගාව තුළ බහුලවම පාලනයවන අතර ඌරන් සහ කුකුළන් පාලනයද සාර්ථකව පවත්වාගෙන යෑමේ හැකියාව පවති. පොල් වතුවල පවතින ප්‍රධාන ගැටළුවක් වන වල් පැළෑටි පාලනය කිරීම සඳහා ගවයින්, බැටළුවන් සහ එළුවන් සාර්ථකව යොදාගත හැකි අතර මෙම සතුන්ගෙන් ලැබෙන පොහොර ක්‍රමානුකූලව පොල් වගාවට යෙදීමෙන් පසේ සහ වගාවේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට හැකියාවක් ඇත.

සත්ත්ව නිෂ්පාදන වලින් ලැබෙන ආදායමට අමතරව, වල් පැළ පාලනය කිරීම සහ ගුණාත්මයෙන් උසස් කාබනික පොහොර ඉඩම තුළින්ම ලබා ගැනීමට හැකිවීම මෙම ඒකාබද්ධ පාලන ක්‍රමයේ සුවිශේෂී වාසියයි. තවද, පොල් වගාවක් තුළ තෘණ වගා කිරීම සඳහා ඉහළ විභවයක් පවතින බැවින් ඒ හා ඒකාබද්ධව සත්ත්ව පාලනය කිරීමෙන් වගාකරුවාට වැඩි වාසියක් ලබාගත හැකිය.

පොල් වගාව සමග මී මැසි පාලනය කිරීම තුළින් පරාගණ ක්‍රියාවලිය වඩා සාර්ථකව සිදුවන අතර එමගින් අස්වනු ඉහළ යෑමක් අපේක්ෂා කළ හැක.

පොල් වගාව තුළ

වල් පැළෑටි කළමනාකරණය

කරන්නේ කෙසේද?

වල් පැළෑටිවල ජීවන චක්‍ර, ක්ෂේත්‍රයේ පැතිරී ඇති ප්‍රමාණය හා පාරිසරික සාධක සැලකිල්ලට ගෙන කළමනාකරණය කිරීම කළ යුතුය.

තණකොළ කපන අත්යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම, තැටි නගුල යොදා සී සෑම, හැරෝ කිරීම සහ ට්‍රැක්ටරයක් මඟින් තණකොළ කැපීම වැනි යාන්ත්‍රික ක්‍රම වල් පැළෑටි කළමනාකරණය සඳහා බහුලව යොදා ගනී.

ආවරණ බෝග (පියුරේරියා, කැලපොගෝනියම්, සෙන්ට්‍රොසීමා) හා අතුරු බෝග විධිමත්ව වගාකිරීම තුළින් ද, සත්ත්ව පාලනයේදී ඇතිවන උලාකෑම මඟින් ද, වසුන් යෙදීම වැනි තෙතමන සංරක්ෂණ ක්‍රම මඟින් ද, වල් පැළෑටි කළමනාකරණය සිදු කළ හැක.

ගෙදරට පොල් ගෙවත්තෙන්ම

ඔබ ජීවත් වන කුඩා ගෙවත්තේ වුවද පොල් ගසක් හෝ කිහිපයක් සිටුවා එයින් දෛනික පොල් අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට ඔබටත් හැකියාවක් ඇත. ගෙවත්තක ඇති ඉඩකඩ සීමාසහිත බැවින් ගෙවත්තේ සහ ගොඩනැගිලි වල අලංකාරය ආදී කරුණු සලකා සිටුවන පැළයට ඉතා හොඳින් හිරු එළිය ලැබෙන සෙවණ රහිත ස්ථානයක් තෝරා ගැනීම වැදගත් වේ. ඒ සඳහා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය මඟින් ගෙවතු වගාවට සුදුසු වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දෙන අවුරුදු 3 - 4 කින් ඵල දරන උසස් දෙමුහුම් ප්‍රභේද හඳුන්වා දී ඇති බැවින් නිර්දේශිත ආකාරයෙන් පොල් පැළයක් සිටුවා නිවැරදිව රැක බලා ගැනීම තුළින් සාර්ථක ඵලදාවක් ලබා ගැනීමට කප්රුක අත්පොතෙහි ඇතුළත් කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම ඉතා වැදගත්ය. ඔබගේ වගාවන් නිරතුරුව පළිබෝධ හා රෝග වලට ගොදුරු විය හැකි බැවින්, ඒ පිළිබඳව නිරතුරු සුපරීක්ෂාකාරීව නිර්දේශිත වගා පාලන ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් සිදුවිය හැකි හානිය අවම කර ගත යුතුය.

මෙයට අමතරව වැඩෙන පොල් පැළයේ සිට අඩි 2 කට පමණ පිටතින් පළල අඩි 2 ක් පමණ අඟල් 6 ක් පමණ ගැඹුරට ගස වටා පාත්තියක් කපා එම පස් වැටියක් ආකාරයට ගස වටා සකස් කොට විටින් විට ගෙදරදොර එකතුවන කොළ අතු, සත්ත්ව පොහොර, අළු සහ කුස්සියෙන් ඉවතලන කොටස් ඉහත පාත්තියට යෙදීමෙන් ගසට අවශ්‍ය පෝෂක සෑදීමක් හා පසේ වියළීමද පාලනය කරයි. ඔබගේ ගෙවත්තේ මල් වගාවට වියළි කාලයේ ජලය යොදන සෑම අවස්ථාවකදීම පොල් ගස් වල පාත්තිය තුළට ජලය යෙදීම මඟින් ලබා ගත හැකි ගෙඩි ගණන වැඩි කරගත හැකිය. ඔබගේ කුස්සියෙන් සහ නාන ස්ථාන වලින් දිනපතා අපතේ යන ජලය මතුපිටින් යෙදිය හැකි නළ මාර්ගයක් ආධාරයෙන් පොල් ගසේ මූල ප්‍රදේශයට යොමු කිරීමෙන් ගස්වල වර්ධනය සහ ඵලදාව පහසුවෙන්ම වැඩි කළ හැකිය. ඔබගේ ගෙවත්තෙහි සීමාසහිත ඉඩකඩ මනා ලෙස සැලසුම් කර පොල් ගස් අතර වෙනත් එළවලු සහ පළතුරු බෝග විධිමත්ව වගා කිරීමෙන් පොල් වලට අමතරව ගෘහස්ථ එළවළු සහ පළතුරු අවශ්‍යතා සපුරාගත හැකිය. මෙසේ ගෙවත්තේ පොල් ගසක් වවා ඔබේ දෛනික පොල් අවශ්‍යතාවය සපුරාගත හැකි නම් ආර්ථික වාසියක් මෙන්ම මානසික තෘප්තියක්ද ඔබ කරා ළඟා වනු ඇත.

ගෘහස්ථ පොල් පරිභෝජනයේදී සිදුවන නාස්තිය අවම කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගෘහස්ථ පොල් පරිභෝජනය ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර වාර්ෂික ජාතික පොල් නිෂ්පාදනයෙන් ගෙඩි මිලියන 1700 - 1800 ක් පමණ ඒ සඳහා වැයවේ. මෙය දේශීය ආර්ථිකය තුළ පොල් මිළ උච්ඡාවචනය සඳහා සෘජුවම බලපානු ඇත.

පොල් මදයක අඩංගු පෝෂ්‍ය පදාර්ථ කිරි වලට නිස්සාරණය වන ප්‍රමාණය පොල් මිරිකීම සිදුකරන ක්‍රමවේදය මත රඳා පවතී. අතින් මිරිකා කිරි ලබාගැනීමේදී එය 25% පමණ වන අතර පොල් ඉතාම සිහින්ව ගා ගත් විට 40% දක්වා ඉහළ නැංවිය හැක. බ්ලෙන්ඩරය, ග්‍රයින්ඩරය, ඇඹරුම් ගල, හෝ වංගෙඩිය වැනි යාන්ත්‍රික ක්‍රම භාවිතය මගින් මෙම නිස්සාරණය 50% - 60% දක්වා වර්ධනය කරගත හැක. මේ අනුව යාන්ත්‍රික ක්‍රම භාවිතය සුලබ කිරීම තුළ ගෘහස්ථ පොල් පරිභෝජනය 50% කින් අඩු කරගැනීමට හැකියාවක් පවතින බැවින් කර්මාන්තය සඳහා යොදාගත හැකි ගෙඩි සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමේ විභවයක් පවතී.

ක්‍රමය	දිනකට නිවසකට වැයවන පොල් ගෙඩි ප්‍රමාණය	වියදම රු.	අතින් මිරකීමට සාපේක්ෂව වසරකට ඉතිරි වන පොල්	අතින් මිරකීමට සාපේක්ෂව වසරකට නිවසකට ඉතිරි වන මුදල රු.
ගා ගත් පොල් අතින් මිරකීම	01	70	-	-
බ්ලෙන්ඩර් යන්ත්‍ර භාවිතයෙන්	1/2	36	182	12,400
ග්‍රයින්ඩර් යන්ත්‍ර භාවිතයෙන්	1/2	36	182	12,400
විජලිත පොල් පේස්ට් (තලපය)	75g*	37.50	27kg	13,700
නැවුම් පොල් පේස්ට් (තලපය)	1/2	36	182	12,400
* විජලිත පොල් රු. 500/1kg	විදුලිය සඳහා වැයවන පිරිවැයද, ඉහත වගුවේ අඳාළ ස්ථානයන් වලදී ගණනය කිරීම් සඳහා එකතු කර ඇත.			

උක්ත වගුවට අනුව දිනපතා පොල් සඳහා වැයවන මුදල මෙසේ ඉතිරි කර ගැනීමෙන් වසරකට අඩු කාලයකදී බ්ලෙන්ඩරය සහ විදුලිය සඳහා යන පිරිවැයද පියවා ගත හැක.

ඉහත ක්‍රම වලට අමතරව නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුතු සැකසූ පොල් කිරි, පොල් ක්‍රීම්, පොල් පේස්ට් (තලපය) හෝ පිටි කළ පොල් කිරි භාවිතා කිරීම තුළින් ආහාර සැකසීමේ කාලය ඉතිරිවීමක් (විනාඩි 15 පමණ) සිදුවන අතර මූල්‍යමය වශයෙන් ලාභදායී ද වේ.

ග්‍රාමීය මට්ටමින්, සැකසූ පොල් කිරි හා සුදු පොල් තෙල් නිෂ්පාදනයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුළින් මෙම ද්‍රව්‍ය වල සුලබතාවය ඉහළ නැංවිය හැකි අතරම ග්‍රාමීය ආර්ථිකයද ශක්තිමත් කළ හැක. මෙමගින් අපතේ යන පොල් වතුර, අගය එකතුකළ නිෂ්පාදන ලෙස අපනයන හෝ දේශීය වෙළඳපොළ වලට එකතු කළ හැක. එමෙන්ම එසේ ඉතිරිවන පොල්කුඩු බේකරි කර්මාන්තය සඳහා එක් කිරීමෙන් තිරිඟුපිටි ආනයනය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩු කරගත හැකි අතර එමගින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතභාවය ඉහළ යයි. එමෙන්ම නාස්තිය අවම කිරීම තුළින් එකතුවන පොල් කටු හා ලෙලි ඉතා පහසුවෙන් අගය එකතුකළ කර්මාන්ත සඳහා යෙදවිය හැක.

දැනට පොල් ලෙලි මිලියන 1500 ක් හා පොල් කටු මිලියන 2000 ක් පමණ කර්මාන්තය සඳහා යොමුවන අතර එයට අමතරව තවත් පොල් ලෙලි මිලියන 750 ක් හා පොල් කටු මිලියන 500 ක් පමණ එක්රැස් කිරීමට සැලසුම් කෙරේ. ඒ ආකාරයෙන් ගෘහස්ථ මට්ටමෙන් සිදුවන අපතේ යෑම් අවම කොට ඒ සඳහා මූල්‍යමය වටිනාකමක් ග්‍රාමීය මට්ටමට ලැබෙන ලෙසින් එක් රැස් කිරීමේ යාන්ත්‍රණය තව තවත් ශක්තිමත් කිරීමට සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

On WhatsApp
070 400 1928



දුරකථන අංකය - 0312257688, 0312255300
වෙබ් අඩවිය - www.cri.gov.lk

www.facebook.com/crigovlk

www.Instagram.com/crigovlk

www.twitter.com/crigovlk

www.linkedin.com/company/crigovlk

www.youtube.com/crigovlk

අදාළ පිටුවල අන්තර්ගත කරුණු සවිස්තරාත්මකව වීඩියෝවක් මගින් නැරඹීම සඳහා මාතෘකාවට අදාළ QR කේතයන් ඔබේ ජංගම දුරකථනයෙන් සක්‍රීය කරන්න.

මුද්‍රණය - ජනවාරි 2022

ආර්ථිකයේ අයිතිය ජනතාවට හිමිවන ජනතා කේන්ද්‍රීය ආර්ථික පිළිවෙතක් කරා රට ගෙනයාමට පොල් සහ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වලට කළ හැකි කාර්යභාරය සුවිශේෂී වේ. ඒ සඳහා සියළු සහයෝගයන් ලබාදීම මාගේ රජයේ අරමුණයි.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා
අතිගරු ජනාධිපති

පොල් ගස යනු හුදෙක් වැවිලි බෝගයක් පමණක් නොව අපගේ සමාජ, ආර්ථික සහ සංස්කෘතික හැඩගැසීම් වලට අතීතයේ සිටම මග පෑදූ ජීවන වෘක්ෂයයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ගරු අග්‍රාමාත්‍යය

සියළුම අපනයන වැවිලි බෝග අතරින් අපගේ උරුමයන් රැකගනිමින් ලෝකය හමුවේ මාතෘ භූමිය ඔසවා තැබිය හැකි පොල් වගාව, 'Ceylon Coconut' ලෙස ලෝක අභිමානයට පාත්‍ර කරමින් ශ්‍රී ලාංකේය ආර්ථිකය සහ ජන ජීවිතය නඟාසිටුවීම අපගේ අරමුණයි.

වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා
වැවිලි අමාත්‍යය

පොල් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම, අගය එකතු කළ නව නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොළට හඳුන්වාදීම සහ නව වෙළෙඳපොළ හඳුනාගැනීම මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇත. එමගින් 2023 වසර අවසන් වනවිට පොල් ප්‍රධාන අපනයන බෝගය බවට පත් කිරීම අපගේ අරමුණයි.

අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා
වැවිලි රාජ්‍ය අමාත්‍යය

දුරකථන අංකය - 0312257688, 0312255300
වෙබ් අඩවිය - www.cri.gov.lk

www.facebook.com/crigovlk
www.Instagram.com/crigovlk
www.twitter.com/crigovlk
www.linkedin.com/company/crigovlk
www.youtube.com/crigovlk

1928 CALL US
www.cri.gov.lk

On WhatsApp
070 400 1928