1. Определение случайного процесса. Вероятностное описание ансамбля. Многомерные плотности вероятности, их свойства.

Случайный процесс $x(t)$ — однопараметрическое семейство случайных величин: для каждого фиксированного t значение $x(t)$ является случайной величиной. Эквивалентно, случайный процесс — множество детерминированных функций (реализаций, траекторий), на котором задана вероятностная мера. Все реализации и вероятности их появления образуют **статистический ансамбль.**

Вероятностное описание процесса задаётся конечномерными плотностями вероятности. Для моментов $t_1, \dots, t_n$ вводится n-мерная плотность:

$$\boxed{W(x_1, t_1; x_2, t_2; \dots; x_n, t_n)\, dx_1\, dx_2 \dots dx_n = P\{x_1 \le x(t_i) < x_i + dx_i;\ i = 1, 2, \dots, n\}.}$$

Процесс считается заданным, если известны его n-мерные плотности для любого n и произвольных $t_1, \dots, t_n$.

Свойства n-мерной плотности вероятности:

1. **Неотрицательность:**
$$\boxed{W(x_1, t_1; x_2, t_2; \dots; x_n, t_n) \ge 0.}$$
2. **Нормировка:**
$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} W(x_1, t_1; x_2, t_2; \dots; x_n, t_n)\, dx_1 dx_2 \dots dx_n = 1.}$$
3. **Симметрия:**
$$\boxed{W(x_1, t_1; x_2, t_2; \dots; x_n, t_n) = W(x_2, t_2; x_1, t_1; \dots; x_n, t_n).}$$
Плотность симметрична относительно любых перестановок пар (x_i, t_i).
4. **Согласованность:** из плотности большей размерности можно получить плотность меньшей размерности интегрированием по лишним аргументам. При любом $m < n$:
$$\boxed{W_m(x_1, t_1; x_2, t_2; \dots; x_m, t_m) = \int \cdots \int W_n(x_1, t_1; x_2, t_2; \dots; x_n, t_n)\, dx_{m+1}\, dx_{m+2} \dots dx_n.}$$

(Мальцев и др. [1], §§1.1–1.2.)

2. Двумерная условная плотность вероятности, её свойства. Связь с многомерными безусловными плотностями.

Условная плотность $W(x_2, t_2 / x_1, t_1)$ — плотность вероятности значения $x(t_2)$ при условии, что в момент t_1 процесс имел значение x_1. По определению:

$$\boxed{W(x_1, t_1; x_2, t_2) = W(x_1, t_1) \cdot W(x_2, t_2 / x_1, t_1).} \tag{1.3.1}$$

Отсюда:

$$\boxed{W(x_2, t_2 / x_1, t_1) \equiv \frac{W(x_1, t_1; x_2, t_2)}{W(x_1, t_1)}.} \tag{1.3.2}$$

По отношению к переменной x_2 условная плотность обладает свойствами обычной плотности вероятности:

$$\boxed{W(x_2, t_2 / x_1, t_1) \ge 0.}$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} W(x_2, t_2 / x_1, t_1)\, dx_2 = 1.}$$

Она не обладает симметрией:

$$\boxed{W(x_1, t_1 / x_2, t_2) \ne W(x_2, t_2 / x_1, t_1).}$$

Для произвольного числа моментов времени многомерная плотность представляется через условные плотности:

$$\boxed{\begin{aligned} W(x_1, t_1, \dots, x_n, t_n) = W(x_1, t_1) \cdot W(x_2, t_2 / x_1, t_1) \cdot \\ W(x_3, t_3 / x_1, t_1, x_2, t_2) \cdot \dots \\ W(x_n, t_n / x_1, t_1, \dots, x_{n-1}, t_{n-1}). \end{aligned}} \tag{1.3.8}$$

Физически условная плотность описывает статистический подансамбль реализаций, прошедших вблизи заданного значения x_1 в момент t_1. *(Мальцев и др. [1], §1.3.)*

3. Классификация процессов по вероятностному последействию. Марковские процессы. Уравнение Смолуховского.

По характеру вероятностного последействия в методике рассматриваются совершенно случайные и марковские процессы. У **совершенно случайного процесса** значения в любые несовпадающие моменты времени статистически независимы: процесс не обладает вероятностной памятью. Его n-мерная плотность:

$$\boxed{W(x_1, t_1, \dots, x_n, t_n) = W(x_1, t_1) \dots W(x_n, t_n) = \prod_{i=1}^{n} W(x_i, t_i).} \tag{2.1.1}$$

Условная плотность при этом не зависит от предыдущих значений:

$$W(x_n, t_n / x_1, t_1, \dots, x_{n-1}, t_{n-1}) = W(x_n, t_n).$$

Марковский процесс — процесс без последействия: будущее при известном настоящем не зависит от всех более ранних значений. Для упорядоченных моментов $t_1 < t_2 < \dots < t_n$:

$$\boxed{W(x_n, t_n / x_1, t_1, \dots, x_{n-1}, t_{n-1}) = W(x_n, t_n / x_{n-1}, t_{n-1}).} \tag{2.2.1}$$

Поэтому

$$\boxed{\begin{aligned} W(x_1, t_1, \dots, x_n, t_n) = W(x_1, t_1) \cdot W(x_2, t_2 / x_1, t_1) \cdot W(x_3, t_3 / x_2, t_2) \\ \cdots \cdot W(x_n, t_n / x_{n-1}, t_{n-1}) = W(x_1, t_1) \prod_{i=2}^{n} W(x_i, t_i / x_{i-1}, t_{i-1}) \end{aligned}} \tag{2.2.2–2.2.3}$$

Условные плотности марковского процесса называют **вероятностями перехода**. Для трёх моментов $t_0 < t_1 < t$ уравнение Смолуховского имеет вид:

$$\boxed{W(x, t / x_0, t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} W(x, t / x_1, t_1) W(x_1, t_1 / x_0, t_0)\, dx_1.} \tag{2.2.3}$$

Оно выражает согласованность вероятностей перехода через промежуточное состояние; результат не зависит от промежуточного момента t_1. Уравнение справедливо для любого марковского процесса. *(Мальцев и др. [1], §§2.1–2.2.)*

4. Детерминированные и квазидетерминированные процессы, их описание.

У **детерминированного процесса** $x(t) = s(t)$ ансамбль состоит из одной реализации. Его n-мерная плотность вероятности:

$$\boxed{W(x_1, t_1, \dots, x_n, t_n) = \prod_{i=1}^{n} \delta[x_i - s(t_i)].} \tag{2.3.1}$$

Квазидетерминированным называется процесс, реализации которого описываются функцией времени заданного вида, содержащей один или несколько случайных параметров. При одном параметре λ методика задаёт условную плотность:

$$\boxed{W(x_1, t_1, \dots, x_n, t_n / \lambda) = \prod_{i=1}^{n} \delta[x_i - s(t_i, \lambda)].} \tag{2.3.4}$$

Совместная плотность с параметром и итоговая n-мерная плотность:

$$\boxed{W(x_1 t_1; \dots; x_n t_n; \lambda) = W_\lambda(\lambda) W(x_1 t_1; \dots; x_n t_n / \lambda).} \tag{2.3.5}$$

$$\boxed{W(x_1, t_1; \dots; x_n, t_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} W_\lambda(\lambda) \prod_{i=1}^{n} \delta[x_i - s(t_i, \lambda)]\, d\lambda.} \tag{2.3.6}$$

Таким образом, случайность квазидетерминированного процесса сосредоточена в случайных параметрах, а при их фиксации реализация становится детерминированной. *(Мальцев и др. [1], §2.3.)*

5. Квазигармонический процесс со случайной начальной фазой $x(t) = A_0 \cos(\omega t + \varphi)$.

В методике рассматривается гармонический процесс с фиксированными амплитудой и частотой и равномерной начальной фазой:

$$\boxed{x(t) = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi), \qquad W_\varphi(\varphi) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\pi}, & |\varphi| \le \pi, \\ 0, & |\varphi| > \pi. \end{cases}} \tag{2.3.3}$$

Одномерная плотность вероятности вычисляется по формуле (2.3.7); после подстановки производной (2.3.8) получается:

$$\boxed{W(x, t) = W(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\pi\sqrt{A_0^2 - x^2}}, & |x| < A_0, \\ 0, & |x| > A_0. \end{cases}} \tag{2.3.9}$$

Для стационарности вычисляются среднее и корреляционная функция. Среднее из (5.2.1):

$$\boxed{\begin{aligned} \langle x(t) \rangle &= A_0 \langle \cos(\omega_0 t \cos\varphi - \sin\omega_0 t \sin\varphi) \rangle = \\ &= A_0 [\cos\omega_0 t \langle \cos\varphi \rangle - \sin\omega_0 t \langle \sin\varphi \rangle]. \end{aligned}} \tag{5.2.1}$$

При равномерной фазе:

$$\boxed{\langle \cos\varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \cos\varphi W_\varphi(\varphi)\, d\varphi = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos\varphi\, d\varphi = 0,} \tag{5.2.2}$$

$$\boxed{\langle \sin\varphi \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin\varphi\, d\varphi = 0.} \tag{5.2.3}$$

Следовательно, $\langle x(t) \rangle = 0$. Корреляционная функция (5.2.4):

$$\boxed{\begin{aligned} K_x[t_1, t_2] &= \langle x(t_1) x(t_2) \rangle = \langle A_0^2 \cos(\omega_0 t_1 + \varphi) \cos(\omega_0 t_2 + \varphi) \rangle = \\ &= \langle A_0^2 \cos(\omega_0 t_1 + \varphi) \cos(\omega_0 t_1 + \omega_0 \tau + \varphi) \rangle = \\ &= \frac{A_0^2}{2} \langle [\cos(2\omega_0 t_1 + \omega_0 \tau + 2\varphi) + \langle \cos(\omega_0 \tau) \rangle] = \frac{A_0^2}{2} \cos(\omega_0 \tau). \end{aligned}} \tag{5.2.4}$$

Среднее постоянно, а корреляционная функция зависит только от $\tau = t_2 - t_1$. В методике дополнительно указано, что при равномерной фазе конечномерные плотности инвариантны к сдвигу времени: процесс стационарен и в узком смысле. *(Мальцев и др. [1], §§2.3, 5.2.)*

6. Многомерная характеристическая функция, её свойства.

n-мерная характеристическая функция — n-кратное преобразование Фурье от n-мерной плотности вероятности; эквивалентно, это ансамблевое среднее:

$$\boxed{\Theta_x(u_1, t_1; \dots; u_n, t_n) = \int \cdots \int W(x_1, t_1; \dots; x_n, t_n) \cdot e^{j(u_1 x_1 + \dots + u_n x_n)}\, dx_1 \dots dx_n.} \tag{3.1.1}$$

$$\boxed{\Theta_x(u_1, t_1; \dots; u_n, t_n) = \left\langle e^{j(u_1 x_1 + \dots + u_n x_n)} \right\rangle = \left\langle \exp\left[j \sum_{i=1}^{n} u_i x(t_i) \right] \right\rangle.} \tag{3.1.2}$$

Обратное преобразование Фурье:

$$\boxed{W(x_1, t_1; \dots; x_n, t_n) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int \cdots \int \Theta_x(u_1, t_1; \dots; u_n, t_n) e^{-j(u_1 x_1 + \dots + u_n x_n)}\, du_1 \dots du_n.} \tag{3.1.3}$$

Основные свойства:

1. Нормировка:
$$\boxed{\Theta_x(0, t_1; \dots; 0, t_n) = \int \cdots \int W(x_1, t_1; \dots; x_n, t_n)\, dx_1 \dots dx_n = 1.} \tag{3.1.4}$$
2. Ограниченность по модулю:
$$\boxed{|\Theta_x(u_1, t_1; \dots; u_n, t_n)| \le \Theta_x(0, t_1; \dots; 0, t_n) = 1.} \tag{3.1.5}$$
3. Симметрия:
$$\boxed{\Theta_x(-u_1, t_1; \dots; -u_n, t_n) = \Theta_x^*(u_1, t_1; \dots; u_n, t_n).} \tag{3.1.6}$$
4. Согласованность:
$$\boxed{\Theta_x(u_1, t_1; \dots; u_m, t_m) = \Theta_x(u_1, t_1; \dots; u_m, t_m; 0, t_{m+1}; \dots; 0, t_n).} \tag{3.1.7}$$
5. Для совершенно случайного процесса:
$$\boxed{\Theta_x(u_1, t_1; \dots; u_n, t_n) = \prod_{i=1}^{n} \Theta_x(u_i, t_i).} \tag{3.1.8}$$

Для марковского процесса достаточно знать двумерную характеристическую функцию. *(Мальцев и др. [1], §3.1.)*

7. Моментные функции. Среднее значение и корреляционная функция. Связь с характеристической функцией.

Моментная функция s-го порядка — среднее произведение значений процесса в произвольные моменты времени. Первый порядок и корреляционная функция (второй порядок) в методике определены так:

$$\boxed{\alpha_1(t) = m_x(t) = \langle x(t) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x W(x, t)\, dx.} \tag{3.2.1}$$

$$\boxed{\alpha_2(t_1, t_2) \equiv K_x[t_1, t_2] \equiv \langle x(t_1) x(t_2) \rangle \equiv \iint x_1 x_2 W(x_1, t_1; x_2, t_2)\, dx_1\, dx_2.} \tag{3.2.2}$$

Общая моментная функция:

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha_s(t_1, t_2, \dots, t_s) &= \langle x(t_1) x(t_2) \dots x(t_s) \rangle \equiv \\ &\equiv \int_s \cdots \int_s x_1 \dots x_s W(x_1, t_1; \dots; x_s, t_s)\, dx_1 \dots dx_s. \end{aligned}} \tag{3.2.3}$$

Связь с характеристической функцией задаётся производными в нуле:

$$\boxed{\frac{\partial^s \Theta_x(u_1, t_1; \dots; u_n, t_n)}{\partial u_{k_1} \partial u_{k_2} \dots \partial u_{k_s}}\bigg|_{u_1 = \dots = u_n = 0} = j^s \cdot \langle x(t_{k_1}) \cdot \dots \cdot x(t_{k_s}) \rangle = j^s \alpha_s(t_{k_1} \dots t_{k_s}).} \tag{3.2.9}$$

При совпадении всех времён $\alpha_s(t, \dots, t) = \langle x^s(t) \rangle$. *(Мальцев и др. [1], §3.2.)*

8. Кумулянтные функции, их связь с моментными функциями (1-й и 2-й порядок).

Кумулянтные функции — коэффициенты разложения логарифма характеристической функции в ряд. Их определение:

$$\boxed{\kappa_s(t_{k_1}, \dots t_{k_s}) \equiv \frac{1}{j^s} \frac{\partial^s \ln \Theta_x(u_1, t_1; \dots; u_n, t_n)}{\partial u_{k_1} \partial u_{k_2} \dots \partial u_{k_s}}\bigg|_{u_1, \dots, u_n = 0}.} \tag{3.2.16}$$

Первые два порядка:

$$\boxed{\kappa_1(t_k) = \alpha_1(t_k) = m_x(t_k).} \tag{3.2.19}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \kappa_2(t_{k_1}, t_{k_2}) = \frac{1}{j^2} \Bigg[\frac{-1}{\Theta_x^2(u_1, t_1; \dots; u_n, t_n)} \frac{\partial \Theta_x}{\partial u_{k_1}} \frac{\partial \Theta_x}{\partial u_{k_2}} + \frac{1}{\Theta_x(u_1, t_1; \dots; u_n, t_n)} \frac{\partial^2 \Theta_x}{\partial u_{k_1} \partial u_{k_2}} \Bigg]_{u_1, \dots, u_n = 0} = \\ = \alpha_2(t_{k_1}, t_{k_2}) - \alpha_1(t_{k_1}) \alpha_1(t_{k_2}) = \\ = \langle x(t_{k_1}) x(t_{k_2}) \rangle - \langle x(t_{k_1}) \rangle \langle x(t_{k_2}) \rangle = B_x(t_{k_1}, t_{k_2}). \end{aligned}} \tag{3.2.21}$$

Следовательно, первый кумулянт равен среднему, второй — ковариационной функции. В записи методички также:

$$\boxed{\kappa_2(t_1, t_2) = B_x[t_1, t_2] = \langle \widetilde{x}(t_1) \widetilde{x}(t_2) \rangle,} \tag{3.2.22}$$

$$\boxed{\kappa_2(t_1, t_2) = K_x[t_1, t_2] - \langle x(t_1) \rangle \langle x(t_2) \rangle.} \tag{3.2.23}$$

(Мальцев и др. [1], §3.2.)

9. Ковариационная функция. Дисперсия. Некоррелированность и статистическая независимость. Коэффициент корреляции.

Ковариационная функция — второй кумулянт; она равна корреляционной функции минус произведение средних. При $t_1 = t_2 = t$ она равна дисперсии:

$$\boxed{\kappa_2(t_1, t_2) = B_x[t_1, t_2] = \langle \widetilde{x}(t_1) \widetilde{x}(t_2) \rangle.} \tag{3.2.22}$$

$$\boxed{\kappa_2(t_1, t_2) = K_x[t_1, t_2] - \langle x(t_1) \rangle \langle x(t_2) \rangle.} \tag{3.2.23}$$

$$\boxed{B_x[t, t] = \sigma_x^2(t) = \langle x^2(t) \rangle - \langle x(t) \rangle^2.}$$

Значения $x(t_1)$ и $x(t_2)$ некоррелированы, если $B_x[t_1, t_2] = 0$ (или $K_x[t_1, t_2] = \langle x(t_1) \rangle \langle x(t_2) \rangle$). Статистическая независимость означает разложение совместной плотности в произведение одномерных; из независимости следует некоррелированность, обратное в общем случае неверно.

Коэффициент корреляции (нормированная ковариационная функция):

$$\boxed{R_x[t_1, t_2] = \frac{B_x[t_1, t_2]}{\sqrt{B_x[t_1, t_1] B_x[t_2, t_2]}} = \frac{B_x[t_1, t_2]}{\sigma_x(t_1) \sigma_x(t_2)}.} \tag{3.2.25}$$

(Мальцев и др. [1], §3.2.)

10. Гауссовские процессы, их n-мерная характеристическая функция и плотность вероятности.

Процесс $x(t)$ называется **гауссовым**, если его n-мерная характеристическая функция имеет следующий вид (эквивалентно: все кумулянтные функции высших порядков, начиная с третьего, равны нулю):

$$\boxed{\begin{aligned} \Theta_x(u_1, t_1; \dots; u_n, t_n) &= \exp\left\{ j \sum_{k=1}^{n} \kappa_1(t_k) u_k + \frac{j^2}{2} \sum_{k,l=1}^{n} \kappa_2(t_k, t_l) u_k u_l \right\} = \\ &= \exp\left\{ j \sum_{k=1}^{n} m(t_k) u_k - \frac{1}{2} \sum_{k,l=1}^{n} B[t_k, t_l] u_k u_l \right\}. \end{aligned}} \tag{4.1.3}$$

Для плотности вероятности методичка приводит обратное преобразование Фурье и его результат:

$$\boxed{\begin{aligned} W(x_1, t_1; x_2, t_2; \dots; x_n, t_n) = \\ = \frac{1}{(2\pi)^n} \int \cdots \int \exp\left[j \vec{m}_x^T \vec{u} - \frac{1}{2} \vec{u}^T \mathbf{B}_x \vec{u} \right] \exp(-j \vec{x}^T \vec{u})\, d\vec{u} = \\ = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n |\mathbf{B}_x|}} \exp\left[-\frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{m}_x)^T \mathbf{B}_x^{-1} (\vec{x} - \vec{m}_x) \right]. \end{aligned}} \tag{4.1.11}$$

Здесь $|\mathbf{B}_x|$ — определитель ковариационной матрицы. Формула плотности в таком виде применима при невырожденной матрице; при $|\mathbf{B}_x| = 0$ характеристическая функция сохраняет смысл, а запись плотности (4.1.11) неприменима. *(Мальцев и др. [1], §4.1.)*

11. Ковариационная матрица отсчётов процесса, её свойства.

Для отсчётов $\vec{x} = \{x(t_1), \dots, x(t_n)\}$ вводится вектор средних $\vec{m}_x$ и ковариационная матрица:

$$\boxed{\mathbf{B}_x = \begin{pmatrix} B_x[t_1, t_1] & B_x[t_1, t_2] & \dots & B_x[t_1, t_n] \\ B_x[t_2, t_1] & B_x[t_2, t_2] & \dots & B_x[t_2, t_n] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_x[t_n, t_1] & B_x[t_n, t_2] & \dots & B_x[t_n, t_n] \end{pmatrix} = \left\langle (\vec{x} - \vec{m}_x) \cdot (\vec{x} - \vec{m}_x)^T \right\rangle.} \tag{4.1.5}$$

Матрица симметрична, поскольку

$$\boxed{B_x[t_k, t_l] \equiv \langle x(t_k) x(t_l) \rangle - \langle x(t_k) \rangle \langle x(t_l) \rangle \equiv \\ \equiv \langle x(t_l) x(t_k) \rangle - \langle x(t_l) \rangle \langle x(t_k) \rangle \equiv B_x[t_l, t_k].} \tag{4.1.7}$$

Следовательно, $\mathbf{B}_x^T = \mathbf{B}_x$. Матрица неотрицательно определена:

$$\boxed{\vec{u}^T \mathbf{B}_x \vec{u} \ge 0.} \tag{4.1.8}$$

Это следует из

$$\boxed{\left\langle |(\vec{x} - \vec{m}_x)^T \vec{u}|^2 \right\rangle \ge 0.} \tag{4.1.9}$$

Корреляционная матрица $\{K[t_k, t_l]\} \equiv \mathbf{K} \equiv \langle \vec{x} \vec{x}^T \rangle$ обладает теми же свойствами симметричности и неотрицательной определённости. *(Мальцев и др. [1], §4.1.)*

12. Основные свойства гауссовских процессов. Выражение n-мерных моментных функций через ковариационную.

Гауссов процесс полностью описывается средним значением $m_x(t_k)$ и ковариационной функцией $B_x[t_1, t_2]$. Для гауссовских процессов некоррелированность значений тождественна статистической независимости. Линейное преобразование гауссовского процесса даёт гауссовский процесс; линейная комбинация совместно гауссовских процессов также гауссовская; условные плотности вероятности гауссовского процесса имеют гауссову форму.

Формулы моментных функций ниже в методичке записаны для гауссовского процесса с нулевым средним $\langle x(t) \rangle = 0$. Второй момент:

$$\boxed{\alpha_2(t_1, t_2) = B_x[t_1, t_2].} \tag{4.2.11}$$

Четвёртый момент:

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha_4(t_1, t_2, t_3, t_4) = B_x[t_1, t_2] B_x[t_3, t_4] + B_x[t_1, t_3] B_x[t_2, t_4] + \\ + B_x[t_1, t_4] B_x[t_2, t_3] = 3\{B_x[t_1, t_2] B_x[t_3, t_4]\}_s. \end{aligned}} \tag{4.2.12}$$

Шестой и общий чётный моменты:

$$\boxed{\alpha_6(t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6) = 15\{B_x[t_1, t_2] B_x[t_3, t_4] B_x[t_5, t_6]\}_s.} \tag{4.2.13}$$

$$\boxed{\alpha_{2m}(t_1, t_2, \dots, t_{2m}) = (2m-1)!! \{B_x[t_1, t_2] \cdot B_x[t_3, t_4] \cdot \dots \cdot B_x[t_{2m-1}, t_{2m}]\}_s.} \tag{4.2.14}$$

Нечётные моментные функции:

$$\boxed{\alpha_{2m+1}(t_1, t_2, \dots, t_{2m+1}) = 0.} \tag{4.2.15}$$

Здесь $\{\cdot\}_s$ — скобки симметризации, $(2m-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2m-1)$. Для ненулевого среднего сначала центрируют процесс; приведённые формулы в источнике сформулированы именно для нулевого среднего. *(Мальцев и др. [1], §4.2.)*

13. Стационарные процессы. Стационарность в узком и широком смысле, их взаимоотношение.

Стационарность в узком смысле: все n-мерные плотности вероятности инвариантны относительно общего сдвига времени:

$$\boxed{W(x_1, t_1, \dots, x_n, t_n) = W(x_1, t_1 + \tau, \dots, x_n, t_n + \tau).} \tag{5.1.1}$$

Отсюда следуют постоянство одномерной плотности, среднего и дисперсии; двухвременные функции зависят только от $\tau = t_2 - t_1$.

Стационарность в широком смысле: среднее и дисперсия не зависят от времени, а корреляционная функция зависит только от разности времён:

$$\boxed{\begin{cases} \langle x(t) \rangle = m_x = \text{const} \\ \sigma_x^2(t) = \sigma_x^2 = \text{const} \\ K_x[t_1, t_2] = K_x[t_2 - t_1] = K_x[\tau] \end{cases}} \tag{5.2.0}$$

Из стационарности в узком смысле следует стационарность в широком, но не наоборот. Для гауссовских процессов эти понятия совпадают, поскольку конечномерные плотности полностью определяются средним и ковариационной функцией. *(Мальцев и др. [1], §§5.1–5.2.)*

14. Стационарность квазидетерминированных процессов (примеры).

Пример 1. $x(t) = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$, где начальная фаза φ равномерно распределена на $[-\pi, \pi]$. Для среднего значения:

$$\boxed{\begin{aligned} \langle x(t) \rangle &= A_0 \langle \cos(\omega_0 t + \varphi) \rangle = A_0 \langle \cos\omega_0 t \cos\varphi - \sin\omega_0 t \sin\varphi \rangle = \\ &= A_0 [\cos\omega_0 t \langle \cos\varphi \rangle - \sin\omega_0 t \langle \sin\varphi \rangle] \end{aligned}} \tag{5.2.1}$$

При равномерной фазе $\langle \cos\varphi \rangle = \langle \sin\varphi \rangle = 0$, поэтому среднее постоянно и равно нулю. Корреляционная функция:

$$\boxed{\begin{aligned} K_x[t_1, t_2] &= \langle x(t_1) x(t_2) \rangle = \langle A_0^2 \cos(\omega_0 t_1 + \varphi) \cos(\omega_0 t_2 + \varphi) \rangle = \\ &= \langle A_0^2 \cos(\omega_0 t_1 + \varphi) \cos(\omega_0 t_1 + \omega_0 \tau + \varphi) \rangle = \\ &= \frac{A_0^2}{2} \langle [\cos(2\omega_0 t_1 + \omega_0 \tau + 2\varphi) + \langle \cos(\omega_0 \tau) \rangle] = \frac{A_0^2}{2} \cos(\omega_0 \tau) \end{aligned}} \tag{5.2.4}$$

Корреляционная функция зависит только от $\tau = t_2 - t_1$; при равномерной фазе процесс стационарен также в узком смысле.

Пример 2. $x(t) = s(t + \tau_0)$, где $s(t)$ — периодическая функция периода T, а τ_0 равномерно распределена на $[0, T]$:

$$\boxed{W(\tau_0) = \begin{cases} \dfrac{1}{T}, & 0 \le \tau_0 \le T, \\ 0, & \tau_0 < 0,\ \tau_0 > T. \end{cases}} \tag{5.2.5}$$

Среднее и корреляционная функция имеют вид:

$$\boxed{\begin{aligned} \langle x(t) \rangle &= \langle s(t + \tau_0) \rangle = \int_0^T s(t + \tau_0) \frac{1}{T} d\tau_0 = \\ &= \frac{1}{T} \int_t^{t+T} s(u)\, du = \frac{1}{T} \int_0^T s(u)\, du = m_x = \text{const}. \end{aligned}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} K_x[t, \tau] &= \langle x(t) x(t + \tau) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T s(t + \tau_0) s(t + \tau_0 + \tau)\, d\tau_0 = \\ &= \frac{1}{T} \int_t^{t+T} s(u) s(u + \tau)\, du = \frac{1}{T} \int_0^T s(u) s(u + \tau)\, du = K_x[\tau]. \end{aligned}}$$

Значит, процесс стационарен в широком смысле. В общем случае периодическая функция со случайным равномерным сдвигом по периоду порождает стационарный в широком смысле процесс. *(Мальцев и др. [1], §5.2.)*

15. Эргодичность. Необходимые и достаточные условия эргодичности по среднему.

Процесс эргодичен по отношению к среднему, если среднее по времени одной реализации при $T \to \infty$ сходится к среднему по ансамблю. Среднеинтегральная оценка по реализации k:

$$\boxed{\bar{x}_k^T = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x_k(t)\, dt.} \tag{5.3.2}$$

Эргодичность означает $\bar{x}^T \to \langle x \rangle = m_x$ (в методике рассматривается сходимость в среднеквадратическом смысле). Дисперсия временного среднего:

$$\boxed{\begin{aligned} \sigma_{\bar{x}T}^2 &= \frac{1}{T^2} \iint_{\Delta} B_x[\tau]\, dt_0\, d\tau = \frac{1}{T^2} \int_{-T}^{T} B_x[\tau] \int_{-T+|\tau|}^{T-|\tau|} dt_0\, d\tau = \\ &= \frac{1}{T^2} \int_{-T}^{T} (T - |\tau|) \cdot B_x[\tau] d\tau = \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} \left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right) \cdot B_x[\tau] d\tau \end{aligned}} \tag{5.3.10}$$

$$\boxed{\sigma_{\bar{x}T}^2 = \frac{1}{T} \int_{-T}^{T} \left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right) B_x[\tau] d\tau = \frac{2}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right) B_x[\tau] d\tau.} \tag{5.3.11}$$

Необходимое и достаточное условие эргодичности по среднему в среднем квадратичном:

$$\boxed{\lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{\tau}{T}\right) B_x[\tau] d\tau = 0.} \tag{5.3.12}$$

Достаточное условие Слуцкого и более сильное условие:

$$\boxed{\lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T B_x[\tau] d\tau = 0,} \tag{5.3.13}$$

$$\boxed{\lim_{\tau \to \infty} B_x[\tau] = 0.} \tag{5.3.14}$$

(Мальцев и др. [1], §5.3.)

16. Пример стационарного, но не эргодического процесса (с доказательством).

В методичке рассматривается $x(t) = \xi(t) + A$, где $\xi(t)$ — стационарный эргодический процесс с нулевыми средним, A — случайная величина с нулевым средним, статистически независимая от $\xi(t)$ и постоянная во времени. Среднее равно нулю, а ковариационная функция:

$$\boxed{\begin{aligned} B_x[\tau] &= K_x[\tau] = \langle x(t)\cdot x(t+\tau)\rangle = \\ &= \langle \xi(t)\cdot\xi(t+\tau)\rangle + \\ &+ \langle A^2\rangle + \langle \xi(t)\cdot A\rangle + \langle \xi(t+\tau)\cdot A\rangle. \end{aligned}} \tag{5.3.15}$$

В силу независимости последние два слагаемых равны нулю, поэтому

$$\boxed{B_x[\tau] = B_\xi[\tau] + \langle A^2\rangle.} \tag{5.3.16}$$

Процесс стационарен в широком смысле. Однако условие (5.3.12) не выполняется:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\left\{\frac{1}{T}\int_0^T\left(1-\frac{\tau}{T}\right)B_\xi[\tau]d\tau + \frac{1}{T}\int_0^T\left(1-\frac{\tau}{T}\right)\langle A^2\rangle d\tau\right\} = \frac{\langle A^2\rangle}{2}.} \tag{5.3.17}$$

Значит, при $\langle A^2\rangle \neq 0$ процесс не эргодичен по среднему. [1]Частный случай из методички: $A = \pm A_0$ с одинаковыми вероятностями; две части ансамбля имеют разные временные средние:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\bar{x}_1^T = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x_1(t)dt = A_0.} \qquad \boxed{\lim_{T\to\infty}\bar{x}_2^T = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x_2(t)dt = -A_0.}$$

Ансамблевое среднее равно нулю, но временное среднее зависит от выбранного подансамбля. *(Мальцев и др. [1], §5.3.)*

17. Необходимые и достаточные условия эргодичности по корреляционной функции.

Для стационарного процесса корреляционная функция и её временная оценка:

$$\boxed{K_x[\tau] \equiv \langle x(t)x(t+\tau)\rangle.} \tag{5.3.18}$$

$$\boxed{K_x^T[\tau] = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t+\tau)dt.} \tag{5.3.19}$$

Эргодичность по корреляционной функции означает совпадение временной оценки с ансамблевым средним:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty} K_x^T[\tau] = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)x(t+\tau)dt = K_x[\tau].} \tag{5.3.20}$$

Введём вспомогательный процесс $y(t) = x(t)x(t+\tau)$. Необходимое и достаточное условие эргодичности его среднего, а значит, и эргодичности исходного процесса по корреляционной функции:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T\left(1-\frac{\tau'}{T}\right)B_y[\tau']d\tau' = 0.} \tag{5.3.21}$$

Здесь ковариационная функция вспомогательного процесса равна

$$\boxed{\begin{aligned} B_y[\tau'] &\equiv \langle y(t)\cdot y(t+\tau')\rangle - \langle y(t)\rangle\langle y(t+\tau')\rangle = \\ &= \langle x(t)x(t+\tau)x(t+\tau')x(t+\tau+\tau')\rangle - \\ &- \langle x(t)x(t+\tau)\rangle\langle x(t+\tau')x(t+\tau+\tau')\rangle = \\ &= \alpha_4^{(*)}(0,\tau,\tau',\tau+\tau') - K_x^2[\tau] \end{aligned}} \tag{5.3.22}$$

Достаточное условие:

$$\boxed{B_y[\tau'] = \alpha_4^{(*)}(0,\tau,\tau',\tau+\tau') - K_x^2[\tau] \xrightarrow[\tau'\to\infty]{} 0.} \tag{5.3.23}$$

Следовательно, для проверки общего критерия требуется исследовать четвёртую моментную функцию. *(Мальцев и др. [1], §5.3.)*

18. Достаточное условие эргодичности по одномерной плотности вероятности. Экспериментальное определение.

Введём вспомогательный процесс $y(t) = \delta[x - x(t)]$. По свойству дельта-функции:

$$\boxed{\langle\delta[x - x(t)]\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\delta[x - x']W(x',t)dx' = W(x,t).} \tag{5.3.29}$$

Эргодичность по одномерной плотности сводится к эргодичности среднего вспомогательного процесса. Необходимое и достаточное условие:

$$\boxed{\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T\left(1-\frac{\tau'}{T}\right)B_y[\tau']d\tau' = 0.} \tag{5.3.31}$$

Ковариационная функция $y(t)$:

$$\boxed{\begin{aligned} B_y[\tau'] &= \langle y(t)y(t+\tau')\rangle - \langle y(t)\rangle\langle y(t+\tau')\rangle = \\ &= \langle\delta[x - x(t)]\delta[x - x(t+\tau')]\rangle - \\ &- \langle\delta[x - x(t)]\rangle\langle\delta[x - x(t+\tau')]\rangle = \\ &= W(x,t;x,t+\tau') - W(x,t)W(x,t+\tau'). \end{aligned}} \tag{5.3.32}$$

Достаточное условие эргодичности — стремление этой ковариации к нулю при $\tau'\to\infty$. С учётом стационарности:

$$\boxed{W(x_1,t;x_2,t+\tau') \xrightarrow[\tau'\to\infty]{} W(x_1,t)W(x_2,t+\tau') = W(x_1)W(x_2).} \tag{5.3.34}$$

Иными словами, достаточно, чтобы далеко разнесённые отсчёты были статистически независимы.

Экспериментальное определение. Вместо ансамблевого усреднения измеряют долю времени $T_{\Delta x}/T$, в течение которого реализация попадает в малую окрестность выбранного значения x. Тогда:

$$\boxed{W'(x)\Delta x = \lim_{T\to\infty}\frac{T_{\Delta x}}{T} = W(x)\Delta x.} \tag{5.4.3}$$

Здесь $T_{\Delta x}$ — суммарное время пребывания реализации в выбранном малом окне. *(Мальцев и др. [1], §§5.3–5.4.)*

19. Совокупность двух случайных процессов. Статистическая независимость. Взаимные корреляционная и ковариационная функции.

Совокупность $\{x(t),y(t)\}$ полностью описывается совместной $(n+n')$-мерной плотностью. В методичке она определяется следующим образом:

$$\boxed{\begin{aligned} W_{xy}(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n;y_1,t'_1;\ldots;y_{n'},t'_{n'}) = \\ = P\left\{\begin{array}{l} x_i \le x(t_i) \le x_i + dx \\ y_k \le y(t'_k) \le y_k + dy \end{array}\right\},\quad i = 1,2,\ldots,n. \end{aligned}} \tag{6.1.1}$$

Процессы статистически независимы, если совместная плотность распадается на произведение плотностей каждого процесса:

$$\boxed{\begin{aligned} W_{xy}(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n;y_1,t'_1;\ldots;y_{n'},t'_{n'}) = \\ = W_x(x_1,t_1;\ldots;x_n,t_n)W_y(y_1,t'_1;\ldots;y_{n'},t'_{n'}). \end{aligned}} \tag{6.1.3}$$

Взаимная корреляционная функция — смешанный момент второго порядка:

$$\boxed{\alpha_{1,1}^{x,y}(t_1,t_2) = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle = K_{xy}[t_1,t_2].} \tag{6.2.5}$$

Взаимная ковариационная функция:

$$\boxed{B_{xy}[t_1,t_2] = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle - \langle x(t_1)\rangle\langle y(t_2)\rangle = K_{xy}[t_1,t_2] - m_x(t_1)m_y(t_2).} \tag{6.2.6}$$

Взаимный коэффициент корреляции:

$$\boxed{R_{xy}[t_1,t_2] = \frac{B_{xy}[t_1,t_2]}{\sigma_x(t_1)\sigma_y(t_2)} = \frac{B_{xy}[t_1,t_2]}{\sqrt{B_x[t_1,t_1]B_y[t_2,t_2]}}.} \tag{6.2.7}$$

Симметрия взаимной корреляции:

$$\boxed{K_{xy}[t_1,t_2] = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle = \langle y(t_2)x(t_1)\rangle = K_{yx}[t_2,t_1].} \tag{6.2.8}$$

Независимость процессов влечёт их взаимную некоррелированность, но обратное в общем случае неверно. *(Мальцев и др. [1], §§6.1–6.2.)*

20. Понятия стационарности, эргодичности, гауссовости совокупности двух процессов.

Совокупность $\{x(t),y(t)\}$ стационарна в узком смысле, если её совместная плотность любого порядка инвариантна к общему сдвигу времени. Стационарность в широком смысле требует постоянства средних и зависимости автокорреляционных и взаимной корреляционной функций только от разности времён:

$$\boxed{\begin{array}{l} m_x(t) = \text{const};\quad K_x[t_1,t_2] = K_x[t_2-t_1] = K_x[\tau]; \\ m_y(t) = \text{const};\quad K_y[t_1,t_2] = K_y[t_2-t_1] = K_y[\tau]; \\ K_{xy}[t_1,t_2] = K_{xy}[t_2-t_1] = K_{xy}[\tau]. \end{array}} \tag{6.2.11}$$

Для взаимных корреляционных функций:

$$\boxed{\begin{aligned} K_{xy}[\tau] &= K_{xy}[t,t+\tau] = \langle x(t)y(t+\tau)\rangle = \langle x(t+\tau-\tau)y(t+\tau)\rangle = \\ &= \langle y(t+\tau)x(t+\tau-\tau)\rangle = K_{yx}[(t+\tau),(t+\tau)-\tau] = K_{yx}[-\tau]. \end{aligned}} \tag{6.2.13}$$

Стационарность процессов по отдельности не гарантирует стационарности совокупности. В методичке приведён пример:

$$\boxed{\begin{array}{l} x(t) = \xi(t)\cos\omega_0 t + \eta(t)\sin\omega_0 t, \\ y(t) = \xi(t)\sin\omega_0 t + \eta(t)\cos\omega_0 t. \end{array}} \tag{6.2.13}$$

При условиях методички взаимная корреляционная функция равна

$$\boxed{\begin{aligned} K_{xy}[t,t+\tau] &= \langle x(t)y(t+\tau)\rangle = \langle\xi(t)\xi(t+\tau)\rangle\cos\omega_0 t\sin[\omega_0(t+\tau)] + \\ &+ \langle\eta(t)\eta(t+\tau)\rangle\sin\omega_0 t\cos[\omega_0(t+\tau)] + \\ &+ \langle\xi(t)\eta(t+\tau)\rangle\cos\omega_0 t\sin[\omega_0(t+\tau)] + \\ &+ \langle\eta(t)\xi(t+\tau)\rangle\sin\omega_0 t\sin[\omega_0(t+\tau)] = \\ &= K[\tau]\cos\omega_0 t\sin[\omega_0(t+\tau)] + K[\tau]\sin\omega_0 t\cos[\omega_0(t+\tau)] + 0 + 0 = \\ &= K[\tau]\sin(2\omega_0 t + \omega_0\tau) \end{aligned}} \tag{6.2.17}$$

Она зависит от абсолютного времени t, поэтому совокупность нестационарна.

Эргодичность совокупности понимается по аналогии с одним процессом: временные оценки статистических характеристик пары должны совпадать с ансамблевыми. Отдельного критерия для двух процессов методичка не приводит.

Совокупность гауссова, если процессы имеют совместное гауссово распределение. Гауссовость каждого процесса по отдельности не гарантирует гауссовости совокупности. Если процессы статистически независимы и каждый имеет гауссову плотность вероятности, их совместная плотность также гауссова. *(Мальцев и др. [1], §6.2.)*