

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский Нижегородский  
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

С. А. Скороходов

# ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

Конспект по материалу 1 семестра  
Дисциплины – Математический Анализ

Студента группы 417/0424С1ИБг1  
1 курса специалитета

Основная образовательная программа  
подготовки по направлению  
10.05.02 «Информационная безопасность  
телекоммуникационных систем»  
(направленность «Системы подвижной цифровой  
защищенной связи»)

Нижний Новгород  
Издательство "Невыспавшийся Студент"  
2025

# Содержание

<b>1</b>	<b>Основные понятия теории пределов и непрерывности функций многих переменных</b>	<b>4</b>
1.1	Понятие $k$ -мерного Евклидова пространства	4
1.2	Понятие функции многих переменных	5
	Частные случаи функций многих переменных	6
1.3	Понятие предела функции многих переменных	7
	Предел функции многих переменных	7
	Двойной предел	8
	Геометрический смысл двойного предела	8
	Независимость предела от пути	9
	Примеры решения двойных пределов	9
1.4	Понятие непрерывности функции многих переменных	10
	Приращение функции одной переменной	10
	Непрерывность функции многих переменных	10
	Непрерывность на языке « $\varepsilon - \delta$ »	11
	Приращение аргументов и функции	11
	Полное приращение функции	11
	Непрерывность по совокупности переменных	12
	Частное приращение функции	12
	Непрерывность по отдельной переменной	12
<b>2</b>	<b>Дифференцирование функций многих переменных</b>	<b>14</b>
2.1	Определение частных производных и их геометрический смысл	14
	Функция многих переменных	14
	Частная производная	14
	Частные производные первого порядка	15
	Функция двух переменных	15
	Геометрический смысл	15
2.2	Дифференцируемые функции	16
	Необходимое и достаточное условие дифференцируемости функции одной переменной	16
	Определение функции многих переменных $y = f(\vec{x})$	16
	Необходимые условия дифференцируемости	17
	Достаточное условие дифференцируемости	18
	Теорема о связи между непрерывностью и дифференцируемостью функции многих переменных	19
2.3	Дифференциальная функция многих переменных	19
2.4	Производная сложной функции	21
	Следствия	22
2.5	Производные и дифференциалы высших порядков функции многих переменных	23
	Смешанная частная производная 2 и 3 порядков	23
	Теорема о равенстве смешанных производных	23

Пример равенства смешанных производных . . . . .	23
Дифференциалы высших порядков . . . . .	24
Дифференциальные операторы . . . . .	24
Дифференциал 2-го порядка . . . . .	24
Операторная запись дифференциалов . . . . .	25
Обобщение на функции многих переменных . . . . .	26
2.6 Производные второго порядка сложной функции . . . . .	26
Производная второго порядка по $y$ . . . . .	27
Смешанная производная $z''_{xy}$ . . . . .	27
2.7 Дифференциалы сложной функции . . . . .	28
Свойство инвариантности дифференциала . . . . .	29
Дифференциал второго порядка . . . . .	29
Сравнение дифференциалов . . . . .	30
Формулы . . . . .	30
2.8 Дифференцирование неявно заданной функции . . . . .	31
Теорема о существовании и дифференцируемости неявно заданной функции (без доказательства) . . . . .	31
2.9 Дифференцирование неявно заданной функции . . . . .	32
Теорема о существовании и дифференцируемости неявно заданной функции (без доказательства) . . . . .	33

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий конспект представляет собой краткие записи по курсу «Математический анализ» по теме «Дифференциалы», оформленный с использованием  $\text{\LaTeX}$ . Он не претендует на статус полноценного учебного пособия и предназначен исключительно для личного использования при подготовке к занятиям и экзаменам.

Материал изложен с учётом программы курса, однако может содержать некоторые погрешности и упрощения. При использовании конспекта рекомендуется сверяться с дополнительными источниками и учебной литературой. Автор не несёт ответственности за результаты вашей сессии.

Распространение данного документа допускается только с личного согласия автора (Скороходов Сергей Александрович).

Выражаю особую признательность преподавателю дисциплины «Математический анализ» Семериковой Надежде Петровне за помощь в освоении курса и подготовке материалов для конспекта.

Для цитирования данного конспекта в работах, подготовленных в  $\text{\LaTeX}$ , рекомендуется использовать библиографическую запись следующего вида:

```
@book{notediffserkin0,  
  title = {Дифференциалы},  
  author = {Скороходов, С.А.},  
  publisher = {Издательство "Невыспавшийся Студент"},  
  year = {2025},  
  volume = {1},  
  address = {Нижний Новгород},  
  edition = {2-е изд., перераб.},  
  language = {russian},  
  url = {https://github.com/SerKin0/IBTS-math-1k1k-latex-differentials}  
}
```


# I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ПРЕДЕЛОВ И НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

## 1. Понятие $k$ -мерного Евклидова пространства


Рассмотрим множество  $\mathbb{R}^k = \mathbb{R} \cdot \mathbb{R} \cdot \dots \cdot \mathbb{R}$  упорядоченных наборов действительных чисел длины  $k$   $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ , где  $x_1 \in \mathbb{R}, x_2 \in \mathbb{R}, \dots, x_k \in \mathbb{R}$ .

Упорядоченный набор  $(x_1, x_2, \dots, x_k)$  называется **точкой** или **вектором на множестве**  $\mathbb{R}^k$  и обозначается  $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k)$ , а действительные числа  $x_1, x_2, \dots, x_k$  называются координатными векторами или точками.

Пусть  $k = 2$ , тогда множество  $\mathbb{R}^k$  определяет плоскость рис. 1а. Координаты любой точки на плоскости — это упорядоченная пара чисел  $(x_1, x_2)$ , эта пара чисел является координатами вектора, проведенного из начала координат в данную точку.



(а) При  $k = 2$



(б) При  $k = 3$

Рис. 1. Примеры  $\mathbb{R}^k$  пространств

Аналогично, если  $k = 3$ , то упорядоченный набор  $(x_1, x_2, x_3)$  определяет точку или вектор в пространстве (Рис. 1б).

Таким образом, элементами множества  $\mathbb{R}^k$  являются векторы. Над векторами вводятся следующие операции:

### 1. Сложение векторов

Если  $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$  и  $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k$ , то суммой векторов  $(\vec{x} + \vec{y})$ , будет являться сумма соответствующих координат:

$$(\vec{x} + \vec{y}) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_k + y_k) \quad (1.1.1)$$

### 2. Умножение вектора на скаляр

Если  $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k)$  и  $\alpha \in \mathbb{R}$  - действительное число, то  $\alpha\vec{x} \in \mathbb{R}^k$  - это вектор с координатами:

$$(\alpha\vec{x}) = (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2, \dots, \alpha \cdot x_k) \quad (1.1.2)$$

### 3. Скалярное произведение векторов

Если  $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$  и  $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k$ , тогда *скалярным произведением векторов* называться скалярная величина, равная сумме произведений

одноименных координат:

$$(\vec{x} + \vec{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_k y_k = \sum_{i=1}^k x_i y_i \quad (1.1.3)$$

#### 4. Норма или длина вектора

Длина вектора  $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k)$  вычисляется по формуле:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_k^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^k x_i^2} \quad (1.1.4)$$

#### 5. Расстояние между двумя точками или векторами

Если  $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{R}^k$  и  $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_k) \in \mathbb{R}^k$ , то расстояние между точками  $\rho(\vec{x}, \vec{y})$  определяется длиной вектора  $(\vec{x} - \vec{y})$ :

$$\begin{aligned} \rho(\vec{x}, \vec{y}) &= \|\vec{x} - \vec{y}\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_k - y_k)^2} = \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^k (x_i - y_i)^2} \end{aligned} \quad (1.1.5)$$

Если в множестве  $\mathbb{R}^k$  введены рассмотренные выше операции с векторами, то оно называется **k-мерным Евклидовым пространством**.

## 2. Понятие функции многих переменных

Начнем с определения функции одной переменной.

Если каждому числу  $x$  из множества  $\mathbb{E}$ , которое является подмножеством действительных чисел  $\mathbb{R}$ , соответствует число  $y$  из множества  $Y$ , также являющегося подмножеством  $\mathbb{R}$  в соответствии с правилом  $f$ , то говорят, что на множестве  $\mathbb{E}$  задана функция  $y = f(x)$ . Множество  $\mathbb{E}$  называют областью определения функции, а  $Y$  — множеством её значений.

Функция нескольких переменных определяется аналогично, только вместо одного числа используются несколько независимых переменных.

### Определение функции k независимых переменных

Если каждому вектору  $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k)$  из множества  $\mathbb{E} \subset \mathbb{R}^k$  соответствует число  $y$  из множества  $Y \subset \mathbb{R}$  по правилу  $f$ , то на множестве  $\mathbb{E}$  задана функция нескольких переменных, которую обозначают как  $y = f(\vec{x})$  или  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ .

Здесь  $x_1, x_2, \dots, x_k$  — независимые переменные (аргументы функции), а  $y$  — зависимая переменная.

Множество  $\mathbb{E} \subset \mathbb{R}^k$  называют областью определения функции, а множество  $Y \subset \mathbb{R}$  — её множеством значений.

### Частные случаи функций многих переменных

Рассмотрим функции двух и трех переменных. Для функции двух переменных:

- Если  $k = 2$ , то  $y = f(x_1, x_2)$ , что записывается как  $z = f(x, y)$ ;
- Если  $k = 3$ , то  $y = f(x_1, x_2, x_3)$ , что записывается как  $w = f(x, y, z)$ .

Особенно важна функция двух переменных  $z = f(x, y)$ , где  $x$  и  $y$  — независимые переменные. Область определения этой функции — множество точек  $(x, y)$ , принадлежащих некоторому подмножеству  $\mathbb{E} \subset \mathbb{R}^2$ . Зависимая переменная  $z$  принимает значения из множества  $Z \subset \mathbb{R}$ , которое откладывается по вертикальной оси в пространстве XYZ.

По определению функции, каждой паре  $(x, y) \in \mathbb{E}$  ставится в соответствие единственное значение  $z$  по закону  $f$ . Это означает, что функция двух переменных имеет графическое представление в виде поверхности в пространстве. Эта поверхность состоит из всех значений функции во всех точках области определения  $\mathbb{E}$ .

#### Параболоид вращения (Рис. 2)

$$z = x^2 + y^2$$

О.О.  $(x, y) \in \mathbb{R}$ ,  $z \geq 0$  - множество значений




Рис. 2. Параболоид

#### Коническая поверхность (Рис. 3)

$$z^2 = x^2 + y^2$$

— это неявно заданная функция. Выразим из уравнения  $z$ ,  $z = \pm \sqrt{x^2 + y^2}$  - получаем две явно заданные функции:

1.  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $z \geq 0$
2.  $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $z \leq 0$




Рис. 3. Коническая поверхность

### Сфера с центром в начале (Рис. 4)

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Функция  $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$  задает верхнюю половину сферы. Здесь область определения  $R^2 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq R^2$  - круг радиуса  $R$ , а множество значений  $0 \leq z \leq R$ .

Функция  $z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$  задает нижнюю половину сферы, область определения  $x^2 + y^2 \leq R^2$ , а множество значений  $-R \leq z \leq 0$ .

**Замечание:** Функции, большего числа переменных, не имеют геометрического изображения.




Рис. 4. Сфера с центром в начале

## 3. Понятие предела функции многих переменных

### Предел функции одной переменной

Вспомним определение предела для функции одной действительной переменной. Пусть  $y = f(x)$ , где  $x \in \mathbb{E} \subset \mathbb{R}$ . Точка  $x = a$  является предельной точкой множества  $\mathbb{E}$ ; она может как принадлежать  $\mathbb{E}$ , так и не принадлежать ему ( $a \in \mathbb{E}$  или  $a \notin \mathbb{E}$ ).

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0) (\forall x \in \mathbb{E}, 0 < |x - a| < \delta) :$$

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad (1.3.1)$$

В определении предела неравенство  $0 < |x - a| < \delta$  означает, что  $x \in (a - \delta, a + \delta)$  и  $x \neq a$ . Геометрический смысл модуля  $|x - a| = \rho(x, a)$  — это расстояние между точками  $x$  и  $a$  на действительной оси, причём  $0 < \rho(x, a) < \delta$ .


### Предел функции многих переменных

Обобщим определение предела на случай функции многих переменных. Пусть  $y = f(\vec{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$  определена на множестве  $\mathbb{E} \subset \mathbb{R}^k$ . Точка  $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_k)$  является предельной для  $\mathbb{E}$  и может как принадлежать  $\mathbb{E}$ , так и не принадлежать ему ( $\vec{a} \in \mathbb{E}$  или  $\vec{a} \notin \mathbb{E}$ ).

Расстояние между точками в  $\mathbb{R}^k$  было введено в Раздел 1.1:

$$\rho(\vec{x}, \vec{a}) = \|\vec{x} - \vec{a}\| = \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \dots + (x_k - a_k)^2}. \quad (1.3.2)$$




 Рис. 5. Интервал  $(a - \delta, a + \delta)$  с выколотой точкой

Предел функции многих переменных обозначается следующим образом:

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} f(\vec{x}) = A \quad \text{или} \quad \lim_{\substack{x_1 \rightarrow a_1 \\ x_2 \rightarrow a_2 \\ \vdots \\ x_k \rightarrow a_k}} f(x_1, x_2, \dots, x_k) = A. \quad (1.3.3)$$

На языке « $\varepsilon$ - $\delta$ » определение аналогично (1.3.1), но вместо чисел  $x$  и  $a$  используются векторы  $\vec{x}$  и  $\vec{a}$ , а модуль  $|x - a|$  заменяется на норму  $\|\vec{x} - \vec{a}\|$ :

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0) (\forall \vec{x} \in \mathbb{E}, 0 < \|\vec{x} - \vec{a}\| < \delta) : |f(\vec{x}) - A| < \varepsilon \quad (1.3.4)$$

### Замечание о пределах

**Замечание.** Поскольку определение предела (1.3.4) для функции многих переменных совпадает с определением для функции одной переменной, все теоремы о пределах, доказанные для случая одной переменной, переносятся на случай многих переменных.

### Двойной предел

Рассмотрим предел функции двух переменных  $z = f(x, y)$ , называемый двойным пределом. Пусть точка  $M(x, y) \in \mathbb{E} \subset \mathbb{R}^2$  принадлежит области определения функции, а точка  $M_0(a, b)$  является предельной для  $\mathbb{E}$  ( $M_0 \in \mathbb{E}$  или  $M_0 \notin \mathbb{E}$ ). Тогда:

$$A = \lim_{M \rightarrow M_0} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x, y). \quad (1.3.5)$$

Расстояние между точками  $M$  и  $M_0$  вычисляется по формуле:

$$\rho(M, M_0) = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta.$$

На языке « $\varepsilon$ - $\delta$ » двойной предел записывается так:

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0) (\forall (x, y) \in \mathbb{E}, 0 < \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \delta) : \quad (1.3.6)$$

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon \quad (1.3.7)$$

**Геометрический смысл двойного предела**

Рассмотрим геометрический смысл неравенства:

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta = \delta(\varepsilon), \quad (1.3.8)$$

$$0 < (x-a)^2 + (y-b)^2 < \delta^2(\varepsilon). \quad (1.3.9)$$

Это задаёт круг радиуса  $\delta(\varepsilon)$  с выколотым центром в точке  $M_0(a, b)$ . Такой круг называют  $\delta$ -окрестностью точки  $M_0$  (Рис. 6).

Для сравнения: в случае функции  $y = f(x)$   $\delta$ -окрестность точки  $a$  — это интервал  $(a - \delta, a + \delta)$  с выколотой точкой  $a$  (Рис. 5).

**Независимость предела от пути**

Из определения двойного предела следует, что если предел существует, то он не зависит от пути, по которому точка  $M$  приближается к  $M_0$ . Число возможных направлений бесконечно, в отличие от функции одной переменной, где таких направлений всего два (слева и справа от точки  $a$ ).




Рис. 6




Рис. 7

**Примеры решения двойных пределов**

1. Вместо  $x$  и  $y$  подставляем предельные значения:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} \frac{x \cdot y}{x^2 + y^2} = \frac{1 \cdot 2}{1^2 + 2^2} = \frac{2}{5}$$

2. По теореме и произведении бесконечно малых на ограниченную:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x + y \cdot \sin \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow 0} x + \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} y \cdot \sin \frac{1}{x} = 0$$

3. Используя первый замечательный предел:

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 2}} \left( x \cdot \sin \frac{1}{xy} \right) [\infty \cdot 0] &= \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 2}} \left( \frac{\sin \frac{1}{xy}}{\frac{1}{xy}} \right) \left[ \frac{0}{0} \right] = \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 2}} \left( \frac{\sin \frac{1}{xy}}{\frac{1}{xy} \cdot y} \right) = \lim_{y \rightarrow 2} \frac{1}{y} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

4. Покажем что предел не существует. Для этого выберем окрестность предельной точки  $M_0(0,0)$  и предположим, что точка  $M(x,y) \rightarrow M_0(0,0)$  по различным путям (выше уже было сказано, что число таких направлений бесконечно). Для простоты выберем две прямые:  $y = x$  и  $y = -x$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \left| \begin{array}{l} y = x \\ x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \left| \begin{array}{l} y = -x \\ x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (-x)}{x^2 + (-x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}$$

Таким образом, рассмотрели 2 частных предела, они не равны между собой, следовательно двойной предел не существует.

#### 4. Понятие непрерывности функции многих переменных

##### Непрерывность функции одной переменной

Вспомним определение непрерывной функции одного действительного переменного. Функция  $y = f(x)$ , где  $x \in E \subset \mathbb{R}$ , называется непрерывной в точке  $x_0 \in E$ , если  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ , то есть предел  $f(x)$  при  $x \rightarrow x_0$  равен значению функции в точке  $x_0$ .

В этом случае предельная точка  $x_0 \in E$ , поэтому на языке  $\varepsilon - \delta$ -определение принимает вид:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0)(\forall x \in E \subset \mathbb{R}, |x - x_0| < \delta) : |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad (1.4.1)$$

##### Приращение функции одной переменной

Если в определении (1.4.1)  $(x - x_0 = \Delta x)$  приращение аргумента,  $f(x) - f(x_0) = \Delta f(x_0)$  – приращение функции, то определение (1.4.1) можно записать в виде:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0)(\forall x \in E \subset \mathbb{R}, |\Delta x| < \delta) : |\Delta f(x_0)| < \varepsilon \quad (1.4.2)$$

Поэтому из непрерывной функции малым приращением аргумента соответствуют малые приращения функции.

### Непрерывность функции многих переменных

Обобщим определения непрерывности функции одной переменной на случай функции многих переменных. Пусть на множестве  $E \subset \mathbb{R}^k$  задана функция  $y = f(\vec{x})$ , где  $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_k) \in E \subset \mathbb{R}^k$  и пусть  $\vec{x}_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0k}) \in E \subset \mathbb{R}^k$  - предельная точка множества  $E$ .

Функция  $y = f(\vec{x})$  называется непрерывной в точке  $\vec{x}_0$ , если:

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} f(\vec{x}) = f(\vec{x}_0) \quad \lim_{\substack{x_1 \rightarrow a_1 \\ x_2 \rightarrow a_2 \\ \dots \\ x_k \rightarrow a_k}} f(x_1, x_2, \dots, x_k) = f(x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0k}) \quad (1.4.3)$$

### Непрерывность на языке « $\varepsilon - \delta$ »

На языке « $\varepsilon - \delta$ » это определение получается из определения (1.4.1) при замене  $x \rightarrow \vec{x}$ ,  $x_0 \rightarrow \vec{x}_0$  и  $|x - x_0| \rightarrow \|\vec{x} - \vec{x}_0\|$ .

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0)(\forall \vec{x} \in E \subset \mathbb{R}^k, \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta) : |f(\vec{x}) - f(\vec{x}_0)| < \varepsilon \quad (1.4.4)$$

### Приращение аргументов и функции

В определении (1.4.4) обозначим:

$$\Delta \vec{x} = \vec{x} - \vec{x}_0 = (x_1 - x_{01}, x_2 - x_{02}, \dots, x_k - x_{0k}) = (\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_k) \quad (1.4.5)$$

— вектор приращения аргументов.

$$\Delta f(\vec{x}) = f(\vec{x}) - f(\vec{x}_0) \quad (1.4.6)$$

— приращение функции, аналогичное (1.4.2), только здесь  $\Delta x$  заменяем на вектор  $\Delta \vec{x}$ , и соответственно  $|\Delta x|$  заменяем на  $\|\Delta \vec{x}\|$ .

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0)(\forall \vec{x} \in E \subset \mathbb{R}^k, \|\Delta \vec{x}\| < \delta) : |\Delta f(\vec{x}_0)| < \varepsilon \quad (1.4.7)$$

— здесь  $\|\Delta \vec{x}\| = \sqrt{(\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2 + \dots + (\Delta x_k)^2}$ .

### Полное приращение функции

Если дать приращение переменной  $\vec{x}$  в точке  $\vec{x}_0$  по все независимым переменным одновременной т.е.  $\vec{x} - \vec{x}_0 = \Delta \vec{x} \Rightarrow \vec{x} = \vec{x}_0 + \Delta \vec{x} = (x_1 + x_{01}, x_2 + x_{02}, \dots, x_k + x_{0k})$ , то приращение, которое получит функция  $f(\vec{x})$  в точке  $\vec{x}_0$  называется полным приращением функции (1.4.8).

$$\begin{aligned} \Delta f(\vec{x}_0) &= f(\vec{x}) - f(\vec{x}_0) = f(\vec{x}_0 + \Delta \vec{x}) = \\ &= f(x_1 + x_{01}, x_2 + x_{02}, \dots, x_k + x_{0k}) - f(x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0k}) \end{aligned} \quad (1.4.8)$$

**Непрерывность по совокупности переменных**

Тогда определение непрерывности (1.4.7) словами можно сформулировать так:

Функция  $y = f(\vec{x})$  непрерывна в точке  $\vec{x}_0$  по совокупности переменные (т.е. по всем переменным  $x_1, x_2, \dots, x_k$  одновременно), если малым приращениям всех независимых переменных соответствует малое полное приращение функции.

**Частное приращение функции**

Для функции многих переменных приращение аргумента можно давать также только по отдельности переменной. Обозначим ее  $x_i$ , где  $i = 1, 2, \dots, k$ , что означает либо по  $x_1$ , либо по  $x_2$ , ..., либо по  $x_k$ . Вектор приращений аргументов в этом случае принимает вид:

$$\Delta \vec{x} = (0, \dots, 0, \Delta x_i, 0, \dots, 0)$$

$$\vec{x} = \vec{x}_0 + \Delta \vec{x} = (x_{0_1}, \dots, x_{0_{i-1}}, x_{0_i} + \Delta x_i, x_{0_{i+1}}, \dots, x_{0_k})$$

Тогда приращение, которое получит функция в этом случае, называется **частным приращением функции** в точке  $\vec{x}_0$  по переменной  $x_i$  и обозначается  $\Delta_i f(\vec{x}_0)$ :

$$\begin{aligned} \Delta_i f(\vec{x}_0) &= f(\vec{x}_0 + \Delta \vec{x}) - f(\vec{x}_0) = f(x_{0_1}, \dots, x_{0_{i-1}}, x_{0_i} + \Delta x_i, x_{0_{i+1}}, \dots, x_{0_k}) - \\ &\quad - f(x_{0_1}, \dots, x_{0_{i-1}}, x_{0_i}, x_{0_{i+1}}, \dots, x_{0_k}) \end{aligned} \quad (1.4.9)$$

**Непрерывность по отдельной переменной**

Функция  $y = f(\vec{x})$  называется непрерывной в точке  $\vec{x}_0$  по отдельной переменной  $x_i$ , если:

$$\begin{aligned} \lim_{x_i \rightarrow x_{0_i}} f(x_{0_1}, \dots, x_{0_{i-1}}, x_{0_i}, x_{0_{i+1}}, \dots, x_{0_k}) = \\ = f(x_{0_1}, \dots, x_{0_{i-1}}, x_{0_i}, x_{0_{i+1}}, \dots, x_{0_k}), \end{aligned} \quad (1.4.10)$$

здесь  $i = 1, k$ , т.е. функция может быть непрерывной, либо по переменной  $x_1$ , либо  $x_2$ , ..., либо по  $x_k$ . В этом случае:

$$||\Delta \vec{x}|| = \sqrt{0 + \dots + 0 + (\Delta x_i)^2 + \dots + 0} = \sqrt{(\Delta x_i)^2} = |\Delta x_i| \quad (1.4.11)$$

Тогда определение (1.4.7) принимает вид и значит:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0)(\forall \vec{x} \in E \subset \mathbb{R}^k, |\Delta x_i| < \delta) : |\Delta_i f(\vec{x}_0)| < \varepsilon \quad (1.4.12)$$

Функция  $y = f(\vec{x})$  называется непрерывной в точке  $\vec{x}_0$  по переменной  $x_i$ , если малым приращением этой переменной  $\Delta x_i$ , соответствует малое частное приращение функции  $\Delta_i f(\vec{x}_0)$ .

**Теорема и замечание****Теорема (без доказательства)**

Если функция  $y = f(\vec{x})$  непрерывна в точке  $\vec{x}_0$  по совокупности переменных, то она будет непрерывна и по каждой переменной в отдельности. Обратно утверждение не всегда верно.

**Замечание**

Если функция  $y = f(\vec{x})$  непрерывна по совокупности переменных, то для нее будет выполняться все теоремы о непрерывности, доказанные для функции одной переменной.

## II. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

### 1. Определение частных производных и их геометрический смысл

#### Функция одной переменной

Рассмотрим функцию  $y = f(x)$ , где  $x \in E \subset \mathbb{R}$  и  $y \in E$ . Запишем определение производной в точке  $x_0$ . Для этого зададим приращение аргумента  $\Delta x = x - x_0$  (или  $x = x_0 + \Delta x$ ) и вычислим приращение функции:

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

Производной функции в точке называется предел отношения приращения функции к приращению аргумента при  $\Delta x \rightarrow 0$ :

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \frac{df(x_0)}{dx}. \quad (2.1.1)$$

#### Функция многих переменных

Теперь обобщим определение (2.1.1) на случай функции многих переменных  $y = f(\vec{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ . Поскольку дифференцирование проводится по одной переменной, зададим приращение в точке  $\vec{x}_0$  только по переменной  $x_i$ . Вектор приращений имеет вид:

$$\Delta \vec{x} = (0, \dots, 0, \Delta x_i, 0, \dots, 0),$$

тогда:

$$\vec{x} = \vec{x}_0 + \Delta \vec{x} = \left( x_0^{(1)}, \dots, x_0^{(i-1)}, x_0^{(i)} + \Delta x_i, x_0^{(i+1)}, \dots, x_0^{(k)} \right).$$

Соответствующее частное приращение функции:

$$\Delta_i f(\vec{x}_0) = f(x_{0_1}, \dots, x_{0_{i-1}}, x_{0_i} + \Delta x_i, x_{0_{i+1}}, \dots, x_{0_k}) - f(x_{0_1}, \dots, x_{0_k}). \quad (2.1.2)$$

#### Частная производная

По аналогии с (2.1.1) определим частную производную как предел:

$$\exists \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\Delta_i f(\vec{x}_0)}{\Delta x_i}. \quad (2.1.3)$$

Если этот предел существует, то он называется частной производной функции  $y = f(\vec{x})$  в точке  $\vec{x}_0$  по переменной  $x_i$  и обозначается:

$$f'_{x_i}(\vec{x}_0) = \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i}. \quad (2.1.4)$$

**Замечание:** Запись  $\frac{df(\vec{x}_0)}{dx_i}$  не используется для частных производных.

**Частные производные первого порядка**

Поскольку производная вычисляется по одной из  $k$  независимых переменных, функция  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$  имеет  $k$  частных производных первого порядка:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_k}. \quad (2.1.5)$$

**Функция двух переменных**

Рассмотрим частный случай  $z = f(x, y)$ . В точке  $M_0(x_0, y_0)$  зададим приращение  $\Delta x$  по переменной  $x$ . Частное приращение:

$$\Delta_x z(M_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0). \quad (2.1.6)$$

Частная производная по  $x$ :

$$\frac{\partial z(M_0)}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z(M_0)}{\Delta x}. \quad (2.1.7)$$

Аналогично для приращения  $\Delta y$  по  $y$ :

$$\frac{\partial z(M_0)}{\partial y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}. \quad (2.1.8)$$

**Правила вычисления**

При вычислении  $\frac{\partial z}{\partial x}$  переменная  $y$  считается константой, и наоборот. Используются стандартные правила дифференцирования:

- Производная константы равна нулю.
- Константа выносится за знак производной.

**Геометрический смысл**

Функция  $z = f(x, y)$  задаёт поверхность в  $\mathbb{R}^3$ . Точке  $M_0(x_0, y_0)$  соответствует точка  $N(x_0, y_0, z_0)$  на поверхности.

**Производная по  $x$  (Рис. 8).** При  $y = y_0$  получаем сечение поверхности плоскостью, параллельной  $XOZ$ . Частная производная  $\frac{\partial z}{\partial x}$  равна тангенсу угла  $\alpha$  наклона касательной к этому сечению:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\partial z(M_0)}{\partial x}.$$

**Производная по  $y$  (Рис. 9).** Аналогично, при  $x = x_0$ :

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{\partial z(M_0)}{\partial y}.$$






Рис. 8. Геометрический смысл  $\frac{\partial z}{\partial x}$ .




Рис. 9. Геометрический смысл  $\frac{\partial z}{\partial y}$ .

## 2. Дифференцируемые функции

### Определение дифференцируемой функции $y = f(x)$ в точке $x_0$

Функция  $y = f(x)$  называется **дифференцируемой в точке  $x_0$** , если её приращение в этой точке представимо в виде:

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \cdot \Delta x + \alpha(\Delta x) \rightarrow 0 \quad (2.2.1)$$

где  $A = \text{const}$ ,  $\alpha(\Delta x)$  - бесконечно малая при  $\Delta x \rightarrow 0$ , т.е.  $\alpha(\Delta x) \cdot \Delta x$  - величина бесконечно малая, более высокого порядка малости, чем  $\Delta x$ .

### Необходимое и достаточное условие дифференцируемости функции одной переменной

Существование конечной производной в точке  $x_0$ .

Было доказано, что  $A = f'(x_0)$  и определение дифференцируемой функции можно представить следующим образом:

$$\Delta f(x_0) = f'(x_0) \cdot \Delta x + \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x \quad \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x = O(\Delta x) \quad (2.2.2)$$

### Определение функции многих переменных $y = f(\vec{x})$

Функция  $y = f(\vec{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ , где  $\vec{x} \in \mathbb{E} \subset \mathbb{R}^k$  называется дифференци-

руемой в точке  $\vec{x}_0 = (x_{0_1}, x_{0_2}, \dots, x_{0_k}) \in \mathbb{E} \subset \mathbb{R}^k$ , если ее полное приращение:

$$\begin{aligned}\Delta f(\vec{x}_0) &= f(\vec{x}_0 + \Delta \vec{x}) - f(\vec{x}_0) = \\ &= f(x_{0_1} + \Delta x_1, x_{0_2} + \Delta x_2, \dots, x_{0_k} + \Delta x_k) - f(x_{0_1}, x_{0_2}, \dots, x_{0_k})\end{aligned}$$

Также можно представить в виде:

$$\Delta f(\vec{x}_0) = \vec{A} \cdot \Delta \vec{x} + \vec{\alpha}(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta \vec{x} \quad (2.2.3)$$

- $\vec{A} = (A_1, A_2, \dots, A_k)$  – постоянный вектор;
- $\Delta \vec{x} = (\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_k)$  – вектор приращений;
- $\vec{\alpha}(\Delta \vec{x}) = (\alpha_1(\Delta \vec{x}), \alpha_2(\Delta \vec{x}), \dots, \alpha_k(\Delta \vec{x}))$ , причем  $\alpha_1(\Delta \vec{x}) \rightarrow \vec{0}$ , при  $\Delta \vec{x} \rightarrow \vec{0}$ . ( $\vec{0}$  – ноль вектор);

Распишем в определении 2.2.3 скалярное произведение:

$$\vec{A} \cdot \Delta \vec{x} = A_1 \Delta x_1 + A_2 \Delta x_2 + \dots + A_k \Delta x_k = \sum_{i=1}^k A_i \Delta x_i$$

$$\vec{\alpha}(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta \vec{x} = \alpha_1(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta x_1 + \alpha_2(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta x_2 + \dots + \alpha_k(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta x_k = \sum_{i=1}^k \alpha_i(\Delta \vec{x}) \Delta x_i$$

Тогда получаем определение дифференцируемой функции в **координатной форме**:

$$\Delta f(\vec{x}_0) = \sum_{i=1}^k A_i \cdot \Delta x_i + \sum_{i=1}^k \alpha_i(\Delta \vec{x}) \cdot x_i \quad (2.2.4)$$

### Необходимые условия дифференцируемости

Если функция  $y = f(\vec{x})$  дифференцируема в точке  $\vec{x}_0$ , то она имеет в этой точке частные производные.

**Доказательство:** Запишем определение дифференцируемой функции в координатной форме 2.2.3.

$$\Delta f(\vec{x}_0) = \sum_{i=1}^k A_i \Delta x_i + \sum_{i=1}^k \alpha_i(\Delta \vec{x}) \cdot \vec{x}_i$$

Зададим вектор приращений  $\Delta \vec{x}$  в виде:  $\Delta \vec{x} = (0, \dots, 0, \Delta x_i, 0, \dots, 0)$ . Тогда полное приращение в записанной формуле будет совпадение с частным приращением в

точке  $\vec{x}_0$  по переменной  $x_i$  и в сумме останется только два слагаемых:

$$\Delta f(\vec{x}_0) = \Delta_i f(\vec{x}_0) = A_i \cdot \Delta x_i + \alpha_i(\Delta \vec{x}) \cdot x_i \quad (\text{поделим обе части на } \Delta x_i)$$

$$\frac{\Delta_i f(\vec{x}_0)}{\Delta x_i} = \frac{A_i \cdot \Delta x_i + \alpha_i(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta x_i}{\Delta x_i} = A_i + \alpha_i(\Delta \vec{x}) \quad | \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0}$$

$$\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\Delta_i f(\vec{x}_0)}{\Delta x_i} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} (A_i + \alpha_i(\Delta \vec{x})) = A_i + \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \alpha_i(\Delta \vec{x}) = A_i$$

С другой стороны:  $A_i = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\Delta_i f(\vec{x}_0)}{\Delta x_i} = \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} \Rightarrow \boxed{A_i = \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i}} \quad (i = 1, 2, \dots, k).$

Тогда получается, что координаты постоянного вектора  $\vec{A}$  равны частным производным функции  $f(\vec{x})$  в точке  $\vec{x}_0$  по всем независимым переменным.

$$\vec{A} = \left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_k} \right) \quad (2.2.5)$$

Вектор, координатами которого являются частные производные, называется градиентом функции в точке  $\vec{x}_0$  и обозначается  $\text{grad } f(\vec{x}_0)$ .

$$\vec{A} = \text{grad } f(\vec{x}_0) = \left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_k} \right)$$

Тогда из определений (2.2.2) и (2.2.3) получаем еще одно определение дифференцируемой функции.

$$\Delta f(\vec{x}_0) = \text{grad } f(\vec{x}_0) \cdot \Delta \vec{x} + \alpha(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta \vec{x} \quad (2.2.6)$$

$$\Delta f(\vec{x}_0) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} \Delta x_i + \sum_{i=1}^k \alpha_i(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta x_i \quad (2.2.7)$$

### Достаточное условие дифференцируемости

Если функция  $y = f(\vec{x})$  имеет частные производные по всем переменным в окрестности точки  $\vec{x}_0 \in \mathbb{E} \subset \mathbb{R}^k$ , причем частные производные:

$$\left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_k} \right) - \text{непрерывна в точке } \vec{x}_0,$$

то функция  $y = f(\vec{x})$  дифференцируема в точке  $\vec{x}_0$ . (Без доказательства)

Рассмотрим частный случай  $k = 2$  и из определений (2.2.6) и (2.2.7) запишем определение дифференцируемой функции 2-х переменных в точке  $\vec{x}_0 = (x_{01}, x_{02})$ .

$$y = f(x_1, x_2), \quad \text{grad } f(\vec{x}_0) = \left( \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2} \right)$$

$$\Delta \vec{x} = (\Delta x_1, \Delta x_2), \quad \vec{\alpha}(\Delta \vec{x}) = (\alpha_1(\Delta x_1, \Delta x_2), \alpha_2(\Delta x_1, \Delta x_2))$$

$$\begin{aligned} \Delta f(\vec{x}_0) &= \text{grad } f(\vec{x}_0) \cdot \Delta \vec{x} + \vec{\alpha}(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta \vec{x} = \\ &= \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2} \Delta x_2 + \alpha_1(\Delta x_1, \Delta x_2) \Delta x_1 + \alpha_2(\Delta x_1, \Delta x_2) \Delta x_2 \end{aligned}$$

Рассмотрим функцию  $z = f(x, y)$ , тогда в полученном определении заменим  $x_1$  на  $x$ , а  $x_2$  на  $y$ ,  $\Delta \vec{x} = (\Delta x, \Delta y)$ ,  $\vec{\alpha}(\Delta \vec{x}) = (\alpha_1(\Delta x, \Delta y), \alpha_2(\Delta x, \Delta y))$ .

Получаем определение дифференцируемой функции для двух переменных.

$$\Delta z(M_0) = \frac{\partial f(M_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(M_0)}{\partial y} \Delta y + \alpha_1(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \alpha_2(\Delta x, \Delta y) \Delta y \quad (2.2.8)$$

### Теорема о связи между непрерывностью и дифференцируемостью функции многих переменных

Если функции  $y = f(\vec{x})$  дифференцируема в точке  $\vec{x}_0 \in \mathbb{E} \subset \mathbb{R}^k$ , то она непрерывна в этой точке.

**Доказательство:** Запишем определение дифференцируемой функции в форме (2.2.3):

$$\Delta f(\vec{x}_0) = \vec{A} \cdot \Delta \vec{x} + \vec{\alpha}(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta \vec{x}$$

, здесь  $\vec{\alpha}(\Delta \vec{x}) \rightarrow \vec{0}$ , при  $\Delta \vec{x} \rightarrow \vec{0}$ . Перейдем к пределу при  $\Delta \vec{x} \rightarrow \vec{0}$ .

$$\lim_{\Delta \vec{x} \rightarrow \vec{0}} \Delta f(\vec{x}_0) = \lim_{\Delta \vec{x} \rightarrow \vec{0}} (\vec{A} \cdot \Delta \vec{x} + \vec{\alpha}(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta \vec{x}) = 0$$

т.е. малым приращениям аргументов ( $\Delta \vec{x} = (\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_k) \rightarrow \vec{0}$ ) соответствует малое полное приращение функции. Это означает, что функция  $y = f(\vec{x})$  непрерывна в точке  $\vec{x}_0$  по совокупности переменных.

**Замечание:** Обратное утверждение не всегда верно, по аналогии с функцией  $y = |x|$  в точке  $x = 0$ . Функция непрерывна при  $x = 0$ , но в точке не имеет производной.

## 3. Дифференциальная функция многих переменных

Если функция  $y = f(x)$  дифференцируема в точке  $x_0$ , что ее приращение представимо в виде:

$$\Delta f(x_0) = A \cdot \Delta x + \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x = A \cdot \Delta x + O(\Delta x) \quad , \text{ т.к. } \alpha(\Delta x) \rightarrow 0 \text{ при } \Delta x \rightarrow 0$$

Приращение функции состоит из двух частей,  $A \cdot \Delta x$  – линейной относительно  $\Delta x$  и величине более высокого порядка малости, чем  $\Delta x$ . Главная линейная часть называется дифференциалом функции и обозначается  $dy = A \cdot \Delta x$ , но  $A = f'(x_0)$ , а  $\Delta x = dx$ , тогда  $dy = f'(x_0) dx$ .

Рассмотрим функцию многих переменных  $y = f(\vec{x})$ ,  $\vec{x} \in E \subset \mathbb{R}^k$ . Запишем определение дифференцируемой функции в точке  $x_0$  в виде (2.2.6) и (2.2.7).

$$\Delta f(\vec{x}_0) = \boxed{\text{grad } f(\vec{x}_0) \cdot \Delta \vec{x}} + \vec{\alpha}(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta \vec{x}$$

$$\Delta f(\vec{x}_0) = \boxed{\sum_{i=1}^k \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} \Delta x_i} + \sum_{i=1}^k \alpha_i(\Delta \vec{x}) \cdot \Delta x_i$$

Выделенные части определения представляет линейную относительно  $\Delta \vec{x}$  часть приращения функции, которая называется **дифференциалом**.

$$dy = \text{grad } f(\vec{x}_0) \cdot \Delta \vec{x} = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} \Delta x_i =$$

$$= \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_k} \Delta x_k$$

**Приращения** независимых переменных обозначим через **дифференциал** независимых переменных:  $\Delta x_1 = dx_1$ ,  $\Delta x_2 = dx_2$ , ...,  $\Delta x_k = dx_k$ .

Тогда дифференциалом функции многих переменных будет равен:

$$dy = \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_k} dx_k = \sum_{i=1}^k \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} dx_i$$

Выражения вида  $\frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} dx_i$  называются **частными дифференциальными** и обозначаются:

$$d_i f(\vec{x}_0) = \frac{\partial f(\vec{x}_0)}{\partial x_i} dx_i \quad (i = 1, \dots, k)$$

Тогда полный дифференциал функции  $dy$  равен сумме частных дифференциалов по всех независимым переменным.

$$dy = \sum_{i=1}^k d_i f(x_0)$$

### Примеры

$$1. \quad z = f(x, y) \quad \Rightarrow \quad d_x z = f'_x dx, \quad d_y z = f'_y dy$$

Тогда для функции двух переменных дифференциал равен:

$$dz = f'_x dx + f'_y dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$2. \quad u = f(x, y, z) \quad \Rightarrow \quad d_x u = \frac{\partial f}{\partial x} dx, \quad d_y u = \frac{\partial f}{\partial y} dy, \quad d_z u = \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Для функции трех переменных дифференциал вычисляется по формуле:

$$du = f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

#### 4. Производная сложной функции

Рассмотрим на примере функции двух переменных. Пусть задана функция  $z = f(u, v)$ , а ее аргументы являются функциями переменных  $x$  и  $y$ :  $u = u(x, y)$  и  $v = v(x, y)$ . Тогда получаем сложную функцию  $z = f(u(x, y), v(x, y))$  независимых переменных  $x$  и  $y$ . Функции  $u = u(x, y)$  и  $v = v(x, y)$  независимых промежуточными аргументами.

В дальнейшем будем рассматривать функцию двух промежуточных и двух независимых переменных.

##### Теорема

Если функция  $z = f(u, v)$  дифференцируема в точке  $(u_0, v_0) \in D \subset \mathbb{R}^2$ , а функции  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  дифференцируемы в точке  $(x_0, y_0) \in E \subset \mathbb{R}^2$ , причем  $u_0 = u(x_0, y_0)$  и  $v_0 = v(x_0, y_0)$ .

Тогда сложная функция  $z = f(u(x, y), v(x, y))$  дифференцируема в точке  $(x_0, y_0)$  и ее частные производные в этой точке вычисляются по формулам:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial x} &= \frac{\partial f(u_0, v_0)}{\partial u} \times \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} + \frac{\partial f(u_0, v_0)}{\partial v} \times \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x} \\ \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial y} &= \frac{\partial f(u_0, v_0)}{\partial u} \times \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y} + \frac{\partial f(u_0, v_0)}{\partial v} \times \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y}\end{aligned}$$

**Доказательство:** Воспользуемся определением дифференцируемой функции двух переменных (2.2.8).

$$\Delta z(M_0) = \frac{\partial f(M_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(M_0)}{\partial y} \Delta y + \alpha_1(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \alpha_2(\Delta x, \Delta y) \Delta y \quad (2.4.1)$$

где  $\alpha_1(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$  и  $\alpha_2(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$ , при  $\Delta x \rightarrow 0$  и  $\Delta y \rightarrow 0$ .

Так как функция  $z = f(u, v)$  дифференцируема в точке  $(u_0, v_0)$ , то ее полное приращение запишем в виде:

$$\Delta z(u_0, v_0) = \frac{\partial f(u_0, v_0)}{\partial u} \Delta u + \frac{\partial f(u_0, v_0)}{\partial v} \Delta v + \alpha(\Delta u, \Delta v) \Delta u + \beta(\Delta u, \Delta v) \Delta v \quad (2.4.2)$$

где  $\alpha(\Delta u, \Delta v) \rightarrow 0$  и  $\beta(\Delta u, \Delta v) \rightarrow 0$ , при  $\Delta u \rightarrow 0$  и  $\Delta v \rightarrow 0$ . Т.к. функции  $u = u(x, y)$  и  $v = v(x, y)$  дифференцируемы в точке  $(x_0, y_0)$ , то их полные приращения имеют вид:

$$\Delta u(x_0, y_0) = \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y} \Delta y + \alpha_1(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \beta_1(\Delta x, \Delta y) \Delta y \quad (2.4.3)$$

где  $\alpha_1(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$ ,  $\beta_1(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$  при  $\Delta x \rightarrow 0$  и  $\Delta y \rightarrow 0$ .

$$\Delta v(x_0, y_0) = \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y} \Delta y + \alpha_2(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \beta_2(\Delta x, \Delta y) \Delta y \quad (2.4.4)$$

где  $\alpha_2(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$ ,  $\beta_2(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$  при  $\Delta x \rightarrow 0$  и  $\Delta y \rightarrow 0$ .

Подставим  $\Delta u(x_0, y_0)$  и  $\Delta v(x_0, y_0)$  из выражений (2.4.2) и (2.4.4) в (2.4.1), кроме двух последних слагаемых  $\alpha(\Delta u, \Delta v)\Delta u$  и  $\beta(\Delta u, \Delta v)\Delta v$ , иначе получается громоздкие выражения:

$$\Delta z(u_0, v_0) = \frac{\partial f(u_0, v_0)}{\partial u} \left( \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y} \Delta y + \right. \\ \left. + \alpha_1(\Delta x, \Delta y)\Delta x + \beta_1(\Delta x, \Delta y)\Delta y \right) \quad (2.4.5)$$

Соберем коэффициент при  $\Delta x$  и  $\Delta y$  и учтем, что  $u_0 = u(x_0, y_0)$  и  $v_0 = v(x_0, y_0)$  в левой части выражения (2.4.5).

### Следствия

Полученные формулы можно обобщить на любое количество промежуточных аргументов и независимых переменных. Пусть задана по  $y$ .

$$y = f(u_1(x_1, x_2, \dots, x_k), u_2(x_1, x_2, \dots, x_k), \dots, u_n(x_1, x_2, \dots, x_k)) \quad (2.4.6)$$

$n$  – промежуточных аргументов  $u_1, u_2, \dots, u_n$  и  $k$  независимых переменных  $x_1, x_2, \dots, x_k$ .

Тогда частные производные сложной функции по независимой переменным будут вычисляться по формуле:

$$\boxed{\frac{\partial y}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial u_1} \times \frac{\partial u_1}{\partial x_i} + \frac{\partial f}{\partial u_2} \times \frac{\partial u_2}{\partial x_i} + \dots + \frac{\partial f}{\partial u_k} \times \frac{\partial u_k}{\partial x_i} \quad (i = 1, \dots, k)} \quad (2.4.7)$$

При вычислении частных производных от сложной функции нужно запомнить, что от функции  $f$  всегда берутся производные по промежуточным переменным, а промежуточные аргументы дифференцируются по независимым переменным  $x$  и  $y$ .

Полученные формулы являются обобщениями производной сложной функции одной переменной.

$$\begin{aligned} y = f(u(x)) &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{df}{du} \times \frac{du}{dx} \\ z = f(u(x, y)) &\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{df}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{df}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \\ z = f(u(x, y), v(x, y)) &\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \\ &\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\ z = f(u(x, y), v(x, y), t(x, y)) &\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} \\ \frac{\partial z(x_0, y_0)}{\partial y} &= \frac{\partial f(u_0, v_0)}{\partial u} \cdot \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y} + \frac{\partial f(u_0, v_0)}{\partial v} \cdot \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y} \end{aligned} \quad (2.4.8)$$

## 5. Производные и дифференциалы высших порядков функции многих переменных

### Частные производные 2 и 3 порядков

Пусть  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$  имеет частные производные 1-го порядка по всем независимым переменным:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_k}. \quad (2.5.1)$$

У каждой из таких производных могут существовать частные производные 1-го порядка по всем независимым переменным, которые называются **частными производными 2-го порядка**:

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = f''_{x_i x_i} = f''_{x_i^2}, \quad (i = 1, \dots, k). \quad (2.5.2)$$

Аналогичным образом определяются **частные производные 3-го порядка**:

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x_i^3} = f'''_{x_i x_i x_i} = f'''_{x_i^3} \quad (i = 1, \dots, k) \quad (2.5.3)$$

### Смешанная частная производная 2 и 3 порядков

Частные производные, взятые по разным независимым переменным, называются **смешанными частными производными 2-го порядка**:

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = f''_{x_i x_j} \quad (i \neq j, i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, k) \quad (2.5.4)$$

**Смешанные частные производные 3-го порядка** вычисляются по двум независимым переменным, либо по трем и т.д. Таким образом, можно получать частные производные любого порядка.

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x_i^2 \partial x_j}, & f^{(3)}_{x_i x_i x_j}, & (i \neq j, i = 1, \dots, k, j = 1, \dots, k) \\ \frac{\partial}{\partial x_n} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x_n \partial x_i \partial x_j} = f'''_{x_j x_i x_n}, & (i \neq j \neq n, i, j, n = 1, \dots, k) \end{cases} \quad (2.5.5)$$

### Теорема о равенстве смешанных производных

Пусть функция  $y = f(\vec{x})$   $n$  — раз дифференцируема в точке  $\vec{x}_0 \in E \subset \mathbb{R}$  в этой точке значение любой смешанной частной производной не зависит от порядка, в котором проводится последовательное дифференцирование. (без доказательства)



**Пример равенства смешанных производных****Пример:**  $z = f(x, y)$  $z_{xy} = z_{yx}$  – смешанные частные производные 2 порядка. $z_{xxy} = z_{xyx} = z_{yxx}$ ,  $z_{xyy} = z_{yyx} = z_{yxy}$  – смешанные частные производные 3 порядка.**Дифференциалы высших порядков**

Пусть функция  $y = f(\vec{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$  дифференцируема, и её первый дифференциал равен:

$$dy = \frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f(\vec{x})}{\partial x_k} dx_k. \quad (2.5.6)$$

Тогда:

$$d(dy) = d^2y, \quad \text{дифференциал 2-го порядка,}$$

$$d(d^2y) = d^3y, \quad \text{дифференциал 3-го порядка,}$$

...

$$d(d^{n-1}y) = d^n y, \quad \text{дифференциал } n\text{-го порядка.}$$

В случае независимых переменных можно вывести общую **формулу для дифференциалов  $n$ -го порядка**. Для частного случая, функции двух переменных  $z = f(x, y)$ :

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy, \quad \text{где } dx = \Delta x, dy = \Delta y \quad (2.5.7)$$

**Дифференциальные операторы**

Рассмотрим дифференциалы операторы  $\frac{\partial}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial}{\partial y}$ , определяющие частные производные. Дифференциальные операторы всегда действуют на функцию, перед которой они стоят.

$$\frac{\partial}{\partial x} \cdot f = \frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial}{\partial y} \cdot f = \frac{\partial f}{\partial y} \quad (2.5.8)$$

Запишем выражения (2.5.7) с помощью введенных дифференциальных операторов.

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \left( \frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right) \cdot f \quad (2.5.9)$$

### Дифференциал 2-го порядка

Вычислим по определению дифференциал 2-го порядка:

$$d^2 z = d(dz) = d\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) dx + d\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) dy \quad (2.5.10)$$

При вычислении дифференциалов  $dx$  и  $dy$  независимых переменных считаем константными ( $dx = \Delta x$ ,  $dy = \Delta y$ ), поэтому вычисляем дифференциалы только от функций  $\frac{\partial z}{\partial x}$  и  $\frac{\partial z}{\partial y}$  по формуле (2.5.7):

$$\begin{cases} d\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dy = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dy \\ d\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dx + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} dx - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy \end{cases} \quad (2.5.11)$$

$$\begin{aligned} d^2 f &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dy\right) dx + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy\right) dy = \\ &= -\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} dx \cdot dy + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dy \cdot dx - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 = \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2. \end{aligned}$$

Получаем формулу дифференциала 2 порядка для формулы  $z = f(x, y)$ .

$$d^2 z = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 \quad (2.5.12)$$

### Операторная запись дифференциалов

Запишем эту формулу в операторном виде:

$$d^2 z = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy\right)^2 \cdot f.$$

так как  $\frac{\partial}{\partial x}$  и  $\frac{\partial}{\partial y}$  — дифференциальные операторы и частные производные одновременно, то:

$$\frac{\partial}{\partial x} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \cdot f = \frac{\partial}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} f,$$

где  $\frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$  — дифференциальный оператор 2-го порядка.

$$\boxed{d^2 z = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy\right)^2 f} \quad (2.5.13)$$

$$d^3z = \left( \frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^3 f \quad (2.5.14)$$

$$d^n z = \left( \frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^n f, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.5.15)$$

### Обобщение на функции многих переменных

Полученную по формуле (2.5.15) систему обобщают на дифференциалы высших порядков функции  $f$  со всеми числами независимых переменных  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$ :

$$dy = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_k} dx_k = \left( \frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_k} dx_k \right) \cdot f$$

$$d^n y = \left( \frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_k} dx_k \right)^n \cdot f$$

## 6. Производные второго порядка сложной функции

### Производные второго порядка сложной функции

Выведем формулы производных второго порядка сложной функции двух промежуточных аргументов  $u$  и  $v$  и двух независимых переменных  $x$  и  $y$ :  $z = f(u(x, y), v(x, y))$ .

$$z'_x = f'_u(u, v) u'_x(x, y) + f'_v(u, v) v'_x(x, y) \quad (2.6.1)$$

В формуле (2.6.1), выведенной в Раздел 2.4 частные производные по промежуточным аргументам  $f'_u(u, v)$  и  $f'_v(u, v)$  являются функциями, зависящими от  $u$  и  $v$ . Поэтому в (2.6.1) введем обозначения:

$$g(u, v) = f'_u(u, v) \quad \text{и} \quad h(u, v) = f'_v(u, v) \quad (2.6.2)$$

и перепишем выражение (2.6.1) в виде:

$$z'_x = g(u, v) \cdot u'_x(x, y) + h(u, v) \cdot v'_x(x, y) \quad \Big| \frac{\partial}{\partial x} \quad (2.6.3)$$

и вычислим частную производную по  $x$ .

$$\begin{aligned} z''_x &= (g(u, v) \cdot u'_x(x, y) + h(u, v) \cdot v'_x(x, y))'_x = \\ &= (g(u, v))'_x \cdot u'_x(x, y) + g(u, v) \cdot (u'_x(x, y))'_x + \\ &+ (h(u, v))'_x \cdot v'_x(x, y) + h(u, v) \cdot (v'_x(x, y))'_x = \\ &= (g(u, v))'_x \cdot u'_x(x, y) + g(u, v) \cdot u''_{xx}(x, y) + (h(u, v))'_x \cdot v'_x(x, y) + h(u, v) \cdot v''_{xx}(x, y) \end{aligned}$$

Вычислим производные сложных функций  $g(u, v)$  и  $h(u, v)$  по  $x$ , используя формулу (2.6.1):

$$\text{Подставим в формулу } z''_{xx} \quad \begin{cases} (g(u, v))'_x = g'_u(u, v) \cdot u'_x(x, y) + g'_v(u, v) \cdot v'_x(x, y) \\ (h(u, v))'_x = h'_u(u, v) \cdot u'_x(x, y) + h'_v(u, v) \cdot v'_x(x, y) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} z''_{xx} &= (g'_u(u, v)u'_x(x, y) + g'_v(u, v)v'_x(x, y)) \cdot u'_x(x, y) + g(u, v)u''_{xx}(x, y) + \\ &+ (h'_u(u, v)u'_x(x, y) + h'_v(u, v)v'_x(x, y)) \cdot v'_x(x, y) + h(u, v) \cdot v''_{xx}(x, y) = \\ &\quad \text{подставляем выражения для } g(u, v) \text{ и } h(u, v) \text{ из (2.6.2)} \\ &= ((f'_u)'_u u'_x + (f'_u)'_v v'_x) \cdot u'_x + f'_u u''_{xx} + ((f'_v)'_u u'_x + (f'_v)'_v v'_x) \cdot v'_x + f'_v v''_{xx} = \\ &= f''_{uu} u'^2_x + 2f''_{uv} u'_x v'_x + f''_{vv} v'^2_x + f'_u u''_{xx} + f'_v v''_{xx}. \end{aligned}$$

$$z''_{xx} = f''_{uu} u'^2_x + 2f''_{uv} u'_x v'_x + f''_{vv} v'^2_x + f'_u u''_{xx} + f'_v v''_{xx} \quad (2.6.4)$$

### Производная второго порядка по $y$

Так как частная производная сложной функции первого порядка по  $y$  имеет аналогичный вид выражению (2.6.1).  $z'_y = f'_u u'_y + f'_v v'_y$ , то частную производную второго порядка по  $y$ , запишем аналогично (2.6.4), заменив  $x$  на  $y$ .

$$z''_{yy} = f''_{uu} u'^2_y + 2f''_{uv} u'_y v'_y + f''_{vv} v'^2_y + f'_u u''_{yy} + f'_v v''_{yy} \quad (2.6.5)$$

### Смешанная производная $z''_{xy}$

Выведем смешанную производную  $z''_{xy}$ . Для этого выражение (2.6.1) для  $z'_x$  перепишем с учетом (2.6.2).

$$\begin{aligned} z'_x &= g(u, v)u'_x + h(u, v)v'_x, \quad \frac{\partial}{\partial y} \\ z''_{xy} &= (g(u, v)u'_x(x, y) + h(u, v)v'_x(x, y))'_y = \\ &= (g(u, v))'_y u'_x(x, y) + (u'_x(x, y))'_y g(u, v) + (h(u, v))'_y v'_x(x, y) + h(u, v) (v'_x(x, y))'_y. \end{aligned}$$

Распишем производные по  $y$  от сложенных функций  $g(u, v)$  и  $h(u, v)$ :

$$\begin{aligned} (g(u, v))'_y &= g'_u(u, v)u'_y(x, y) + g'_v(u, v)v'_y(x, y), \\ (h(u, v))'_y &= h'_u(u, v)u'_y(x, y) + h'_v(u, v)v'_y(x, y). \end{aligned}$$

Подставляем в  $z''_{xy}$ :

$$\begin{aligned} z''_{xy} &= (g'_u(u, v)u'_y(x, y) + g'_v(u, v)v'_y(x, y)) \cdot u'_x(x, y) + g(u, v)u''_{xy}(x, y) + \\ &+ (h'_u(u, v)u'_y(x, y) + h'_v(u, v)v'_y(x, y)) \cdot v'_x(x, y) + h(u, v)v''_{xy}(x, y) = \\ &= (g'_u u'_y + g'_v v'_y)u'_x + g(u, v)u''_{xy} + (h'_u u'_y + h'_v v'_y)v'_x + h(u, v) \cdot v''_{xy} = \dots \end{aligned}$$

Подставим обозначения (2.6.2):

$$\begin{aligned}
 \dots &= ((f'_u)'_u u'_y + (f'_u)'_v v'_y) u'_x + f'_u u''_{xy} + ((f'_v)'_u u'_y + (f'_v)'_v v'_y) v'_x + f'_v u''_{xy} = \\
 &= (f''_{uu} u'_y + f''_{uv} v'_y) u'_x + f''_{uu} u''_{xy} + (f''_{uv} u'_y + f''_{vv} v'_y) v'_x + f'_v v''_{xy} = \\
 &= f''_{uu} u'_y u'_x + f''_{uv} v'_y u'_x + f''_{uu} u''_{xy} + f''_{uv} u'_y v'_x + f''_{vv} v'_y v'_x + f'_v v''_{xy} = \\
 &= f''_{uu} u'_x u'_y + f''_{uv} (u'_x v'_y + u'_y v'_x) + f''_{vv} v'_x v'_y + f'_u u''_{xy} + f'_v v''_{xy}
 \end{aligned}$$

$$z''_{xy} = f''_{uu} u'_x u'_y + f''_{uv} (u'_x v'_y + u'_y v'_x) + f''_{vv} v'_x v'_y + f'_u u''_{xy} + f'_v v''_{xy} \quad (2.6.6)$$

## 7. Дифференциалы сложной функции

### Дифференциал сложной функции

Рассмотрим сложную функцию двух промежуточных аргументов  $u$  и  $v$  и двух независимых переменных  $x$  и  $y$  и вычислим дифференциал этой функции.

$$z = f(u(x, y), v(x, y))$$

Вспомним формулу дифференциала функции  $z = z(x, y)$  независимых переменных  $x$  и  $y$ .

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad (2.7.1)$$

Вычислим частные производные  $\frac{\partial z}{\partial x}$  и  $\frac{\partial z}{\partial y}$  для сложной функции:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \times \frac{\partial v}{\partial x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \times \frac{\partial v}{\partial y}$$

и подставим в (2.7.1).

$$dz = \left( \frac{\partial f}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \times \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx + \left( \frac{\partial f}{\partial u} \times \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \times \frac{\partial v}{\partial y} \right) dy$$

Раскроем скобки и сгруппируем слагаемые при  $\frac{\partial f}{\partial u}$  и  $\frac{\partial f}{\partial v}$ :

$$\begin{aligned}
 dz &= \left( \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + \left( \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) = \\
 &\quad \frac{\partial f}{\partial u} \underbrace{\left( \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right)}_{du} + \frac{\partial f}{\partial v} \underbrace{\left( \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right)}_{dv}
 \end{aligned} \quad (2.7.2)$$

Так как  $u = u(x, y)$  и  $v = v(x, y)$  - функции переменных  $x$  и  $y$ , тогда из дифференциалы равны:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \quad \text{и} \quad dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

Из выражения (2.7.2) получаем окончательный вид дифференциал  $dz$ :

$$dz = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv \quad (2.7.3)$$

### Свойство инвариантности дифференциала

Формула первого дифференциала имеют один и тот же вид, как для функции двух независимых переменных  $z = z(x, y) = f(x, y)$ , так и для сложной функции двух промежуточных аргументов  $z = f(u, v)$ . Это свойство первого дифференциала называется **свойством инвариантности или сохранения формы дифференциала**.

Отличие состоит только в том, что в выражении (2.7.1)  $dx$  и  $dy$  - это дифференциалы независимых переменных, т.е.  $dx = \Delta x$  и  $dy = \Delta y - \text{const}$ . В формуле (2.7.3)  $du$  и  $dv$  - это дифференциалы независимых переменных, т.е.  $dx = \Delta x$  - дифференциалы функций  $u = u(x, y)$  и  $v = v(x, y)$ :

$$du = u'_x dx + u'_y dy \quad \text{и} \quad dv = v'_x dx + v'_y dy$$

### Дифференциал второго порядка

Выведем формулу дифференциала второго порядка для сложной функции  $z = f(u, v)$ . По определению:

$$d^2 z = d(dz) = d\left(\frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv\right)$$

Вычислим тот дифференциал, применяя правило суммы и произведения дифференциалов:

$$\begin{aligned} d^2 z &= d\left(\frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv\right) = d\left(\frac{\partial f}{\partial u} du\right) + d\left(\frac{\partial f}{\partial v} dv\right) = \\ &= d\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right) du + \frac{\partial f}{\partial u} d(du) + d\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right) dv + \frac{\partial f}{\partial v} d(dv) \quad (2.7.4) \end{aligned}$$

По определению  $d(du) = d^2 u$  и  $d(dv) = d^2 v$  - это дифференциалы 2-ого порядка от функций  $u = u(x, y)$  и  $v = v(x, y)$ .

Дифференциалы  $d\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)$  и  $d\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)$  вычислим, применяя формулу (2.7.3).

$$\begin{aligned} d^2 z &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} du + \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} dv\right) du + \frac{\partial f}{\partial u} d^2 u + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} du + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} dv\right) dv + \frac{\partial f}{\partial v} d^2 v = \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} du^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} dv du + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} du dv + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} dv^2 + \frac{\partial f}{\partial u} d^2 u + \frac{\partial f}{\partial v} d^2 v = \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} du^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} du dv + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} dv^2 + \frac{\partial f}{\partial u} d^2 u + \frac{\partial f}{\partial v} d^2 v \end{aligned}$$

Дифференциал 2-ого порядка для сложной функции имеет вид:

$$d^2z = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} du^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} du dv + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} dv^2 + \frac{\partial f}{\partial u} d^2u + \frac{\partial f}{\partial v} d^2v \quad (2.7.5)$$

### Сравнение дифференциалов

Формула  $d^2z$  для функции  $z = f(x, y)$ :

$$d^2z = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 \quad (2.7.6)$$

Сравнение формул (2.7.5) и (2.7.6) показывает, что форма дифференциала второго порядка сложной функции отличается от случая независимых переменных. В этом случае говорят о нарушении инвариантности формы высших дифференциалов сложной функции и в этом случае нельзя вывести общую формулу вычисления дифференциалов высших порядков.

### Формулы

$z = f(x, y)$   $x, y$  – независимые переменные;

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$d^2z = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2$$

$z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$  – зависимые аргументы:

$$dz = \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv$$

$$d^2z = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} du^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} du dv + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} dv^2 + \frac{\partial f}{\partial u} d^2u + \frac{\partial f}{\partial v} d^2v$$

**Частный случай:**

$z = f(u)$ ,  $u = u(x, y)$  – промежуточный аргумент:

$$dz = \frac{df}{du} du = f'_u du$$

$$d^2z = \frac{d^2f}{du^2} du^2 + \frac{df}{du} d^2u = f''_{uu} du^2 + f'_u d^2u$$

## 8. Дифференцирование неявно заданной функции

Рассмотрим неявно заданную функцию  $z = z(x, y)$  двух независимых переменных.

**Определение:** Уравнение (2.9.1) определяет функцию  $z = z(x, y)$  как неявно заданную функцию двух переменных, если при подстановке этой функции в уравнение (2.9.1) оно становится тождеством:

$$F(x, y, z) = 0 \quad (2.8.1)$$

$$F(x, y, z(x, y)) \equiv 0 \quad (2.8.2)$$

Неявно заданную функцию из уравнения (2.9.1) можно найти при выполнении условий следующей теоремы.

**Теорема о существовании и дифференцируемости неявно заданной функции (без доказательства)**

Пусть функция  $F(x, y, z)$  и все ее частные производные  $\frac{\partial F}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial F}{\partial y}$  и  $\frac{\partial F}{\partial z}$  определены и непрерывны в некоторой окрестности точки  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ , причем  $F(M_0) = F(x_0, y_0, z_0) = 0$ , а частная производная  $\frac{\partial F(M_0)}{\partial z} \neq 0$ .

Тогда  $\exists$  окрестность точки  $M_0$  такая, что уравнение (2.9.1) определяет неявно заданную функцию  $z = z(x, y)$ , непрерывную и дифференцируемую в точке  $(x_0, y_0)$ , причем  $z_0 = z(x_0, y_0)$ .

Для нахождения частных производных подставляем в уравнение (2.9.1) функцию  $z = z(x, y)$  и получаем тождество (2.9.2), которое дифференцируем по независимым переменным  $x$  и  $y$ .

$$\begin{aligned} F(x, y, z(x, y)) &\equiv 0 \quad \left| \frac{\partial}{\partial x} \right. \\ \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} &= 0, \text{ откуда находим } \frac{\partial z}{\partial x} \\ -\frac{\partial F}{\partial z} &= \frac{\partial F}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}} \end{aligned} \quad (2.8.3)$$

Аналогично, дифференцируя тождество (2.9.2) по  $y$ , найдем  $\frac{\partial z}{\partial y}$ :

$$\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}} \quad (2.8.4)$$

Для нахождения частных производных неявно заданной функции формулы (2.9.3) и (2.9.4) применять не будем а для каждого примера будем проводить данную процедуру.



**Пример**

Найти  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$ , если  $z^3 - xz + y = 0$ .

$$\begin{aligned}
 F(x, y, z) &= z^3 - xz + y \\
 z^3(x, y) - xz(x, y) + y &= 0 \quad \left| \frac{\partial}{\partial x} \right| \quad \left| \frac{\partial}{\partial y} \right| \\
 3z^2(x, y)z'_x - z(x, y) - xz'_x &= 0 \quad (3z^2 - x)z'_x = 0 \\
 z'_x &= \frac{z}{3z^2 - x} \quad (3z^2 - x \neq 0, \text{ т.к. по условию теоремы } \frac{\partial F}{\partial z} = 3z^2 - x \neq 0) \\
 \begin{cases} 3z^2(x, y)z'_y - xz'_y + 1 = 0 \\ (3z^2 - x)z'_y = -1 \end{cases} &\Rightarrow z'_y = -\frac{1}{3z^2 - x}
 \end{aligned}$$

Для нахождения частной производной 2-ого порядка дифференцируем найденные производные:

$$\begin{aligned}
 z'_x &= \frac{z(x, y)}{3z^2(x, y) - x} \quad \left| \frac{\partial}{\partial x} \right| \\
 z''_{xx} &= \frac{z'_x(3z^2 - x) - z(6z \cdot z'_x - 1)}{(3z^2 - x)^2} = \frac{z - \frac{6z^3}{3z^2 - x} + z}{(3z^2 - x)^2} \quad (\text{подстановка } z'_x) \\
 &= \frac{2z - \frac{6z^3}{3z^2 - x}}{(3z^2 - x)^2} = \frac{2z(3z^2 - x) - 6z^3}{(3z^2 - x)^3} \\
 &= \frac{6z^3 - 2xz - 6z^3}{(3z^2 - x)^3} = -\frac{2xz}{(3z^2 - x)^3} \\
 z'_y &= -\frac{1}{3z^2(x, y) - x} \quad \left| \frac{\partial}{\partial y} \right| \quad \left| \frac{\partial}{\partial x} \right| \\
 z''_{yy} &= \frac{6z \cdot z'_y}{(3z^2 - x)^2} = \frac{6z \cdot \left(-\frac{1}{3z^2 - x}\right)}{(3z^2 - x)^2} = -\frac{6z}{(3z^2 - x)^3} \\
 z''_{yx} &= \frac{6z \cdot z'_x - 1}{(3z^2 - x)^2} = \frac{\frac{6z^2}{3z^2 - x} - 1}{(3z^2 - x)^2} = \frac{6z^2 - (3z^2 - x)}{(3z^2 - x)^3} \\
 &= \frac{3z^2 + x}{(3z^2 - x)^3}
 \end{aligned}$$

**9. Дифференцирование неявно заданной функции**

Рассмотрим неявно заданную функцию  $z = z(x, y)$  двух независимых переменных.

**Определение:** Уравнение (2.9.1) определяет функцию  $z = z(x, y)$  как неявно заданную функцию двух переменных, если при подстановке этой функции в уравнение

(2.9.1) оно становится тождеством:

$$F(x, y, z) = 0 \quad (2.9.1)$$

$$F(x, y, z(x, y)) \equiv 0 \quad (2.9.2)$$

Неявно заданную функцию из уравнения (2.9.1) можно найти при выполнении условий следующей теоремы.

**Теорема о существовании и дифференцируемости неявно заданной функции (без доказательства)**

Пусть функция  $F(x, y, z)$  и все ее частные производные  $\frac{\partial F}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial F}{\partial y}$  и  $\frac{\partial F}{\partial z}$  определены и непрерывны в некоторой окрестности точки  $M_0(x_0, y_0, z_0)$ , причем  $F(M_0) = F(x_0, y_0, z_0) = 0$ , а частная производная  $\frac{\partial F(M_0)}{\partial z} \neq 0$ .

Тогда  $\exists$  окрестность точки  $M_0$  такая, что уравнение (2.9.1) определяет неявно заданную функцию  $z = z(x, y)$ , непрерывную и дифференцируемую в точке  $(x_0, y_0)$ , причем  $z_0 = z(x_0, y_0)$ .

Для нахождения частных производных подставляем в уравнение (2.9.1) функцию  $z = z(x, y)$  и получаем тождество (2.9.2), которое дифференцируем по независимым переменным  $x$  и  $y$ .

$$\begin{aligned} F(x, y, z(x, y)) &\equiv 0 \quad \left| \frac{\partial}{\partial x} \right. \\ \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} &= 0, \text{ откуда находим } \frac{\partial z}{\partial x} \\ -\frac{\partial F}{\partial x} &= \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}} \end{aligned} \quad (2.9.3)$$

Аналогично, дифференцируя тождество (2.9.2) по  $y$ , найдем  $\frac{\partial z}{\partial y}$ :

$$\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}} \quad (2.9.4)$$

Для нахождения частных производных неявно заданной функции формулы (2.9.3) и (2.9.4) применять не будем а для каждого примера будем проводить данную процедуру.

**Пример**

Найти  $\frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y}$ , если  $z^3 - xz + y = 0$ .

$$\begin{aligned}
 F(x, y, z) &= z^3 - xz + y \\
 z^3(x, y) - xz(x, y) + y &= 0 \quad \left| \frac{\partial}{\partial x} \right| \left| \frac{\partial}{\partial y} \right| \\
 3z^2(x, y)z'_x - z(x, y) - xz'_x &= 0 \quad (3z^2 - x)z'_x = 0 \\
 z'_x &= \frac{z}{3z^2 - x} \quad (3z^2 - x \neq 0, \text{ т.к. по условию теоремы } \frac{\partial F}{\partial z} = 3z^2 - x \neq 0) \\
 \begin{cases} 3z^2(x, y)z'_y - xz'_y + 1 = 0 \\ (3z^2 - x)z'_y = -1 \end{cases} &\Rightarrow z'_y = -\frac{1}{3z^2 - x}
 \end{aligned}$$

Для нахождения частной производной 2-ого порядка дифференцируем найденные производные:

$$\begin{aligned}
 \boxed{z'_x} &= \frac{z(x, y)}{3z^2(x, y) - x} \quad \left| \frac{\partial}{\partial x} \right| \\
 \boxed{z''_{xx}} &= \frac{z'_x(3z^2 - x) - z(6z \cdot z'_x - 1)}{(3z^2 - x)^2} = [\text{подставляем } z'_x] = \\
 &= \frac{\frac{z}{3z^2 - x} \cdot (3z^2 - x) - 6z^2 \cdot \frac{z}{3z^2 - x} + z}{(3z^2 - x)^2} = \\
 &= \frac{2z - \frac{6z^3}{3z^2 - x}}{(3z^2 - x)^2} = \frac{2z \left( \frac{3z^2 - x - 3z^2}{3z^2 - x} \right)}{(3z^2 - x)^2} = -\frac{2xz}{(3z^2 - x)^3} \\
 \boxed{z'_y} &= -\frac{1}{3z^2(x, y) - x} \quad \left| \frac{\partial}{\partial y} \right| \left| \frac{\partial}{\partial x} \right| \\
 \boxed{z''_{yy}} &= \frac{1}{(3z^2 - x)^2} \cdot (3z^2 - x)'_y = \frac{6z \cdot x'_y}{(3z^2 - x)^2} = \frac{6z \cdot \left( -\frac{1}{3z^2 - x} \right)}{(3z^2 - x)^2} = -\frac{6z}{(3z^2 - x)^3} \\
 \boxed{z''_{yx}} &= \frac{1}{(3z^2 - x)^2} \cdot (3z^2 - x)'_x = \frac{6z \cdot z'_x - 1}{(3z^2 - x)^2} = \\
 &= \frac{\frac{6z^2 - (3z^2 - x)}{3z^2 - x}}{(3z^2 - x)^2} = \frac{6z^2 - 3z^2 + x}{(3z^2 - x)^3} = \frac{3z^2 + x}{(3z^2 - x)^3}
 \end{aligned}$$