

Министерство науки и высшего образования  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

Факультет «Фундаментальные науки»  
Кафедра «Высшая математика»

## ОТЧЕТ

по технологической практике за 1 семестр 2020-2021 учебного года

Руководитель практики,  
ст. преп. кафедры ФН1

\_\_\_\_\_  
*подпись, дата*

Кравченко О. В.

\_\_\_\_\_  
*фамилия, инициалы*

Студент группы ФН1-51Б

\_\_\_\_\_  
*подпись, дата*

Ириневи́ч С. Г.

\_\_\_\_\_  
*фамилия, инициалы*

Москва, 2020 г.

## Цели и задачи практики

**Цель** технологической практики: развитие навыков работы с программным обеспечением, необходимых для успешного освоения материала бакалавриата и применяющихся в будущей профессиональной деятельности, развитие навыков решения задач прикладной математики численными методами.

**Задачи** технологической практики:

- Знакомство с программными средствами, необходимыми в будущей профессиональной деятельности.
- Развитие навыков численного решения прикладных математических задач.
- Знакомство с возможностями системы контроля версий GitHub.
- Развитие умения поиска необходимой информации в специальной литературе и других источниках.
- Развитие навыков составления отчетов и презентации результатов.

В период с сентября 2020 года по январь 2021 года мною была проделана работа по изучению методов вычислительной математики, совершенствованию навыков программирования и созданию программ.

## Постановка задачи

Решить сингулярную двухточечную краевую задачу методом конечных разностей

$$\varepsilon y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) + f(x) = 0, \quad x \in [0, 1]$$

со смешанными граничными условиями

$$-\alpha_1 y'(0) + \alpha_2 y(0) = \gamma_1,$$

$$\beta_1 y'(1) + \beta_2 y(1) = \gamma_2,$$

при различных значениях параметра

$$\varepsilon = 1, 0.1, 0.01, 0.001.$$

11 вариант:

$$\alpha_1 = 1,$$

$$\alpha_2 = 0,$$

$$\beta_1 = 1,$$

$$\beta_2 = 0,$$

$$\gamma_1 = 3,$$

$$\gamma_2 = 6,$$

$$p(x) = \sin^2(x) + \cos(x),$$

$$q(x) = x^2 + x,$$

$$f(x) = x^3 - x^2 + x.$$

## Описание метода

Математическое моделирование задач механики, физики и других отраслей науки и техники сводится к решению дифференциальных уравнений. Необходимость решать двухточечные краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений численными методами очень часто возникает в прикладных задачах во многих отраслях науки.

*Метод конечных разностей* относится к сеточным методам. Основное содержание метода заключается в следующем. Область непрерывного изменения аргумента (например, отрезок) заменяется дискретным множеством точек, которые называются узлами. Эти узлы составляют *разностную сетку*. Функции на непрерывном множестве точек заменяются их проекциями на эту сетку. Это позволяет перейти от пространства непрерывных функций к пространству дискретных функций.

Рассмотрим двухточечную краевую задачу для линейного дифференциального уравнения второго порядка:

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = f(x), \quad x \in [a; b]$$

$$\alpha_1 y'(a) + \beta_1 y(a) = \gamma_1,$$

$$\alpha_2 y'(b) + \beta_2 y(b) = \gamma_2. \quad (*)$$

Определение производной непрерывной функции  $y(x)$  заключается в следующем:

$$\frac{dy(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x + \Delta x) - y(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x) - y(x - \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x + \Delta x) - y(x - \Delta x)}{2\Delta x}$$

В конечно-разностных методах производные и другие члены, входящие в дифференциальное уравнение, аппроксимируются на разностной сетке.

Введём равномерную сетку

$$\Omega_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}, \quad x_i = x_0 + ih, \quad i = 0, \dots, n, \quad h = \frac{b - a}{n}.$$

Размер шага сетки  $h = \Delta x = x_{i+1} - x_i$  может быть очень мал, но всё равно остаётся конечным, в отличие от непрерывного случая, когда интервал  $\Delta x$  стремится к нулю.

Пусть точное решение  $y(x)$  краевой задачи аппроксимируется на разностную сетку как  $\hat{y}_i = y(x_i)$ .

Тогда первая и вторая производная аппроксимируются на разностную сетку следующим образом:

$$y'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y(x + \Delta x) - y(x - \Delta x)}{2\Delta x} \approx \frac{\hat{y}_{i+1} - \hat{y}_{i-1}}{2h} = \hat{y}'_i$$

$$y''(x) \approx \frac{\frac{\hat{y}_{i+1} - \hat{y}_i}{h} - \frac{\hat{y}_i - \hat{y}_{i-1}}{h}}{h} = \frac{\hat{y}_{i+1} - 2\hat{y}_i + \hat{y}_{i-1}}{h^2} = \hat{y}''_i$$

Данные формулы для вычисления производных имеют *второй порядок точности* относительно размера шага  $h$ .

Функции  $p(x)$ ,  $q(x)$  и  $f(x)$  заменяются их проекциями на разностную сетку  $p_i = p(x_i)$ ,  $q_i = q(x_i)$ ,  $f_i = f(x_i)$ .

Для краевых условий используются аппроксимационные формулы вида

$$\hat{y}'_0 = \frac{\hat{y}_1 - \hat{y}_0}{h},$$

$$\hat{y}'_n = \frac{\hat{y}_n - \hat{y}_{n-1}}{h}.$$

Эти формулы имеют *первый порядок точности* относительно длины шага  $h$ , поэтому метод конечных разностей в целом в этом случае также будет иметь *первый порядок точности*. Из этих формул можно легко получить выражения для  $\hat{y}_0$  и  $\hat{y}_n$ .

После подстановок от краевой задачи (\*) переходим к *разностной схеме*, представляющей собой СЛАУ с трёхдиагональной матрицей:

$$\frac{\hat{y}_{i+1} - 2\hat{y}_i + \hat{y}_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{\hat{y}_{i+1} - \hat{y}_{i-1}}{2h} + q_i \hat{y}_i = f_i, i = 1, \dots, n-1$$

$$c_i^1 \hat{y}_{i-1} + c_i^2 \hat{y}_i + c_i^3 \hat{y}_{i+1} = f_i, i = 1, \dots, n-1$$

$$c_i^1 = \frac{1}{h^2} - \frac{p_i}{2h},$$

$$c_i^2 = -\frac{2}{h^2} + q_i,$$

$$c_i^3 = \frac{1}{h^2} + \frac{p_i}{2h}.$$

Эту СЛАУ можно решить методом прогонки.

## Реализация на языке Python

Краевые условия для данной задачи:

$$\begin{cases} -y'(0) = 3, \\ y'(1) = 6. \end{cases}$$

$$\begin{cases} y'(0) = -3, \\ y'(1) = 6. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{y_1 - y_0}{h} = -3, \\ \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = 6. \end{cases}$$

```
from math import *
from numpy import linspace
import matplotlib.pyplot as plt
def p_x(x, e):
    return ((sin(x))**2+cos(x))/e

def q_x(x, e):
    return (x**2+x)/e

def f_x(x, e):
    return (-x**3+x**2-x)/e

def Solve_3diag(a, b, c, d):
    n = len(b)
    a.insert(0, 0)
    P = [0]*(n-1)
    Q = [0]*n
    P[0] = -c[0]/b[0]
    Q[0] = d[0]/b[0]
    for i in range(1, n-1):
        P[i] = c[i]/(-b[i] - a[i]*P[i-1])
        Q[i] = (a[i]*Q[i-1] - d[i])/(-b[i] - a[i]*P[i-1])
    x = [0]*n
    x[n-1] = (a[n-1]*Q[n-2] - d[n-1])/(-b[n-1] - a[n-1]*P[n-2])
    for i in range(n-2, -1, -1):
        x[i] = P[i]*x[i+1] + Q[i]
    return x

def Fin_Diff_Method(x, h, e, a, b):
    n = round((b - a)/h)
    c1, c2, c3, c4 = [], [], [], []
    c2.append(-1/h)
    c3.append(1/h)
    c4.append(-3)
```

```

for i in range(1, n):
    p = p_x(x[i], e)
    q = q_x(x[i], e)
    f = f_x(x[i], e)
    c1.append(1/(h**2)-p/(2*h))
    c2.append(-2/(h**2)+q)
    c3.append(1/(h**2)+p/(2*h))
    c4.append(f)
c1.append(-1/h)
c2.append(1/h)
c4.append(6)
y = Solve_3diag(c1, c2, c3, c4)
return y

def Delta(y1, y2):
    n = len(y1)
    dif = []
    for i in range(n):
        dif.append(abs(y1[i]-y2[2*i]))
    return max(dif)

def Error1(h, e, a, b): #Погрешность
    n = round((b - a)/h) #Целый шаг
    x = linspace(a, b, n+1)
    y11 = Fin_Diff_Method(x, h, e, a, b)
    h /= 2 #Половинный шаг
    n = round((b - a)/h)
    x = linspace(a, b, n+1)
    y12 = Fin_Diff_Method(x, h, e, a, b)
    h /= 2 #Четверть шага
    n = round((b - a)/h)
    x = linspace(a, b, n+1)
    y13 = Fin_Diff_Method(x, h, e, a, b)
    h /= 2 #Восьмая шага
    n = round((b - a)/h)
    x = linspace(a, b, n+1)
    y14 = Fin_Diff_Method(x, h, e, a, b)
    delta1 = Delta(y11, y12)
    delta2 = Delta(y12, y13)
    delta3 = Delta(y13, y14)
    print('e = ', e)
    print(delta1, delta2, delta3, sep='\n')
    print()

def Demonstrate(h, a=0, b=1):
    n = round((b - a)/h)
    x = linspace(a, b, n+1)
    y1 = Fin_Diff_Method(x, h, 1, a, b)
    y2 = Fin_Diff_Method(x, h, 0.1, a, b)
    y3 = Fin_Diff_Method(x, h, 0.01, a, b)
    y4 = Fin_Diff_Method(x, h, 0.001, a, b)
    Error1(h, 1, a, b)
    Error1(h, 0.1, a, b)

```



```

Error1(h, 0.01, a, b)
Error1(h, 0.001, a, b)
plt.subplot(2, 3, 1)
plt.plot(x, y1, color='red')
plt.plot(x, y2, color='blue')
plt.plot(x, y3, color='green')
plt.plot(x, y4, color='orange')
plt.legend(['eps = 1', 'eps = 0.1', 'eps = 0.01', 'eps =
0.001'])
plt.subplot(2, 3, 2)
plt.plot(x, y1)
plt.title('eps = 1')
plt.subplot(2, 3, 3)
plt.plot(x, y2)
plt.title('eps = 0.1')
plt.subplot(2, 3, 4)
plt.plot(x, y3)
plt.title('eps = 0.01')
plt.subplot(2, 3, 5)
plt.plot(x, y4)
plt.title('eps = 0.001')
plt.show()

```

## Результаты

Графики решений представлены на рисунках 1-5 (длина шага  $h=1e-4$ )




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5

Оценка погрешности решения по *правилу Рунге* (правилу двойного пересчёта):

$\varepsilon$	1	0.1	0.01	0.001
$h = 1e-4$	0.00067028	6.6864e-05	0.00011347	0.00011721
$h/2$	0.00033511	3.3434e-05	5.6736e-05	5.8607e-05
$h/4$	0.00016751	1.6717e-05	2.8370e-05	2.9305e-05

Мы видим, что погрешность линейно зависит от длины шага (при уменьшении шага в 2 раза погрешность также уменьшается приблизительно в 2 раза).

## **Вывод**

Необходимость решать дифференциальные уравнения численно очень часто возникает в прикладных задачах во многих отраслях науки и техники.

В данной работе был реализован метод конечных разностей решения двухточечной краевой задачи для линейного дифференциального уравнения 2-го порядка. В этом методе отрезок (непрерывная область значений аргумента) заменяется дискретным множеством точек – сеткой, а функции и их производные аппроксимируются своими проекциями на эту сетку. Данная реализация имеет первый порядок точности.

## Список литературы

1. ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
2. Python 3.9.1 documentation. URL: <https://docs.python.org/3/> (дата обращения: 04.02.2021).
3. Астахова И. В., Никишкин В. А. Практикум по курсу «Дифференциальные уравнения». Учебное пособие. Изд. 3-е, исправл. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2010. – 94 с., ил.
4. Гусев Е. В., Федотов А. А. Разностные методы решения гиперболических уравнений: Метод. указания к лабораторным работам по курсу «Численные методы» - М.: Изд-во МГТУ, 1991, 44 с., ил.
5. Киреев В. И., Пантелеев А. В. Численные методы в примерах и задачах: Учеб. пособие – 3-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 480 с.: ил.
6. Крайнов А. Ю., Моисеева К. М. Численные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений: учеб. пособие. – Томск: СТУ, 2016. – 44 с.
7. Мареев В. В., Станкова Е. Н. Основы методов конечных разностей. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2012. 64 с.
8. Морозова В.Д. Теория функций комплексного переменного: Учеб. для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. — 3-е изд., исправл. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 520 с.
9. Филиппов А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000, 176 стр.