Структура и Данные

QCA как подход к разделению эмерджентной структуры и контингентных параметров в физике частиц

Отчёт, версия 14.4 (финал) · 11.11.2026
Проект «Структура и Данные»
Код и ноутбуки: `github.com/<username>/qca-structure-data`

Аннотация. Центральный тезис: физика частиц распадается на два класса — *структуру*, выводимую из локальных унитарных правил квантового клеточного автомата (QCA), и *данные*, которые должны быть заданы извне. Мы проверяем этот тезис численно на 19 ноутбуках. *Структура* — уравнения Дирака, калибровочные симметрии, механизм Хиггса, три поколения фермионов — воспроизводится из QCA с точностью 10^{-15}–10^{-17} (8 независимых выводов, класс A). Проверки согласованности с известными теоремами квантовой механики (CPT, $c = 1$, запутанность, Паули; класс B) и отрицательные контроли (квадратная решётка, константы, CP-сохранение в 1D и 2 поколениях; класс C) фиксируют границу классификации. В то же время *параметры* (массы, юкавские связи, фундаментальные константы, CP-фаза) не выводятся и являются входными данными (4 классификации данных). Дополнительно проверена гипотеза о структуре базы 15 для лептонных масс: статистика — попарные логарифмические отношения m_j/m_i (инвариантна к масштабу по построению); база 15 даёт отклонение 0.028148 для лептонов. Пермутационный тест на 84 разбиениях 9 масс: $p_{abs} = 10/84 = 0.1190$; статус — **не установлено** (дефицит до наводящего порога $5/84 = 0.0595$). Эффект поиска в другом месте: тройка $\{\mu, b, t\}$ на базе 40 даёт отклонение 0.005912, в 4.76 раза лучше лептонного сигнала. Для кварков ни одна база не даёт отклонения ниже 5% (MC-среднее на базе 40 = 0.178335; детерминированный минимум $\text{dev}_{\text{best39}} = 0.174249$). Новых предсказаний не делается; измеренная величина $\Sigma m_\nu = 0.0608$ эВ (nb13) совместима с верхним пределом DESI DR2 — это проверка согласованности, а не предсказание. Подход не зависит от гипотезы базы 15.

1. Введение

1.1. Эпистемологический парадокс

Проект начался с вопроса об искусственном интеллекте. Между нами и ИИ существует двусторонняя эпистемологическая стена. Инверсия этого наблюдения: *а что если мы сами находимся в положении ИИ по отношению к некоему субстрату?* Мы видим «выход» (наблюдаемую физику), но не видим «железо» (субстрат).

1.2. Аналогия: «Арифметика и Чернила»

Представьте лист бумаги с числами. Вы — математик, знающий только арифметику и геометрию. Вы можете складывать числа и измерять расстояния между ними. Но вы **не можете** вывести из арифметики, почему цифра «7» нарисована ломаной, а «2» — кривой, или почему «5» написана красным, а «7» — синим. Эти свойства **реальны**, но они **не являются** частью математических правил. Это — **характеристики носителя** (чернил, почерка).

В этом проекте мы показываем, что физика устроена аналогично: **правила** (симметрии, взаимодействия, скорость света, CPT, запутанность, три поколения) выводимы, а **параметры** (массы, константы связи, CP-фаза) — это «чернила», которые невозможно вывести из правил.

1.3. Что подход *не* утверждает

Мы подчёркиваем три пункта, чтобы предотвратить недопонимание.

Во-первых, подход **не** утверждает, что Вселенная является *симуляцией*. Нет «симулятора снаружи», который исполняет наш мир как программу. QCA — это **онтология**, а не гипотеза симуляции: утверждение состоит в том, что физика *есть* локальное унитарное правило, а не в том, что кто-то её *вычисляет*. Нет «до правила» и нет «снаружи правила» — есть только правило.

Во-вторых, подход **не** претендует на роль «теории всего». Он классифицирует то, что выводимо из локальной унитарности, и то, что должно быть задано как вход; он не выводит Стандартную модель, гравитацию или космологию. Восемь секторов класса A, четыре проверки класса B, пять отрицательных контролей класса C и четыре классификации данных — это **полный объём** работы, не больше.

В-третьих, подход **не** утверждает, что субстрат напрямую познаваем. Мы видим «выход» (физику) и классифицируем его на структуру и данные. Мы не видим «железо». Существует ли железо, что оно собой представляет и как наш выход с ним соотносится — эти вопросы подход **оставляет в скобках**, а не решает. Классификация структура/данные работает *внутри* выхода, независимо от того, что за ним.

---

2. Методология

QCA (квантовый клеточный автомат, quantum cellular automaton) — минимальная модель локального унитарного вычисления: дискретная решётка, такты, локальное правило $\mathcal{U}$. Это наименьший набор предположений, при котором можно задать вопрос «что следует из локальности и унитарности». QCA не претендует на онтологическую фундаментальность; это минимальный тестовый стенд. Все результаты численные, проверяются в `float64`.

3–7. Секторы структуры (класс A)

8 независимых выводов структуры из локальных QCA-правил:

- **nb01:** 1D Дирак (10^{-15});
- **nb02:** U(1) калибровочное поле / фотон (10^{-17});

- **nb03:** SU(2) / W, Z (10^{-16});
- **nb04:** независимость калибровочной инвариантности и унитарности от массы ($m \in [0.01, 1.5]$, разброс остатков и дисперсии < порядка);
- **nb05:** Хиггс через BCS-конденсат (0.1%);
- **nb06:** 2D Дирак на сотовой решётке ($\alpha = 1.01$, изотропия 1.0000);
- **nb08:** 3D Дирак на 4D доменной стенке ($E_0 = 0$, вес стенки 51%);
- **nb18 Parts B–C:** три поколения — N стенок $\to N$ мод в 1D SSH (точное соответствие, $|\langle\gamma_5\rangle| = 1.0000$); 2D реализовано через фермионы перекрытия (Ginsparg–Wilson residual $\sim 3 \times 10^{-15}$).

3.1. Проверки согласованности (класс B)

Не «уровни подтверждения» в том же смысле — QCA воспроизводит известные теоремы квантовой механики, не добавляя независимого содержания:

- **nb12:** CPT, $m = \bar{m}$;
- **nb15:** $c = 1$ из локальности (групповая скорость $v_F = 1.000000$ в единицах шаг/такт);
- **nb16:** CHSH = $2\sqrt{2}$ сохраняется;
- **nb17:** знак перестановки -1 для фермионов, $+1$ для бозонов.

3.2. Отрицательные контроли (класс C)

- **nb07:** квадратная 2D-решётка даёт анизотропию > 1.15 (контраст с сотовой решёткой);
- **nb11:** нулевой результат по геометрии 4D-стенки (нет скрытых множителей 1/32 в скоростях);
- **nb14:** нет скрытой сетки у фундаментальных констант (ошибка $\sim 10^{-3}$);
- **nb18 Part A:** наивная 2D-решётка — 4 дираковские точки (фермионное удвоение);
- **nb19 T0–T2:** CP сохраняется в 1D и 2 поколениях.

Как отрицательные контроли проверялись. Все контроли используют ту же метрику $\mathbf{dev}$ и тот же порог $\mathbf{5\%}$, что и лептоны. 84-триплетный пермутационный тест применяется только к лептонному триплету — контроли оцениваются отдельно, по той же метрике, но не входят в 84 разбиения. Что именно они исключают: (а) **кварки** — что предпочтение базы 15 не является универсальным свойством любого триплета масс (0 баз с dev < 5%); (б) **nb14 (константы)** — что предпочтение не является следствием выбора метрики (нет скрытой сетки при 10^{-3}); (в) **nb07 (квадратная решётка)** — что 2D-эффект не является артефактом сотовой структуры (анизотропия > 1.15); (г) **nb18 Part A (наивная решётка)** — что киральные аномалии не создают иллюзию топологии (4 дираковские точки явно).

3.3. Классификации данных

- **nb09:** SVD масс кварков (ранг-1, 99.7%, фактор 2 — без выводимого основания);
- **nb10:** скан баз (см. §11);
- **nb13:** нейтрино — измеренная сумма масс $\Sigma m_\nu = 0.0608$ эВ совместима с верхним пределом DESI DR2. Это **проверка согласованности, а не предсказание**: модель не предсказывает значение заранее и не подгоняет параметр. Полной сетки базы 15 для нейтрино нет.

- **nb19 T4–T5:** CP-нарушение — фаза δ не выводится из правил и является входом (см. §10).

---

8. Синтез: 8 + 4 + 5 + 4

Класс	Счётчик	Ноутбуки	Роль
A — независимые выводы структуры	**8**	nb01–06, 08, 18 Parts B–C	Структура выводится
B — проверки согласованности с квантовой механикой	**4**	nb12, 15–17	Согласовано с теоремами квантовой механики
C — отрицательные контроли	**5**	nb07, 11, 14, 18 Part A, 19 T0–T2	Классификация нетривиальна
Данные — классификации параметров	**4**	nb09, 10, 13, 19 T4–T5	Остаётся входом

Счётчики не пересекаются; отрицательные контроли не входят в число уровней подтверждения. nb18 разделён: Part A — класс C, Parts B–C — класс A.

---

9. Три поколения: закрытый сектор (nb18)

9.1. Механизм и число

Механизм Джекива–Росси **точен в 1D**: N доменных стенок SSH дают ровно N нулевых мод с $E = 0$ и $|\langle\gamma_5\rangle| = 1.0000$. **Реализуем в 2D** через фермионы перекрытия (Ginsparg–Wilson residual $\sim 3 \times 10^{-15}$). Наивная 2D-решётка терпит фермионное удвоение (nb18 Part A) — это артефакт решётки, не физики.

Конкретное число $N = 3$ — **входной факт**: механизм допускает любое N, выбор $N = 3$ в природе — параметр.

9.2. Вердикт

> **Три поколения: механизм = структура, число $N = 3$ = вход.** Механизм выводится точно в 1D и реализуем в 2D. Это не зависит от базы 15.

---

10. CP-нарушение: закрытый сектор (nb19)

T0–T2: CP сохраняется в 1D с реальной и комплексной массой, а также в 2 поколениях (фаза устраняется киральным поворотом). T4: 3 поколения с toy-матрицей CKM — $J(\delta) \neq 0$, максимум при $\delta = \pi/2$, $J = 0$ при $\delta = 0$. T5: майорановские фазы дают ненулевой J_M, но проявляются в процессах с нарушением лептонного числа (0νββ), не в осцилляциях.

> **CP-нарушение = данные.** Подход может вместить CP-нарушение (через 3 поколения или майорановские массы), но фаза δ не выводится из правил.

---

11. База 15: поисковое наблюдение (nb10)

11.1. Статистика

В nb10 используется статистика попарных логарифмических отношений:

\(\text{dev}(b) = \text{mean}_{i

Статистика инвариантна к масштабу по построению. Диапазон баз: $b \in [2, 40]$.

11.2. Результат для лептонов

База 15 — лучшая для лептонного триплета: $\mathbf{dev} = 0.028148 \pm 1.61 \times 10^{-5}$ (Монте-Карло по ошибкам PDG, зерно 42, $N = 500$ — тест на устойчивость). Единственная база с отклонением ниже 5%.

11.3. Пермутационный тест (выбор лучшего из 39)

Рассматриваются все 84 разбиения 9 масс на группы $3 + 6$. Для каждой группы T вычисляется $\mathbf{dev}_{\text{best39}}(T) = \min_{b \in [2,40]} \mathbf{dev}(T, b)$. Тогда:

$$p_{abs} = \frac{\#\{T : \mathbf{dev}_{\text{best39}}(T) \leq \mathbf{dev}_{\text{best39}}(\text{лептоны})\}}{84}$$

Результат: $p_{abs} = 10/84 = 0.1190$. Статус — **не установлено** (дефицит до наводящего порога $5/84 = 0.0595$).

Замечание для читателя: лептонный триплет не является экстремальным ни в одном из двух счётчиков. **В счётчике p_abs** (по dev_best39) он — 10-й из 84: 9 троек имеют строго меньший dev_best39, включая $\{\mu, b, t\}$ с dev = 0.005912 (§11.4). **В счётчике асимметрии** (по $dev_6 - dev_3$) он — 16-й из 84: 15 разбиений показывают строго больший разрыв лептоны/кварки. Правило тай-и $k/84$ в обоих счётчиках не активируется. Знак «≤» в определении p_{abs} и знак «≥» в определении p_{asym} включают наблюдаемое разбиение.

Что именно было предварительно задано. Предварительно заданная гипотеза — не «база 15 особая», а «некоторое основание $b \in [2, 40]$ даёт аномально малый $\mathbf{dev}$». База 15 оказалась минимумом в этом скане. Метрика $p_{abs} = 10/84$ по построению учитывает этот поиск: каждый триплет допускается выбрать своё лучшее основание (выбор лучшего из 39), поэтому p_{abs} равен 0.1190, а не 1/84. Предварительная фиксация зафиксирована в `nb10_pvalue.md` §1–§2

(timestamp 11.11.2026 16:32) до прогона. Для v1–v13 полный реестр гипотез недоступен — это отражено в §13 (Ограничения п.10) как основание считать p_{abs} нижней границей.

11.4. Эффект поиска в другом месте

Самая «сеточная» тройка при выборе лучшего из 39 — $\{\mu, b, t\}$ на базе 40 с отклонением 0.005912, в **4.76 раза** лучше лептонного сигнала (0.028148). Это прямое следствие эффекта поиска в другом месте: скан по 39 базам даёт случайным тройкам «попробовать» все базы.

11.5. Кварки

Для кварков: MC-среднее на базе 40 = 0.178335 ± 0.0146; детерминированный минимум $\mathrm{dev}_{\mathrm{best39}} = 0.174249$. Ни одна база не даёт отклонения ниже 5%. Лучшая база 40 неустойчива (топ-5 лежат внутри $\pm\mathrm{std}$ Монте-Карло по ошибкам PDG: разброс 0.0035 < std 0.0146). Отрицательный контроль чист.

11.6. Фиксированная база 15 (вторичная строка, с оговоркой)

Если база 15 фиксирована без поправки на множественность, $p_{\mathrm{fixed}} = 1/84 = 0.0119$. **Оговорка:** база 15 найдена сканом по этим же данным, поэтому p_{fixed} аннулирован апостериорным отбором. В аннотацию и нижнюю строку выводов не идёт.

11.7. Отношение к Койде

Соотношение Койде $K = 2/3$ известно с 1981 года и не является результатом проекта. Ближайшие «красивые» дроби ($1/32$, $1/91$) — апостериорны: для любого измеренного значения всегда найдутся близкие дроби. Реальный факт точности 10^{-5} — Койде для измеренных масс ($K = 0.66666051$, отклонение 6.2×10^{-6}).

2.8% и Койде не независимы: целые экспоненты (0, 2, 3) дают $K = 0.65591603$; дробные части экспонент ($1/32$, $1/91$) дают $K = 0.66666378$ — ровно та степень свободы, которой добирается условие $K = 2/3$. Согласие «2.8% + Койде» — одно свидетельство в двух формулировках, не два независимых.

11.8. Монте-Карло по ошибкам PDG

Монте-Карло по неопределённостям PDG (зерно 42, $N = 500$) — проверка **устойчивости к погрешностям измерений**, не статистической значимости. Результат: кварки 0.178335 ± 0.0146, лептоны $0.028148 \pm 1.61 \times 10^{-5}$. Значимость определяется исключительно пермутационным тестом.

Про std на базах 16 и 4: диапазон 10^{-9}–10^{-8} подтверждён фактическим прогоном (5.24×10^{-9} и 1.05×10^{-8}). Причина структурная: на этих базах вклад возмущения массы в три попарных члена сокращается попарно в первом порядке, в отличие от базы 15, где они выстроены в одну сторону.

> **Статус базы 15: поисковое, не установлено.** Подход не зависит от этой гипотезы. Отрицательные контроли сохранены. Первичный критерий (выбор лучшего из 39) — не установлено ($p_{abs} = 10/84 = 0.1190$); вторичный (фиксированная база 15, $1/84 = 0.0119$) — только с оговоркой об апостериорном отборе.

12. Критерий фальсификации

Тезис о разделении структуры и данных будет опровергнут, если:

1. Для кварков найдётся статистически значимая база в $b \in [2, 40]$ при том же методе, что для лептонов ($p < 0.01$);
2. Добавление локальных унитарных взаимодействий (а) меняет классификацию какого-либо сектора с «структура» на «данные», или (б) требует подгонки параметра, ранее воспроизводившегося без неё;
3. CP-фаза будет выведена из QCA-правил без свободных параметров, что переведёт её из «данных» в «структуру».

Ни одно из трёх не реализовалось. База 15 для лептонов **не проходит** критерий (i) при $p < 0.01$ — её $p_{abs} = 0.1190$ далеко от порога. Это согласуется с подходом: база 15 была поисковым наблюдением, а не структурным выводом.

---

13. Ограничения

1. QCA — подход, не «теория всего».
2. Все успешные результаты воспроизводят известную физику. Новых предсказаний не делается; $\Sigma m_\nu = 0.0608$ эВ (nb13) — проверка согласованности с верхним пределом DESI DR2, а не предсказание.
3. Юкавские связи не объяснены.
4. Интерпретация «4D-оператора» — философская.
5. **База 15: $p_{abs} = 10/84 = 0.1190$, статус не установлено**; гипотеза поисковая, подход от неё не зависит. Коэффициент эффекта поиска в другом месте = 4.76.
6. Нейтрино и константы не следуют сетке базы 15.
7. Три поколения: механизм точен в 1D, 2D требует фермионов перекрытия; число $N = 3$ — вход.
8. CP-нарушение: подход может его вместить, но фаза δ — вход.
9. 2.8% и Койде не независимы (дробные экспоненты — следствие $K = 2/3$).
10. **Коэффициент эффекта поиска в другом месте 4.76 — нижняя граница.** Он учитывает только 39 баз в nb10, но не гипотезы, проверявшиеся в v1–v13 (Койде, SVD, DESI, альтернативные нормировки). Реальная поправка на множественность строго больше 4.76, следовательно $p_{abs} = 0.1190$ **— нижняя граница, а не полная поправка**. Это делает вывод о базе 15 ещё менее установленным, а не более.
11. Проверки на устойчивость (зерно генератора, N_{MC}, усреднение против максимума) в v14.4 не выполнены; план — в `nb10_pvalue.md` §6. Включение в v15.
12. **Многоцентровая космология не тестируется.** Подход нейтрален к начальным условиям: он не различает одноцентровую и многоцентровую инициализацию. Предварительные численные тесты (вне этой статьи) не показывают значимого сигнала; результат остаётся поисковым и не входит в статью.

13. **Космология отскока и предынфляционные фазы не тестируются.** Подход не предсказывает начальные условия; они классифицируются как «данные». Модели типа ekpyrotic/отскока совместимы с подходом, но не проверяются в нём.
14. **Гравитация не тестируется.** Эмерджентность $1/r^2$ из QCA-решётки — задача отдельного ноутбука (nb20, запланирован), а не v14.4. Подход не претендует на вывод ОТО, принципа эквивалентности или квантовой гравитации.
15. **Киральные левые дублеты Стандартной модели не реализованы.** Фермионы перекрытия (nb18 Part C) дают технологию для точной киральной симметрии, но конкретное вложение $SU(2)_L$ дублетов в QCA не выполнено. Это направление для v15+.

---

14. Заключение

Подход «структура и данные» подтверждён на 8 независимых уровнях структуры (nb01–06, 08, 18), 4 проверках согласованности с квантовой механикой (nb12, 15–17), 5 отрицательных контролях (nb07, 11, 14, 18A, 19 T0–T2) и 4 классификациях данных (nb09, 10, 13, 19 T4–T5).

> **Главный результат v14.4.** Разделение структуры и данных не зависит от гипотезы базы 15.
>
> - **8 независимых выводов структуры** (Дирак, U(1), SU(2), масса-независимость, Хиггс, сотовая решётка, 3D-стенка, 3 поколения) — выводится из QCA.
> - **4 проверки класса B** (CPT, $c = 1$, запутанность, Паули) — согласовано с квантовой механикой.
> - **5 отрицательных контролей класса C** — классификация нетривиальна.
> - **4 классификации данных** (кварки, скан баз, нейтрино, CP-фаза) — параметры не выводятся.
> - **База 15** — поисковое наблюдение, **не установлено** ($p_{abs} = 10/84 = 0.1190$, нижняя граница; коэффициент эффекта поиска в другом месте 4.76). Подход не зависит от неё.

Тезис «структура выводима, данные — вход» **фальсифицируем**: три критерия в §12 задают условия опровержения. Ни одно из них не реализовалось. Подход не является ни «теорией всего», ни гипотезой симуляции; он — классификация того, что следует из локальной унитарности, и того, что должно быть задано извне.

Конец документа. Версия 14.4 (численные значения — из `nb10_pvalue_results.txt` после прогона 11.11.2026; правки R16, R17, R18 и перевод терминов применены).

Код и ноутбуки: `github.com/<username>/qca-structure-data`