

In [1]:

```
%matplotlib inline
import numpy as np
from math import sqrt
from array import *
import matplotlib.pyplot as plt
import math
import matplotlib.ticker as ticker
from pylab import *
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
```


## Задания к уроку 3.2

### 1. Задание

Нарисуйте график функции:  $y(x) = k \cdot \cos(x - a) + b$  для некоторых (2-3 различных) значений параметров  $k$ ,  $a$ ,  $b$

In [2]:

```
x = np.linspace(-3*np.pi, 3*np.pi, 300)
plt.subplots(figsize=(10, 7))
plt.grid(True)
y = 1*np.cos(x - 1)
y2 = 0.5*np.cos(x - 2)
y3 = 3*np.cos(x - 5)
plt.plot(x,y, label = '1*np.cos(x + 5)')
plt.plot(x,y2, label = '2*np.cos(x - 2)')
plt.plot(x,y3, label = '3*np.cos(x - 5)')
plt.legend(loc = 4)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title("Графики функции  $y(x) = k \cdot \cos(x - a) + b$ ", size=12)
plt.show()
```



## 2. Задание

Докажите, что при ортогональном преобразовании сохраняется расстояние между точками.

**Ответ**

Расстояние между точками на плоскости в декартовой системе координат определяется по формуле:

$$l = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

После ортогонального преобразования координаты  $x$  и  $y$  рассчитываются по следующим формулам:

$$X = (x - a)\cos\alpha + (y - b)\sin\alpha$$

$$Y = -(x - a)\sin\alpha + (y - b)\cos\alpha$$

Подставим эти формулы в формулу определения расстояний между двумя координатами для определения расстояния между точками после ортогонального преобразования:

$$l = \sqrt{((x_2 - a)\cos\alpha + (y_2 - b)\sin\alpha - ((x_1 - a)\cos\alpha + (y_1 - b)\sin\alpha))^2 + (-(x_2 - a)\sin\alpha + (y_2 - b)\cos\alpha -$$

Преобразуем данное выражение:

$$l = \sqrt{(x_2\cos\alpha - a\cos\alpha + y_2\sin\alpha - b\sin\alpha - x_1\cos\alpha + a\cos\alpha - y_1\sin\alpha + b\sin\alpha)^2 + (-(x_2 - a)\sin\alpha + (y_2 -$$

$$l = \sqrt{(x_2\cos\alpha - a\cos\alpha + y_2\sin\alpha - b\sin\alpha - x_1\cos\alpha + a\cos\alpha - y_1\sin\alpha + b\sin\alpha)^2 + (-(x_2 - a)\sin\alpha + (y_2 - b)\cos\alpha -$$

$$l = \sqrt{(x_2\cos\alpha + y_2\sin\alpha - x_1\cos\alpha - y_1\sin\alpha)^2 + (-(x_2 - a)\sin\alpha + y_2\cos\alpha + x_1\sin\alpha - a\cos\alpha - b\sin\alpha)^2}$$

$$l = \sqrt{(x_2\cos\alpha - x_1\cos\alpha + y_2\sin\alpha - y_1\sin\alpha)^2 + (-(x_2 - a)\sin\alpha + x_1\sin\alpha + y_2\cos\alpha - a\cos\alpha - b\sin\alpha)^2}$$

$$l = \sqrt{(\cos\alpha(x_2 - x_1) + \sin\alpha(y_2 - y_1))^2 + (-\sin\alpha(x_2 - x_1) + \cos\alpha(y_2 - y_1))^2}$$

$$l = \sqrt{(\cos\alpha(x_2 - x_1))^2 + 2\cos\alpha(x_2 - x_1)\sin\alpha(y_2 - y_1) + (\sin\alpha(y_2 - y_1))^2 + (-\sin\alpha(x_2 - x_1))^2 - 2\sin\alpha(x_2 - x_1)\cos\alpha(y_2 - y_1) + (\cos\alpha(y_2 - y_1))^2}$$

Проведем замену:

$$a = x_2 - x_1$$

$$b = y_2 - y_1$$

Перепишем уравнение:

$$l = \sqrt{(\cos\alpha(a))^2 + 2\cos\alpha(a)\sin\alpha(b) + (\sin\alpha(b))^2 + (-\sin\alpha(a))^2 - 2\sin\alpha(a)\cos\alpha(b) + (\cos\alpha(b))^2}$$

$$l = \sqrt{\cos^2\alpha a^2 + 2\cos\alpha a\sin\alpha b + \sin^2\alpha b^2 + \sin^2\alpha a^2 - 2\sin\alpha a\cos\alpha b + \cos^2\alpha b^2}$$

$$l = \sqrt{\cos^2\alpha a^2 + \cos^2\alpha b^2 + \sin^2\alpha b^2 + \sin^2\alpha a^2 + 2\cos\alpha a\sin\alpha b - 2\sin\alpha a\cos\alpha b}$$

$$l = \sqrt{\cos^2\alpha(a^2 + b^2) + \sin^2\alpha(b^2 + a^2) + 2\cos\alpha a\sin\alpha b - 2\sin\alpha a\cos\alpha b}$$

$$l = \sqrt{(a^2 + b^2)(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) + 2\cos\alpha a\sin\alpha b - 2\sin\alpha a\cos\alpha b}$$

$$l = \sqrt{(a^2 + b^2) * 1 + 2ab(\cos\alpha\sin\alpha - \sin\alpha\cos\alpha)}$$

$$l = \sqrt{(a^2 + b^2) * 1 + 2ab * 0}$$

$$l = \sqrt{(a^2 + b^2)}$$

Проведем обратную замену а и b и получим:

$$l = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Т.е. мы получили ту же формулу, что и до ортогонального преобразования. Следовательно при ортогональном преобразовании сохраняется расстояние между точками.

### 3. Задание (в программе)

1. Напишите код, который будет переводить полярные координаты в декартовы.

In [3]:

```
coordinates = str(input("Введите полярный радиус и полярный угол точки (в градусах) в полярной системе координат через пробел: ")
print(f"Данная точка в декартовой системе координат будет иметь следующие координаты: ({int(coordinates.split()[0]), int(coordinates.split()[1])})")
```

Введите полярный радиус и полярный угол точки (в градусах) в полярной системе координат через пробел: 3 60

Данная точка в декартовой системе координат будет иметь следующие координаты: (1.50, 2.60)

**2. Напишите код, который будет рисовать график окружности в полярных координатах.**


In [4]:

```
x = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
y = np.full(100, 5)

plt.polar(x, y)
```

Out[4]:

[<matplotlib.lines.Line2D at 0x83cbf48>]



In [5]:

```
# x = []
# y1 = []
# y2 = []
# R = int(input("Введите радиус окружности, которую Вы хотите построить: "))
# for i in range(-99999, 99999):
#     x_ = i/100000*R
#     x.append(x_)
#     y1.append(sqrt(R**2-(x_**2)))
#     y2.append(-sqrt(R**2-(x_**2)))

# plt.polar(x,y1)
# plt.polar(x,y2)
# plt.show()
```


**3. Напишите код, который будет рисовать график отрезка прямой линии в полярных координатах.**

In [6]:

```
x = np.linspace(0, np.pi/6, 2)
y = (0, 3)
plt.polar(x, y)
```

Out[6]:

[<matplotlib.lines.Line2D at 0x83fafc8>]




In [7]:

```
x = np.linspace(0, np.pi/2, 2)
y = (3.5, 3)
plt.polar(x, y)
```

Out[7]:

[<matplotlib.lines.Line2D at 0x83d3748>]



## 4. Задание (в программе)

1) Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ \exp(x) + x \cdot (1 - y) = 1 \end{cases}$$

Преобразуем систему:

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ x \cdot (1 - y) = 1 - \exp(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ 1 - y = \frac{1 - \exp(x)}{x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y = 1 - \frac{1 - \exp(x)}{x} \end{cases}$$

Построим графики функций и решим систему уравнений численным методом

In [8]:

```
x = np.linspace(-10, 10, 201)
plt.subplots(figsize=(10, 10))
plt.plot(x, 1-(1-np.exp(x))/x)
plt.plot(x, x**2 - 1)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.xlim(-10,5)
plt.ylim(-2,20)
plt.xticks(np.arange(-10, 5, 0.5), rotation=90)
plt.yticks(np.arange(-2, 20, 0.5))
plt.grid(True)
plt.show()


from scipy.optimize import fsolve

def equations(p):
    x, y = p
    return (y - x**2 + 1, y - 1+(1-np.exp(x))/x)

x1, y1 = fsolve(equations, (-2, 0))
x2, y2 = fsolve(equations, (2, 5))
x3, y3 = fsolve(equations, (4, 14))
print("Корни системы уравнений (x, y)")
print (f"{x1}, {y1}")
print (f"{x2}, {y2}")
print (f"{x3}, {y3}")
```

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel\_launcher.py:3: RuntimeWarning: invalid value encountered in true\_divide

This is separate from the ipykernel package so we can avoid doing imports until



Корни системы уравнений (x, y)

-1.5818353528958515, 1.5022030836713072

2.618145573085375, 5.854686241865328

4.200105841155167, 16.640889076905783

**2) Решите систему уравнений и неравенств:**

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ \exp(x) + x \cdot (1 - y) > 1 \end{cases}$$

Преобразуем систему:

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ x \cdot (1 - y) > 1 - \exp(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ 1 - y > \frac{1 - \exp(x)}{x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y > 1 - \frac{1 - \exp(x)}{x} \end{cases}$$

Построим графики функций и решим систему уравнений численным методом



In [9]:

```
x = np.linspace(-10, 10, 201)
plt.subplots(figsize=(10, 10))
plt.plot(x, 1-(1-np.exp(x))/x)
plt.plot(x, x**2 - 1)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.xlim(-10,5)
plt.ylim(-2,20)
plt.xticks(np.arange(-10, 5, 0.5), rotation=90)
plt.yticks(np.arange(-2, 20, 0.5))
plt.grid(True)
plt.show()


from scipy.optimize import fsolve

def equations(p):
    x, y = p
    return (y - x**2 + 1, y - 1+(1-np.exp(x))/x)

x1, y1 = fsolve(equations, (-2, 0))
x2, y2 = fsolve(equations, (2, 5))
x3, y3 = fsolve(equations, (4, 14))
print("Корни системы уравнений (x, y)")
print (f"{x1}, {y1}")
print (f"{x2}, {y2}")
print (f"{x3}, {y3}")
```

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\ipykernel\_launcher.py:3: RuntimeWarning: invalid value encountered in true\_divide

This is separate from the ipykernel package so we can avoid doing imports until



Корни системы уравнений  $(x, y)$

-1.5818353528958515, 1.5022030836713072

2.618145573085375, 5.854686241865328

4.200105841155167, 16.640889076905783

Решением неравенства будут все точки, лежащие выше синей линии, не включая саму синюю линию.

Решением уравнения будут все точки с координатами, вычисляемыми по уравнению:

$$y = x^2 - 1$$

На графике они соответствуют оранжевой линии. Следовательно решением данной системы будут следующие множества  $x$  и  $y$ :

$$\begin{cases} x \in ((-\infty; -1.5818353528958515) \cup (2.618145573085375; 4.200105841155167)) \\ y \in ((1.5022030836713072; +\infty) \cup (5.854686241865328; 16.640889076905783)) \end{cases}$$

однозначно связанные между собой по вышеуказанному уравнению:

$$y = x^2 - 1$$