

Практическое задание 8

In [1]:

```
from sympy import *  
init_printing()
```

1. Вычислить неопределенный интеграл

$$\int \frac{2x + 3}{(x - 2)(x + 5)} dx$$

Сделаем замену:

$$(x - 2)(x + 5) = t \Rightarrow t = x^2 + 3x - 10 \Rightarrow dt = (2x + 3)dx \Rightarrow dx$$

Преобразуем наш интеграл:

$$\int \frac{2x + 3}{(x - 2)(x + 5)} dx = \int \frac{2x + 3}{t} \cdot \frac{dt}{2x + 3} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln |(x - 2)(x + 5)| + C$$

Проверим

In [2]:

```
x=Symbol('x')  
f=(2*x+3)/((x-2)*(x+5))  
f
```

Out[2]:

$$\frac{2x + 3}{(x - 2)(x + 5)}$$

In [3]:

```
integrate(f,x)
```

Out[3]:

$$\log(x^2 + 3x - 10)$$

Видим, что интеграл посчитан правильно

2. Вычислить неопределенный интеграл

$$\int e^{2x} \cos 3x dx$$

$$U = e^{2x} \Rightarrow dU = 2e^{2x} dx$$

$$dV = \cos 3x dx \Rightarrow V = \frac{\sin 3x}{3}$$

Тогда:

$$\int e^{2x} \cos 3x dx = e^{2x} \cdot \frac{\sin 3x}{3} - \int \frac{\sin 3x}{3} \cdot 2e^{2x} dx$$

$$\frac{2}{3} \int \sin 3x \cdot e^{2x} dx$$

$$U = e^{2x} \Rightarrow dU = 2e^{2x} dx$$

$$dV = \frac{\sin 3x}{3} dx \Rightarrow V = -\frac{\cos 3x}{3}$$

Воспользуемся формулой ещё раз

$$\frac{2}{3} \int \sin 3x \cdot e^{2x} dx = 2e^{2x} \cdot \left(-\frac{\cos 3x}{9}\right) + \int \frac{\cos 3x}{9} \cdot 4e^{2x} dx$$

Тогда:

$$\int e^{2x} \cos 3x dx = e^{2x} \cdot \frac{\sin 3x}{3} + 2e^{2x} \cdot \frac{\cos 3x}{9} - \int \frac{\cos 3x}{9} \cdot 4e^{2x} dx$$

Перенесем интеграл из правой части в левую

$$\int e^{2x} \cos 3x dx + \int \frac{\cos 3x}{9} \cdot 4e^{2x} dx = e^{2x} \cdot \frac{\sin 3x}{3} + 2e^{2x} \cdot \left(\frac{\cos 3x}{9}\right)$$

$$\frac{13}{9} \int e^{2x} \cos 3x dx = \frac{3e^{2x} \sin 3x + 2e^{2x} \cos 3x}{9}$$

$$\int e^{2x} \cos 3x dx = \frac{3e^{2x} \sin 3x + 2e^{2x} \cos 3x}{13}$$

Проверим

In [4]:

```
x=Symbol('x')
f=exp(2*x)*cos(3*x)
f
```

Out[4]:

$$e^{2x} \cos(3x)$$

In [5]:

```
integrate(f,x)
```

Out[5]:

$$\frac{3e^{2x} \sin(3x)}{13} + \frac{2e^{2x} \cos(3x)}{13}$$

Видим, что интеграл посчитан правильно

3. Вычислить определенный интеграл

$$\int_0^{\ln 2} x e^{-x} dx$$

$$U = x \Rightarrow dU = dx$$

$$dV = e^{-x} \Rightarrow V = -e^{-x}$$

Тогда:

$$\int_0^{\ln 2} x e^{-x} dx = -x e^{-x} - \int_0^{\ln 2} e^{-x} dx = -x e^{-x} - e^{-x} \Big|_0^{\ln 2} = -\frac{\ln 2 - 1}{2} + 1$$

Проверим

In [6]:

```
x=Symbol('x')  
f=x*exp(-x)  
f
```

Out[6]:

$x e^{-x}$

In [7]:

```
integrate(f,(x, 0, ln(2)))
```

Out[7]:

$\frac{1}{2} - \frac{\log(2)}{2}$

Видим, что интеграл посчитан правильно

4. Вычислить несобственный интеграл

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x - 2}$$

¶

$$\frac{1}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{(x+2)(x-1)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1} = \frac{A(x+2) + B(x-1)}{(x+2)(x-1)}$$

$$A(x+2) + B(x-1) = Ax + 2A + Bx - B = 1$$

$$\begin{cases} Ax + Bx = 0 \\ 2A - B = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = \frac{1}{3} \\ B = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\frac{1}{x^2 + x - 2} = \frac{\frac{1}{3}}{x - 1} + \frac{-\frac{1}{3}}{x + 2}$$

Тогда:

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{3} \int_2^{+\infty} \frac{1}{x - 1} dx - \frac{1}{3} \int_2^{+\infty} \frac{1}{x + 2}$$

$$\frac{1}{3} \int_2^b \frac{1}{x - 1} dx = \frac{1}{3} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{1}{x - 1} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\ln(b - 1)}{3} - \frac{\ln(0)}{3}$$

$$\frac{1}{3} \int_2^b \frac{1}{x + 2} dx = \frac{1}{3} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_2^b \frac{1}{x + 2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\ln(b + 2)}{3} - \frac{\ln(4)}{3}$$

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x - 2} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\ln(b - 1)}{3} - \frac{\ln(0)}{3} - \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{\ln(b + 2)}{3} + \frac{\ln(4)}{3} = \frac{\ln(4)}{3}$$

Проверим

In [8]:

```
x=Symbol('x')
f=1/(x**2+x-2)
f
```

Out[8]:

$$\frac{1}{x^2 + x - 2}$$

In [9]:

```
integrate(f,(x, 2, +oo))
```

Out[9]:

$$\frac{\log(4)}{3}$$

Видим, что интеграл посчитан правильно

5*. Вычислить несобственный интеграл

$$\int_0^1 \ln x \, dx$$