

Modern mathematics series

Sergey Strukov

28 мая 2025 г.

Copyright © Sergey Strukov. All rights reserved. This is a public document. You can freely distribute and use it, providing the authorship and the copyright note is unchanged.

Пределы.

Исторически, теория пределов возникла как часть анализа. Однако, после появления топологии, она в обобщённой форме стала естественной частью топологии. В этой статье теория пределов излагается в законченной геометрической форме. Кратко говоря, предел — это продолжение функции по непрерывности на специальных топологических пространствах — **фильтрах**. Подобная конструкция делает большинство свойств пределов *наглядно очевидными*.

n.1

1)^{def} Пусть F — топологическое пространство. F называется фильтром, если все точки F , кроме одной, открыты. Такая точка, тавтологически, определена однозначно. Будем обозначать её ∞_F . Следуя общему правилу, положим $F^\circ := F \setminus \{\infty_F\}$.

2) Пусть F — фильтр.

Тогда справедливы следующие утверждения:

F° открыто, но не замкнуто,


F° дискретно,

$\overline{F^\circ} = F$, $F^\circ \neq \emptyset$,

∞_F замкнута,

F не дискретно.

3)^{def} Пусть F — фильтр, X — топологическое пространство, $f : F^\circ \rightarrow X$ — любое отображение. Тогда f непрерывно (потому что F° дискретно!). Пусть $x \in X$, g — продолжение f на F , такое, что $g(\infty_F) = x$. Если g непрерывно, то будем говорить, что $x = \lim_F f$.



4) Пусть F — фильтр, $p : X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение топологических пространств, $f : F^\circ \rightarrow X$ — отображение.

Тогда $x = \lim_F f \Rightarrow p(x) = \lim_F p \circ f$.

5) Пусть F — фильтр, X — топологическое пространство, $\{Y_i\}_{i \in I}$ — семейство топологических пространств, $\{p_i : X \rightarrow Y_i\}_{i \in I}$ — семейство непрерывных отображений. Пусть топология X порождена семейством $\{p_i\}_{i \in I}$. Пусть $f : F^\circ \rightarrow X$, $x \in X$.

Тогда, $x = \lim_F f \Leftrightarrow \forall i \in I \ p_i(x) = \lim_F p_i \circ f$.

6) Пусть F — фильтр, X — топологическое пространство, $f : F^\circ \rightarrow X$ — отображение.

Пусть $A \subset X$ замкнуто.

Если $f(F^\circ) \subset A$, $x = \lim_F f$, то $x \in A$.

Proof.

Пусть g — непрерывное продолжение f , такое, что $g(\infty_F) = x$.

Тогда $x \in g(F) = g(\overline{F^\circ}) \subset \overline{g(F^\circ)} = \overline{f(F^\circ)} \subset \overline{A} = A$.

То же самое по-другому: $F^\circ \subset g^{-1}(A) \Rightarrow \overline{F^\circ} \subset g^{-1}(A) \Rightarrow \infty_F \in g^{-1}(A) \Rightarrow x \in A$.

7)^{!!!} Пусть F — фильтр, X — **хаусдорфово** топологическое пространство, $f : F^\circ \rightarrow X$.

Тогда \exists не более одного предела $x = \lim_F f$.

Почему у этого пункта аж три восклицательных знака? Причина в том, что в математике очень часто пределы в хаусдорфовы пространства используются для **построения** объектов. Например: производная, интеграл, сумма ряда и.т.п. Для этого нужна единственность, обеспеченная этим свойством.

Proof.

Пусть $x, y = \lim_F f$. Тогда $(x, y) = \lim_F (f, f)$, но $(f, f) : F^\circ \rightarrow X \times X$ отображает F° в диагональ $\Delta_X \subset X \times X$, которая, в силу хаусдорфовости, замкнута в $X \times X$. Значит, $(x, y) \in \Delta_X$, т.е. $x = y$.

n.2

1)^{def} Пусть F и G — два фильтра. $\tau : F \rightarrow G$ — морфизм фильтров, если τ — непрерывное отображение и $\tau^{-1}(\infty_G) = \{\infty_F\}$.

Фильтры и их морфизмы образуют категорию.

2) Пусть F и G — два фильтра. Если $\tau : F \rightarrow G$ (морфизм фильтров), то:

$$\tau(F^\circ) \subset G^\circ ,$$

$$\tau(\infty_F) = \infty_G ,$$

$$\tau^\circ : F^\circ \rightarrow G^\circ \text{ — отображение, индуцированное } \tau .$$

3) Пусть F и G — два фильтра. Пусть $\tau^\circ : F^\circ \rightarrow G^\circ$ — отображение. Тогда τ° может быть продолжено до морфизма фильтров $\tau : F \rightarrow G$ (очевидно, единственным образом) $\Leftrightarrow \infty_G = \lim_F \tau^\circ$.

4) Пусть F и G — два фильтра, X — топологическое пространство, $\tau : F \rightarrow G$, $f : G^\circ \rightarrow X$. Тогда если $x = \lim_G f$, то $x = \lim_F f \circ \tau^\circ$.

1) Пусть G — фильтр, F — топологическое пространство, $\tau : F \rightarrow G$ — непрерывное **инъективное** отображение.

Тогда F дискретно $\Leftrightarrow \tau^{-1}(\infty_G)$ открыто.

Если F не дискретно, то F — фильтр и τ — морфизм фильтров.

Proof.

Пусть $x \in F$. τ инъективно, значит, $\{x\} = \tau^{-1}(\{\tau(x)\})$.

Поэтому если $\tau(x) \neq \infty_G$, то x открыта. Если $\tau(x) = \infty_G$, то $\{x\} = \tau^{-1}(\infty_G)$.

Таким образом, $\tau^{-1}(\infty_G)$ открыто \Rightarrow все точки F открыты $\Rightarrow F$ дискретно.

Если F дискретно, то $\tau^{-1}(\infty_G)$, тавтологически, открыто.

Если F не дискретно, то $\tau^{-1}(\infty_G)$ не открыто. В частности, это множество непусто, значит, состоит из одной точки a . Если $x \neq a$, то x открыта, a не открыта. Т.е. F — фильтр и τ — морфизм фильтров.

2) Пусть G — фильтр, $F \subset G$ — подпространство. Тогда F дискретно $\Leftrightarrow \{\infty_G\} \cap F$ открыто в F .

Если F не дискретно, то F — фильтр и $F \subset G$ — морфизм фильтров.

Такие F называются подфильтрами.

3) Пусть (F, \mathcal{T}) — фильтр.

Пусть \mathcal{S} — более тонкая топология на F , чем \mathcal{T} .

Тогда \mathcal{S} дискретна $\Leftrightarrow \{\infty_F\} \in \mathcal{S}$.

Если \mathcal{S} не дискретна, то (F, \mathcal{S}) — фильтр и $(F, \mathcal{S}) \rightarrow (F, \mathcal{T})$ — морфизм фильтров.

Такие (F, \mathcal{S}) называются более тонкими фильтрами.

4)^{def} F — ультрафильтр, если любой более тонкий фильтр $F' = F$.

Другими словами, любая, более тонкая топология на F или дискретна, или совпадает с исходной.

5)[!] Пусть F — фильтр. Тогда \exists более тонкий ультрафильтр.

Proof.

Пусть $F = (F, \mathcal{T})$.

$\Lambda := \{\mathcal{S} | \mathcal{S} \text{ — топология на } F, \mathcal{S} \supset \mathcal{T}, \{\infty_F\} \notin \mathcal{S}\}$.

Если $\mathcal{S} \in \Lambda$, то (F, \mathcal{S}) есть более тонкий, чем F фильтр, и все такие фильтры получаются этим способом.

Λ частично упорядочено включением.

Если $\mathcal{S} \in \Lambda$ — максимальный элемент, то (F, \mathcal{S}) и есть требуемый более тонкий ультрафильтр.

Поэтому достаточно доказать, что Λ индуктивно и воспользоваться леммой Цорна.

Пусть $\Sigma \subset \Lambda$ — цепь. $\mathcal{B} := \bigcup \Sigma$.

Тогда, $F \in \mathcal{B}$, $\{\infty_F\} \notin \mathcal{B}$, $A, B \in \mathcal{B} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{B}$.

Значит, \mathcal{B} — мультипликативный базис топологии \mathcal{S} .


Ясно, что $\mathcal{S} \in \Lambda$ и что \mathcal{S} мажорирует Σ .

п.4

Пусть F — фильтр,
 X — топологическое пространство,
 $f : F^\circ \rightarrow X$.

1) Пусть $\Gamma := \{ (t, f(t)) \mid t \in F^\circ \} \subset F \times X$ — график f .

Пусть $x \in X$, $\Gamma_x := \Gamma \cup \{(\infty_F, x)\} \subset F \times X$ — график продолжения f , такого, что $\infty_F \mapsto x$.



2) Рассмотрим следующую диаграмму:

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_x & \xrightarrow{pr_X} & X \\ \downarrow pr_F \text{ биективно} & & \\ F & & \end{array}$$

Тогда

$$x = \lim_F f \Leftrightarrow pr_F \text{ изоморфизм} \Rightarrow \Gamma_x \text{ недискретно}$$

3)^{def} $x \in X$ называется предельной точкой f относительно F , если Γ_x недискретно. Множество предельных точек f относительно F будем обозначать $Lim_F(f)$.

$$4) x = \lim_F f \Rightarrow x \in Lim_F(f) .$$

5) Следующие утверждения эквивалентны:


- a) Γ_x дискретно
- b) (∞_F, x) открыто в Γ_x
- c) Γ замкнуто в Γ_x
- d) $\bar{\Gamma} \cap \Gamma_x = \Gamma$
- e) $(\infty_F, x) \notin \bar{\Gamma}$
- f) \exists окрестности $\infty_F \in V, x \in U$, такие, что $V \times U \cap \Gamma = \emptyset$
- g) \exists окрестности $\infty_F \in V, x \in U$, такие, что $V \cap f^{-1}(U) = \emptyset$

6) $\bar{\Gamma} \cap \infty_F \times X = \infty_F \times \lim_F(f)$. $\lim_F(f)$ замкнуто в X .

$$7) \lim_F(f) = \bigcap_{\infty_F \in V} \overline{f(V^\circ)}$$

8) Пусть $\tau : G \rightarrow F$ — морфизм фильтров. Тогда $\lim_G(f \circ \tau^\circ) \subset \lim_F(f)$.

Proof.



$$(\tau \times id_X)(\Gamma') \subset \Gamma$$

$$(\tau \times id_X)(\bar{\Gamma}') \subset \bar{\Gamma}$$

9)! Следующие утверждения равносильны:

a) $x \in \lim_F(f)$

b) Γ_x есть фильтр

c) $\exists F'$ — более тонкий фильтр, чем F , такой, что $x = \lim_{F'} f$

d) $\exists F'$ — более тонкий фильтр, чем F , такой, что $x \in \lim_{F'}(f)$

10) Пусть F — **ультрафильтр**. Тогда $\lim_F(f) = \lim_F f$.

11) Пусть X хаусдорфово. Тогда $x = \lim_F f \Rightarrow \lim_F(f) = \{x\}$.

12) Пусть $p : X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение. Тогда $p(\lim_F(f)) \subset \lim_F(f \circ p)$.

1)^{def} Пусть F — фильтр. *Базой* F называется базис окрестностей в ∞_F . Т.е. это семейство \mathcal{B} , такое, что $\forall U \in \mathcal{B}$ есть окрестность ∞_F и $\forall V$, окрестности ∞_F , $\exists V \in \mathcal{B}$, такая, что $V \subset U$.

2) Пусть F — фильтр, X — топологическое пространство, $f : F \rightarrow X$ — функция. Тогда f непрерывна $\Leftrightarrow f$ непрерывна в точке ∞_F .

3) Пусть F — фильтр, \mathcal{B} — база F , X — топологическое пространство, $f : F \rightarrow X$ — функция, $f(\infty_F) = x$. Тогда f непрерывна $\Leftrightarrow \forall x \in U$ окрестности $\exists V \in \mathcal{B}$, такая, что $f(V) \subset U$.

4)[!] Пусть X — топологическое пространство, $A \subset X$, $x \in \overline{A}$. Тогда \exists фильтр F и функция $f : F^\circ \rightarrow X$, такие, что $x = \lim_F f$.

Proof.

Положим $F = A \sqcup \{\infty\}$. Топологию на F зададим следующим базисом:

$\{a\}$ в точке $a \in A$,

$\{(U \cap A) \cup \{\infty\} \mid x \in U \text{ — окрестность } x\}$, в точке ∞ .

Тогда F — фильтр, $\infty_F = \infty$, $F^\circ = A$. Определим $f := id_A$, $g : F \rightarrow X$ — продолжение f , такое, что $g(\infty) = x$. Тогда для любой окрестности $x \in U$ будем иметь $g((U \cap A) \cup \{\infty\}) \subset U$, значит, g непрерывна, поэтому $x = \lim_F f$.

5)^{def} (Λ, \rightarrow) — направленное множество, если:

Λ — непустое множество,

\rightarrow — отношение на Λ , удовлетворяющее следующим условиям:

- a) $\lambda \rightarrow \lambda$ (рефлексивность),
- b) $\lambda \rightarrow \mu \ \& \ \mu \rightarrow \nu \Rightarrow \lambda \rightarrow \nu$ (транзитивность),
- c) $\forall \lambda, \mu \exists \nu$, такое, что $\lambda \rightarrow \nu \ \& \ \mu \rightarrow \nu$

Λ можно рассматривать как малую категорию, где Λ есть множество объектов,

$$Hom(\lambda, \mu) = \begin{cases} \{\emptyset\}, & \text{если } \lambda \rightarrow \mu \\ \emptyset, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

6)^{def} Пусть Λ — направленное множество.

$$\Lambda \rightarrow \infty := \Lambda \sqcup \{\infty\}$$

Введём на $\Lambda \rightarrow \infty$ топологию со следующим базисом:

$\{\lambda\}$ в точке $\lambda \in \Lambda$,

$\{\{\mu \mid \lambda \rightarrow \mu\} \cup \{\infty\} \mid \lambda \in \Lambda\}$, в точке ∞ .

Тогда $\Lambda \rightarrow \infty$ есть фильтр, $(\Lambda \rightarrow \infty)^\circ = \Lambda$. Самый распространённый пример — $\mathbb{N} \rightarrow \infty$.

7) Пусть Λ и Λ' — направленные множества, $\tau : \Lambda \rightarrow \Lambda'$ — монотонное отображение. Т.е. $\lambda \rightarrow \mu \Rightarrow \tau(\lambda) \rightarrow \tau(\mu)$. τ можно рассматривать как функтор, если интерпретировать Λ и Λ' как малые категории. Тогда τ продолжается до морфизма фильтров $(\Lambda \rightarrow \infty) \rightarrow (\Lambda' \rightarrow \infty)$ (всегда однозначно) $\Leftrightarrow \forall \lambda' \in \Lambda' \exists \lambda \in \Lambda, \lambda' \rightarrow \tau(\lambda)$.

Proof.

τ продолжается до морфизма фильтров $\Leftrightarrow \lim_{\Lambda \rightarrow \infty} \tau = \infty$. Это значит, что $\forall \lambda' \in \Lambda' \exists \lambda \in \Lambda, \lambda \rightarrow \mu \Rightarrow \lambda' \rightarrow \tau(\mu)$. В частности, $\lambda' \rightarrow \tau(\lambda)$. Наоборот, пусть $\lambda' \rightarrow \tau(\lambda)$. Тогда $\lambda \rightarrow \mu \Rightarrow \tau(\lambda) \rightarrow \tau(\mu) \Rightarrow \lambda' \rightarrow \tau(\mu)$.

8) Пусть Λ и Λ' — направленные множества. Тогда $\Sigma := \Lambda \times \Lambda'$ со следующим отношением порядка: $(\lambda, \lambda') \rightarrow (\mu, \mu') \Leftrightarrow \lambda \rightarrow \mu \ \& \ \lambda' \rightarrow \mu'$, есть направленное множество. При этом проекции $\Sigma \rightarrow \Lambda$ и $\Sigma \rightarrow \Lambda'$ монотонны и продолжаются до морфизмов фильтров $(\Sigma \rightarrow \infty) \rightarrow (\Lambda \rightarrow \infty)$ и $(\Sigma \rightarrow \infty) \rightarrow (\Lambda' \rightarrow \infty)$.

9)

10)

n.6

n.7