## Modern mathematics series

## Sergey Strukov

19 сентября 2021 г.

Copyright © Sergey Strukov. All rights reserved. This is a public document. You can freely distribute and use it, providing the authorship and the copyright note is unchanged.

## Удобства.

## n.1

- 1) Многие математические объекты есть множества с дополнительными структурами. Довольно часто, в этих структурах есть один выделенный элемент базового множества. Например, если G группа, то этот выделенный элемент единица группы. В таком случае удобно символом  $G^{\circ}$  обозначать базовое множество с выколотым выделенным элементом. Например,  $\mathbb{Z}^{\circ}$  множество ненулевых целых чисел.
- 2) Пусть дано топологическое пространство X и его точка x. Говорят, что эта точка замкнута (открыта, и.т.п.), если одноточечное множество  $\{x\}$  замкнуто (соответственно открыто, и.т.п.) в X.
  - 3) Несколько полезных определений:

$$\mathbb{R}_+ := \left\{ \ t \in \mathbb{R} \mid t > 0 \ \right\}$$

$$\mathbb{R}_{-} := \{ t \in \mathbb{R} \mid t < 0 \}$$

$$\mathbb{Z}_+ := \{\ t \in \mathbb{Z} \mid t > 0\ \}$$

$$\mathbb{Z}_{-} := \{ t \in \mathbb{Z} \mid t < 0 \}$$

- 4) Если p простое число, то  $\mathbb{Z}/(p)$  простое (конечное) поле из p элементов.
  - 5) {  $\pm$  } группа знаков, стандартная группа второго порядка.
  - 6) Одномерный тор:

$$\mathbb{T} := \{ \ z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1 \ \}$$

Одна из важнейших топологических групп во всей математике.

7) Стандартная комплексная синусоида:

$$\mathbf{e}(t) = e^{2\pi i t} \ , \ t \in \mathbb{R}$$

8) Основные свойства  $\mathfrak{e}(t)$ :

$$\begin{split} & \mathbf{e}(t+t') = \mathbf{e}(t) \cdot \mathbf{e}(t') \\ & \mathbf{e}(kt) = \mathbf{e}(t)^k \\ & \mathbf{e}(t+1) = \mathbf{e}(t) \\ & | \mathbf{e}(t) | = 1 \\ & \mathbf{e}(-t) = \mathbf{e}(t)^{-1} = \overline{\mathbf{e}(t)} \end{split}$$

9) В силу периодичности, e(t) может быть определена для аргумента t из  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ . Фактически,  $e(t): \mathbb{R}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{T}$ .