

Modern mathematics series

Sergey Strukov

17 мая 2025 г.

Copyright © Sergey Strukov. All rights reserved. This is a public document. You can freely distribute and use it, providing the authorship and the copyright note is unchanged.

Удобства.

п.1

1) Многие математические объекты есть множества с дополнительными структурами. Довольно часто в этих структурах есть один выделенный элемент базового множества. Например, если G — группа, то этот выделенный элемент — единица группы. В таком случае удобно символом G° обозначать базовое множество с выколотым выделенным элементом. Например, \mathbb{Z}° — множество ненулевых целых чисел.

2) Пусть дано топологическое пространство X и его точка x . Говорят, что эта точка замкнута (открыта, и.т.п.), если одноточечное множество $\{x\}$ замкнуто (соответственно открыто, и.т.п.) в X .

3) Несколько полезных определений:

$$\mathbb{R}_+ := \{ t \in \mathbb{R} \mid t > 0 \}$$

$$\mathbb{R}_- := \{ t \in \mathbb{R} \mid t < 0 \}$$

$$\mathbb{Z}_+ := \{ t \in \mathbb{Z} \mid t > 0 \}$$

$$\mathbb{Z}_- := \{ t \in \mathbb{Z} \mid t < 0 \}$$

4) Если p — простое число, то $\mathbb{Z}/(p)$ — простое (конечное) поле из p элементов.

5) $\{ \pm 1 \}$ — группа знаков, стандартная группа второго порядка.

6) Одномерный тор:

$$\mathbb{T} := \{ z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1 \}$$

Одна из важнейших топологических групп во всей математике.

7) Стандартная комплексная синусоида:

$$\mathfrak{e}(t) = e^{2\pi it}, \quad t \in \mathbb{R}$$

8) Основные свойства $\mathfrak{e}(t)$:

$$\mathfrak{e}(t + t') = \mathfrak{e}(t) \cdot \mathfrak{e}(t')$$

$$\mathfrak{e}(kt) = \mathfrak{e}(t)^k$$

$$\mathfrak{e}(t + 1) = \mathfrak{e}(t)$$

$$|\mathfrak{e}(t)| = 1$$

$$\mathfrak{e}(-t) = \mathfrak{e}(t)^{-1} = \overline{\mathfrak{e}(t)}$$

9) В силу периодичности, $\mathfrak{e}(t)$ может быть определена для аргумента t из \mathbb{R}/\mathbb{Z} . Фактически, $\mathfrak{e}(t) : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{T}$.