

Семинарское занятие №2

Воробьёв Сергей

Сентябрь 2019

Предел последовательности

Определение предела последовательностей:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$

Задача 1

Найти сумму ряда:

$$\sum_{k=1}^n (k+1)C_n^k$$

Решение

$$(k+1)C_n^k = kC_n^k + C_n^k = nC_{n-1}^{k-1} + C_n^k$$

$$\sum_{k=1}^n (k+1)C_n^k = n \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} + \sum_{k=1}^n C_n^k = n \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k + \sum_{k=1}^n C_n^k = n2^{n-1} + 2^n - 1$$

Ответ: $n2^{n-1} + 2^n - 1$

Задача 2

Найти сумму ряда:

$$\sum_{k=1}^n (k-1)C_n^k$$

Решение

$$\sum_{k=1}^n (k-1)C_n^k = n \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} - \sum_{k=1}^n C_n^k = n \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k - \sum_{k=1}^n C_n^k = n2^{n-1} - 2^n + 1$$

Ответ: $n2^{n-1} - 2^n + 1$

Задача 3

Найти сумму ряда:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k (C_n^k)^2$$

Решение

Рассмотрим выражение $(1+x)^n(1-x)^n = (1-x^2)^{2n}$

$$(C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + C_n^3 x^3 + \dots)(C_n^0 - C_n^1 x + C_n^2 x^2 - C_n^3 x^3 + \dots) = C_n^0 - C_n^1 x^2 + C_n^2 x^4 - \dots$$

Рассмотрим коэффициент при x^k в правой части, для того, чтобы его получить необходимо перемножить слагаемые из левой части так, чтобы в сумме они давали нужную степень из правой части

Таким образом, получаем:

$$C_n^0 C_n^m - C_n^1 C_n^{m-1} + C_n^2 C_n^{m-2} - \dots + C_n^m C_n^0 = (-1)^{\frac{n}{2}} C_n^{\frac{n}{2}}$$

Этот верен для четного числа n , если же оно нечетно, то ответ равен нулю, так как нечетных степеней в правой части равенства нет

Ответ: $(-1)^{\frac{n}{2}} C_n^{\frac{n}{2}}, 0$

Задача 4

Доказать ограниченность последовательности:

$$a_n = \frac{2n^2 - 1}{2 + n^2}, n \geq 1$$

Решение

$$0 \leq \frac{2n^2 - 1}{2 + n^2} \leq \frac{2n^2}{n^2} \leq 2$$

Задача 5

Доказать ограниченность последовательности сверху:

$$a_n = \frac{1 - n}{\sqrt{n^2 + 1}}, n \geq 1$$

Решение

$$\frac{1 - n}{\sqrt{n^2 + 1}} \leq \frac{n}{n} = 1$$

Задача 6

Доказать, что последовательность убывает и доказать, что предел равен

0

$$a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Решение

Рассмотрим отношение $\frac{a_{n+1}}{a_n}$, оно равно $\frac{1}{3} < 1$, что значит, что последовательность убывает

Докажем теперь, что предел равен 0

$$\left| \frac{1}{3^n} - 0 \right| < \varepsilon$$

$$\frac{1}{3^n} < \varepsilon$$

$$n \ln \frac{1}{3} < \ln \varepsilon$$

$$n \geq \frac{\ln \varepsilon}{\ln \frac{1}{3}}$$

Ответ: убывает

Задача 7

Найти предел по теореме о двух милиционеров:

$$a_n = \frac{5^n}{n}$$

Решение

Из предыдущей задачи знаем, что $\frac{1}{3^n} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$
Значит при больших n :

$$0 \leq \frac{5^n}{n^n} \leq \frac{1}{3^n}$$

Граница снизу остается нулем, верхняя граница стремится к нулю, следовательно, по теореме о двух милиционерах a_n сходится к нулю

Задача 8

Найти предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 - 3n^2}{n^3 + 1}$$

Решение

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 - 3n^2}{n^3 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 - \frac{3}{n}}{1 + \frac{1}{n^3}} = 5$$

Ответ: 5

Задача 9

Найти предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$$

Решение

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{(\sqrt{n^2 + n} + n)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{1}{2}$