

MATRICES ASOCIADAS ¹

Iñaki Pelayo²

² **Department de Matemàtiques**

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Universitat Politècnica de Catalunya

ÁLGEBRA Y GEOMETRIA

¹ **CURSO 20-21, Q1.**

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

- $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}: \begin{cases} \vec{e}_1 = (1, 0) \\ \vec{e}_2 = (0, 1) \end{cases}$

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

- $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$:
$$\begin{cases} \vec{e}_1 = (1, 0) \\ \vec{e}_2 = (0, 1) \end{cases}$$
- $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$:
$$\begin{cases} \vec{u}_1 = (2, 3) \\ \vec{u}_2 = (1, 2) \end{cases}$$

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

- $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$: $\begin{cases} \vec{e}_1 = (1, 0) \\ \vec{e}_2 = (0, 1) \end{cases}$

- $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$: $\begin{cases} \vec{u}_1 = (2, 3) \\ \vec{u}_2 = (1, 2) \end{cases}$

- $I_{\mathbb{R}^2}(\vec{v}) = \vec{v}$:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R}^2 & \xrightarrow{I_{\mathbb{R}^2}} & \mathbb{R}^2 \\
 (x, y) & \longmapsto & (x, y) \\
 \vec{e}_1 = (1, 0) & \longmapsto & \vec{e}_1 = (1, 0) \\
 \vec{e}_2 = (0, 1) & \longmapsto & \vec{e}_2 = (0, 1) \\
 \vec{u}_1 = (2, 3) & \longmapsto & \vec{u}_1 = (2, 3) \\
 \vec{u}_2 = (1, 2) & \longmapsto & \vec{u}_2 = (1, 2)
 \end{array}$$

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

- $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

- $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- $\begin{cases} \vec{e}_1 = 1 \cdot \vec{e}_1 + 0 \cdot \vec{e}_2 \\ \vec{e}_2 = 0 \cdot \vec{e}_1 + 1 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{e}_1]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ [\vec{e}_2]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [I_{\mathbb{R}^2}]_C = I_2$

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

- $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

- $$\begin{cases} \vec{e}_1 = 1 \cdot \vec{e}_1 + 0 \cdot \vec{e}_2 \\ \vec{e}_2 = 0 \cdot \vec{e}_1 + 1 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{e}_1]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ [\vec{e}_2]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [I_{\mathbb{R}^2}]_{\mathcal{C}} = I_2$$

- $$\begin{cases} \vec{u}_1 = 1 \cdot \vec{u}_1 + 0 \cdot \vec{u}_2 \\ \vec{u}_2 = 0 \cdot \vec{u}_1 + 1 \cdot \vec{u}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{u}_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ [\vec{u}_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [I_{\mathbb{R}^2}]_{\mathcal{B}} = I_2$$

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

- $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

$$\bullet P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \begin{cases} \vec{u}_1 = 2 \cdot \vec{e}_1 + 3 \cdot \vec{e}_2 \\ \vec{u}_2 = 1 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{u}_1]_C = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ [\vec{u}_2]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [I_{\mathbb{R}^2}]_{BC} = P$$

PROBLEMA 1: ENDOMORFISMO IDENTIDAD

$$\bullet \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \quad \begin{cases} \vec{u}_1 = 2 \cdot \vec{e}_1 + 3 \cdot \vec{e}_2 \\ \vec{u}_2 = 1 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{u}_1]_C = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ [\vec{u}_2]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [I_{\mathbb{R}^2}]_{BC} = P$$

$$\bullet \quad \begin{cases} \vec{e}_1 = 2 \cdot \vec{u}_1 - 3 \cdot \vec{u}_2 \\ \vec{e}_2 = -1 \cdot \vec{u}_1 + 2 \cdot \vec{u}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{e}_1]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \\ [\vec{e}_2]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [I_{\mathbb{R}^2}]_{CB} = P^{-1}$$

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

- $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$:
$$\begin{cases} \vec{e}_1 = (1, 0) \\ \vec{e}_2 = (0, 1) \end{cases}$$

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

- $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$:
$$\begin{cases} \vec{e}_1 = (1, 0) \\ \vec{e}_2 = (0, 1) \end{cases}$$
- $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$:
$$\begin{cases} \vec{u}_1 = (2, 3) \\ \vec{u}_2 = (1, 2) \end{cases}$$

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

- $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$:
$$\begin{cases} \vec{e}_1 = (1, 0) \\ \vec{e}_2 = (0, 1) \end{cases}$$

- $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$:
$$\begin{cases} \vec{u}_1 = (2, 3) \\ \vec{u}_2 = (1, 2) \end{cases}$$

- $h(\vec{v}) = 3\vec{v}$:

\mathbb{R}^2	\xrightarrow{h}	\mathbb{R}^2
(x, y)	\mapsto	$(3x, 3y)$
$\vec{e}_1 = (1, 0)$	\mapsto	$3\vec{e}_1 = (3, 0)$
$\vec{e}_2 = (0, 1)$	\mapsto	$3\vec{e}_2 = (0, 3)$
$\vec{u}_1 = (2, 3)$	\mapsto	$3\vec{u}_1 = (6, 9)$
$\vec{u}_2 = (1, 2)$	\mapsto	$3\vec{u}_2 = (3, 6)$

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

- $3I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

- $3I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

- $\begin{cases} 3\vec{e}_1 = 3 \cdot \vec{e}_1 + 0 \cdot \vec{e}_2 \\ 3\vec{e}_2 = 0 \cdot \vec{e}_1 + 3 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [3\vec{e}_1]_C = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \\ [3\vec{e}_2]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [h]_C = 3I_2$

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

$$\bullet \quad 3I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \quad \begin{cases} 3\vec{e}_1 = 3 \cdot \vec{e}_1 + 0 \cdot \vec{e}_2 \\ 3\vec{e}_2 = 0 \cdot \vec{e}_1 + 3 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [3\vec{e}_1]_C = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \\ [3\vec{e}_2]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [h]_C = 3I_2$$

$$\bullet \quad \begin{cases} 3\vec{u}_1 = 3 \cdot \vec{u}_1 + 0 \cdot \vec{u}_2 \\ 3\vec{u}_2 = 0 \cdot \vec{u}_1 + 3 \cdot \vec{u}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [3\vec{u}_1]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \\ [3\vec{u}_2]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [h]_B = 3I_2$$

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

- $A = 3I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}; P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

- $A = 3I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}; P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$
- $B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 6 \end{pmatrix} = AP; B' = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -9 & 6 \end{pmatrix} = P^{-1}A$
- $\begin{cases} 3\vec{u}_1 = 6 \cdot \vec{e}_1 + 9 \cdot \vec{e}_2 \\ 3\vec{u}_2 = 3 \cdot \vec{e}_1 + 6 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [3\vec{u}_1]_C = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} \\ [3\vec{u}_2]_C = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [h]_{BC} = B$

PROBLEMA 2: HOMOTECIA

$$\bullet A = 3I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}; P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bullet B = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 6 \end{pmatrix} = AP; B' = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -9 & 6 \end{pmatrix} = P^{-1}A$$

$$\bullet \begin{cases} 3\vec{u}_1 = 6 \cdot \vec{e}_1 + 9 \cdot \vec{e}_2 \\ 3\vec{u}_2 = 3 \cdot \vec{e}_1 + 6 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [3\vec{u}_1]_C = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} \\ [3\vec{u}_2]_C = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [h]_{BC} = B$$

$$\bullet \begin{cases} 3\vec{e}_1 = 6 \cdot \vec{u}_1 - 9 \cdot \vec{u}_2 \\ 3\vec{e}_2 = -3 \cdot \vec{u}_1 + 6 \cdot \vec{u}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [3\vec{e}_1]_B = \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \end{pmatrix} \\ [3\vec{e}_2]_B = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [h]_{CB} = B'$$

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

- $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$:
$$\begin{cases} \vec{e}_1 = (1, 0) \\ \vec{e}_2 = (0, 1) \end{cases}$$

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

- $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$:
$$\begin{cases} \vec{e}_1 = (1, 0) \\ \vec{e}_2 = (0, 1) \end{cases}$$
- $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$:
$$\begin{cases} \vec{u}_1 = (2, 3) \\ \vec{u}_2 = (1, 2) \end{cases}$$

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

- $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$: $\begin{cases} \vec{e}_1 = (1, 0) \\ \vec{e}_2 = (0, 1) \end{cases}$

- $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$: $\begin{cases} \vec{u}_1 = (2, 3) \\ \vec{u}_2 = (1, 2) \end{cases}$

- $g(\vec{v}) = \vec{w}$:

\mathbb{R}^2	\xrightarrow{g}	\mathbb{R}^2
(x, y)	\mapsto	$(-y, x)$
$\vec{e}_1 = (1, 0)$	\mapsto	$\vec{e}_2 = (0, 1)$
$\vec{e}_2 = (0, 1)$	\mapsto	$-\vec{e}_1 = (-1, 0)$
$\vec{u}_1 = (2, 3)$	\mapsto	$\vec{v}_1 = (-3, 2)$
$\vec{u}_2 = (1, 2)$	\mapsto	$\vec{v}_2 = (-2, 1)$

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

- $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

- $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$
- $B = \begin{pmatrix} -8 & -5 \\ 13 & 8 \end{pmatrix} = P^{-1}AP$

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

- $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

- $B = \begin{pmatrix} -8 & -5 \\ 13 & 8 \end{pmatrix} = P^{-1}AP$

- $$\begin{cases} \vec{e}_2 = 0 \cdot \vec{e}_1 + 1 \cdot \vec{e}_2 \\ -\vec{e}_1 = 1 \cdot \vec{e}_1 + 0 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{e}_2]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ [-\vec{e}_1]_C = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [g]_C = A$$

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bullet B = \begin{pmatrix} -8 & -5 \\ 13 & 8 \end{pmatrix} = P^{-1}AP$$

$$\bullet \begin{cases} \vec{e}_2 = 0 \cdot \vec{e}_1 + 1 \cdot \vec{e}_2 \\ -\vec{e}_1 = 1 \cdot \vec{e}_1 + 0 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{e}_2]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ [-\vec{e}_1]_C = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [g]_C = A$$

$$\bullet \begin{cases} \vec{v}_1 = -8 \cdot \vec{u}_1 + 13 \cdot \vec{u}_2 \\ \vec{v}_2 = -5 \cdot \vec{u}_1 + 8 \cdot \vec{u}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{v}_1]_B = \begin{pmatrix} -8 \\ 13 \end{pmatrix} \\ [\vec{v}_2]_B = \begin{pmatrix} -5 \\ 8 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [g]_B = B$$

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

- $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bullet B' = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = AP; B'' = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = P^{-1}A$$

$$\bullet \begin{cases} \vec{v}_1 = -3 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2 \\ \vec{v}_2 = -2 \cdot \vec{e}_1 + 1 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{v}_1]_C = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \\ [\vec{v}_2]_C = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [g]_{BC} = B'$$

PROBLEMA 3: GIRO 90 grados

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bullet B' = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = AP; B'' = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = P^{-1}A$$

$$\bullet \begin{cases} \vec{v}_1 = -3 \cdot \vec{e}_1 + 2 \cdot \vec{e}_2 \\ \vec{v}_2 = -2 \cdot \vec{e}_1 + 1 \cdot \vec{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{v}_1]_C = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \\ [\vec{v}_2]_C = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [g]_{BC} = B'$$

$$\bullet \begin{cases} \vec{e}_2 = -1 \cdot \vec{u}_1 + 2 \cdot \vec{u}_2 \\ -\vec{e}_1 = -2 \cdot \vec{u}_1 + 3 \cdot \vec{u}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} [\vec{e}_2]_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ [-\vec{e}_1]_B = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \end{cases} \Rightarrow [g]_{CB} = B''$$