



Méthodes de régression spatiale : un grand bol d'R

Philippe Apparicio

Jean Dubé

Jérémy Gelb

Joan Carles Martori

2025-02-04

Table des matières

Préface	1
Un manuel sous la forme d'une ressource éducative libre	2
Comment lire ce manuel?	4
Comment utiliser les données du livre pour reproduire les exemples?	4
Liste des <i>packages</i> utilisés	5
Bref historique sur les modèles de régressions spatiales en économie et en géographie	5
Structure du livre	6
Remerciements	7
À propos des auteurs	8
Partie 1. Notions de base	9
1 Autocorrélation spatiale, dépendance spatiale et hétérogénéité spatiale d'un modèle de régression	10
1.1 Description des jeux de données utilisés dans le manuel	10
1.1.1 Jeu de données sur l'agglomération de Lyon	11
1.1.2 Jeu de données sur la région métropolitaine de Montréal	11
1.1.3 Jeu de données sur Barcelone	12
1.1.4 Jeu de données sur la région métropolitaine de Montréal	12
1.1.5 Jeu de données sur la densité pour six villes espagnoles	12
1.1.6 Jeu de données sur la densité pour six régions métropolitaines espagnoles	12
1.2 Matrices des pondérations spatiales	12
1.2.1 Matrices de contiguïté	13
1.2.2 Matrices de proximité	15
1.2.2.1 Matrice de distance binaire (de connectivité)	19
1.2.2.2 Matrices basées sur la distance	19
1.2.2.3 Matrices selon le critère des plus proches voisins	20
1.2.3 Standardisation des matrices de pondération spatiale en ligne	21
1.2.4 Mise en œuvre dans R	23
1.2.4.1 Matrices de pondération spatiale selon la contiguïté	23
1.2.4.2 Matrices de pondération spatiale selon la contiguïté et un ordre d'adjacence	26
1.2.4.3 Matrice de connectivité (matrice distance binaire)	26
1.2.4.4 Matrices de pondération spatiale selon l'inverse de la distance et l'inverse de la distance au carré	26
1.2.4.5 Matrices de pondération spatiale selon le critère des plus proches voisins	30
1.3 Variable spatialement décalée	32
1.4 Autocorrélation spatiale	34
1.4.1 Formulation du I de Moran	35

1.4.2	Interprétation du I de Moran	36
1.4.3	Significativité du I de Moran	37
1.4.4	Mise en œuvre dans R	37
1.4.4.1	Étape 1. Construction des matrices de pondération spatiale	37
1.4.4.2	Étape 2. Calcul du I de Moran et des trois tests de significativité	38
1.4.4.3	Étape 3. Identification de la plus forte autocorrélation spatiale selon les différentes matrices	40
1.4.4.4	Étape 4. Comparaison des valeurs du I de Moran pour plusieurs variables avec la même matrice	43
1.5	Bref retour sur la régression linéaire multiple	45
1.6	Pourquoi recourir à des régressions spatiales?	48
1.6.1	Dépendance spatiale	48
1.6.2	Hétérogénéité spatiale	52
Partie 2. Économétrie spatiale		53
2	Modèles d'économétrie spatiale	54
2.1	Les différents modèles spatiaux autorégressifs	55
2.1.1	Modèle SLX : prise en compte des caractéristiques des voisins	55
2.1.1.1	Description du modèle SLX	55
2.1.1.2	Modèle SLX dans R	57
2.1.2	Modèle SAR : autocorrélation spatiale sur la variable dépendante	62
2.1.2.1	Description du Modèle SAR	62
2.1.2.2	Modèle SAR dans R	63
2.1.3	Modèle SEM : autocorrélation spatiale sur le terme d'erreur	68
2.1.3.1	Description du modèle SEM	68
2.1.3.2	Modèle SEM dans R	69
2.1.4	Modèle SDM : autocorrélation spatiale sur la variable dépendante et les variables indépendantes	71
2.1.4.1	Description du modèle SDM	71
2.1.4.2	Modèle SDM dans R	72
2.1.5	Modèle SDEM : autocorrélation spatiale sur les variables indépendantes et sur le terme d'erreur	74
2.1.5.1	Description du modèle SDEM	74
2.1.5.2	Modèle SDEM dans R	75
2.1.6	Modèle généralisé : autocorrélation spatiale de l'ensemble des variables et composantes du modèle	78
2.1.6.1	Description du modèle généralisé	78
2.1.6.2	Modèle généralisé (Manski) dans R	78
2.2	Quel modèle choisir?	83
2.2.1	Tests du multiplicateur de Lagrange (LM) sur le modèle MCO	83
2.2.2	Tests du ratio de vraisemblance sur les modèles spatiaux	85
2.2.3	Comparaison des modèles mixtes et non mixtes	88
2.2.4	Mesures AIC et BIC et dépendance spatiale	89
2.3	Quiz de révision	92
2.4	Exercices de révision	94
3	Modèles d'économétrie spatiale par panel	95
3.1	Bref retour sur les modèles en panel	96

3.2	Formulation des différents modèles spatiaux par panel	96
3.2.1	Description des différents modèles	96
3.2.2	Modèle SLPDM : autocorrélation sur la variable dépendante	96
3.2.3	Modèle SEPDM : autocorrélation sur le terme d'erreur	96
3.2.4	Modèle SEPDM : autocorrélation sur la variable dépendante et les variables indépendantes	96
3.3	Sélection du modèle spatial par panel le plus approprié	96
3.4	Mise en œuvre dans R	96
3.5	Quiz de révision	96
3.6	Exercices de révision	96
Partie 3. Régressions géographiquement pondérées		98
4	Régressions géographiquement pondérées classiques	99
4.1	Principe de base	100
4.1.1	Pourquoi recourir à une régression géographiquement pondérée?	100
4.1.2	Formulation de la GWR	100
4.1.3	Exemple applicatif de la GWR	102
4.1.3.1	Résultats du modèle global	102
4.1.3.2	Résultats du modèle GWR	102
4.2	Mise en œuvre et analyse dans R	103
4.2.1	GWR avec le <i>package</i> <code>spgwr</code>	105
4.2.1.1	Définition de la taille de la zone d'influence	105
4.2.1.2	Réalisation de la GWR	107
4.2.1.3	Comparaison des modèles MCO et GWR	108
4.2.1.4	Cartographie des résultats du modèle GWR	112
4.2.2	GWR avec le <i>package</i> <code>GWmodel</code>	122
4.2.2.1	Définition de la taille de la zone d'influence	122
4.2.2.2	Réalisation de la GWR	125
4.2.2.3	Cartographie des résultats du modèle GWR	127
4.3	GWR classiques pour d'autres distributions	130
4.4	Limites et critiques des GWR	130
4.5	Quiz de révision	133
4.6	Exercices de révision	133
5	Extensions de la régression géographiquement pondérée	135
5.1	Régression géographiquement pondérée mixte	137
5.1.1	Principe de base de la GWR mixte	137
5.1.1.1	Pourquoi recourir à une GWR mixte	137
5.1.1.2	Formulation de la GWR mixte	137
5.1.2	Mise en oeuvre de la GWR mixte dans R	137
5.2	Régression géographiquement pondérée multiéchelle	137
5.2.1	Principe de base de la MGWR	137
5.2.1.1	Pourquoi recourir à une GWR mixte	137
5.2.1.2	Formulation de la GWR mixte	137
5.2.2	Mise en oeuvre de la MGWR dans R	137

5.3	Régression géographiquement pondérée mixte avec des variables spatialement décalée	137
5.3.1	Principe de base de la MGWR-SAR	137
5.3.1.1	Pourquoi recourir à une MGWR-SAR	137
5.3.1.2	Formulation de la MGWR-SAR	137
5.3.2	Mise en oeuvre de la MGWR-SAR dans R	137
5.4	Quiz de révision	137
5.5	Exercices de révision	137
Partie 4. Autres approches de modélisations spatiales		139
6	Modèles généralisées additifs	140
6.1	Bref retour sur les GAM	141
6.2	Comment utiliser une spline pour ajouter l'espace dans un modèle GAM?	142
6.3	Pourquoi recourir à un modèle GAM?	146
6.4	<i>Random Markow Field</i> (RFM) ou spline bivariée?	147
6.5	Mise en oeuvre et analyse dans R	148
6.5.1	Modèles GAM sans intégration de l'espace	152
6.5.2	GAM avec spline spatiale bivariée sur les coordonnées géographiques	156
6.5.3	GAM avec spline spatiale de type RMF	163
6.6	Quiz de révision	168
6.7	Exercices de révision	170
7	Filtrage spatial	172
7.1	Les vecteurs propres de Moran	173
7.2	Filtrage spatial	174
7.2.1	Sélection itérative	175
7.2.2	Effet aléatoire	176
7.2.3	Sélection par LASSO	177
7.3	Mise en oeuvre et analyse dans R	177
7.3.1	Modèle SEVM par sélection itérative	177
7.3.2	Modèle SEVM avec effet aléatoire	184
7.3.3	Modèle SEVM avec pénalisation par Lasso	186
7.3.4	Comparaison des trois modèles SEVM	188
7.4	Quiz de révision	193
Partie 7. Exercices et bibliographie		195
8	Correction des exercices	196
8.1	Exercices du chapitre 1	196
8.1.1	Exercice 1	196
8.1.2	Exercice 2	196
8.1.3	Exercice 3	196
8.2	Exercices du chapitre 2	196
8.2.1	Exercice 1	196
8.2.2	Exercice 2	196

8.2.3	Exercice 3	197
8.3	Exercices du chapitre 3	197
8.3.1	Exercice 1	197
8.3.2	Exercice 2	197
8.3.3	Exercice 3	197
8.4	Exercices du chapitre 4	197
8.4.1	Exercice 1	197
8.4.2	Exercice 2	198
8.4.3	Exercice 3	199
8.5	Exercices du chapitre 5	201
8.5.1	Exercice 1	201
8.5.2	Exercice 2	202
8.5.3	Exercice 3	202
8.6	Exercices du chapitre 6	202
8.6.1	Exercice 1	202
8.6.2	Exercice 2	202
8.6.3	Exercice 3	202
8.7	Exercices du chapitre 7	202
8.7.1	Exercice 1	202
8.7.2	Exercice 2	202
8.7.3	Exercice 3	202
Bibliographie		203

Liste des figures

1	Licence Creative Commons du livre	3
2	Téléchargement de l'intégralité du livre	5
1.1	Cartographie des variables du jeu de données LyonIris	14
1.2	Parts modales de transport en commun et de l'automobile (proportion)	15
1.3	Relation topologique entre des entités spatiales polygonales	16
1.4	Relations de voisinage et évaluation de la contiguïté	17
1.5	Les différents types de distance	18
1.6	Illustration de la connectivité basée sur la distance	19
1.7	Comparaison des matrices inverse de la distance et inverse de la distance au carré	20
1.8	Arrondissements de la ville de Sherbrooke	21
1.9	Illustration du calcul d'une variable spatialement décalée	32
1.10	Exemple de variable spatialement décalée	34
1.11	Valeurs du I de Moran selon les différentes matrices de pondération spatiale	43
1.12	Valeurs du I de Moran pour les quatre variables	45
1.13	Cartographie des résidus d'un modèle MCO	51
2.1	Effets marginaux dans un modèle SLX	55
2.2	Cartographie des résidus du modèle SLX	61
2.3	Effets marginaux dans un modèle SAR	63
2.4	Cartographie des résidus du modèle SAR	67
2.5	Effets marginaux dans un modèle SDM	71
2.6	Effets marginaux dans un modèle SDEM	75
2.7	Démarche pour choisir entre les modèles MCO, SAR et SEM	84
2.8	Démarche à partir du modèle généralisé (modèle Manski)	86
2.9	Comparaison des différents modèles	91
4.1	Fonctions kernel pour définir la matrice de pondération $W(i)$	101
4.2	Cartographie des valeurs de t : moins de 15 ans (%)	104
4.3	Variables indépendantes significatives du modèle GWR	105
4.4	Cartographie des résidus des modèles MCO et GWR	112
4.5	Cartographie des R carrés locaux de la GWR	115
4.6	Cartographie des coefficients de régression de la GWR	117
4.7	Cartographie des valeurs de t de la GWR	119
4.8	Nombre de variables significatives aux seuils de 5% et 1%	120
4.9	Variable indépendante la plus significative au seuil de 5 %	121
4.10	Exemple de cartographie avec les résultats de la GWR obtenus avec le <i>package</i> <code>GWmodel</code>	129
4.11	Corrélation de Pearson entre les coefficients de régression locaux de la GWR	132
6.1	Exemple de spline	141

Liste des figures

6.2	Exemple d'un jeu de données fictif avec une forte dépendance spatiale	143
6.3	Représentation des bases d'une spline bivariée	144
6.4	Captation de l'effet spatial par une spline bivariée	145
6.5	Cadre théorique de l'exposition des cyclistes	147
6.6	Distributions du ratio et du log ratio entre les parts modales TC et automobile	150
6.7	Distribution géographique de la variable dépendante	151
6.8	Résidus du simple GLM avec une distribution normale	153
6.9	Résidus du GLM avec une distribution de Student	154
6.10	Cartographie des résidus du modèle GLM	156
6.11	Résidus du modèle GAM avec une spline bivariée sur les coordonnées géographiques	157
6.12	Cartographie des résidus du modèle GAM avec une spline bivariée sur les coordonnées géographiques	158
6.13	Représentation de l'impact de la spline spatiale bivariée	162
6.14	Critères de sélection de k	164
6.15	Comparaison de la spline bivariée et du MRF	167
7.1	Autocorrélation des vecteurs propres issus d'une matrice de contiguïté (Queen) sur les secteurs de recensement de la RMR de Montréal	173
7.2	Représentation de quatre vecteurs propres issue d'une matrice spatiale (Queen) sur les secteurs de recensement de la RMR de Montréal	174
7.3	Résidus simulés du modèle SEVM par sélection	180
7.4	Résidus simulé du modèle SEVM avec distribution de Student par sélection pas à pas	184
7.5	Résidus du modèle RE-SEVM	186
7.6	Résidus du modèle LASSO-SEVM	188
7.7	Comparaison des termes spatiaux des trois modèles SEVM	192

Listes des tableaux

1.1	Statistiques descriptives du jeu de données LyonIris	11
1.2	Statistiques descriptives du jeu de données sur Montréal	11
1.2	Statistiques descriptives du jeu de données sur Montréal	12
1.3	Matrices de pondération spatiale selon la géométrie	12
1.4	Standardisation de matrices de pondération spatiale	22
1.5	Résultats du I de Moran selon les différentes matrices	42
2.1	Synthèse des différentes modèles d'économétrie spatiale	55
2.2	Résultats des coefficients autorégressifs du modèle généralisés	87
4.1	Résultats du modèle global (régression linéaire multiple)	102
4.2	Analyse de variance entre les modèles global et GWR	103
6.1	Résultats du modèle GLM avec une spline bivariée sur les coordonnées géographiques	160
6.2	Résultats du modèle GLM avec spatiale de type RMK	166
7.1	Vecteurs propres retenus	182
7.1	Vecteurs propres retenus	183
7.2	Comparaison des trois modèles SEV	189

Préface

Résumé : Ce livre vise à décrire une panoplie de méthodes de régression spatiale avec le logiciel ouvert R. La philosophie de ce livre est de donner toutes les clefs de compréhension et de mise en œuvre des méthodes abordées dans R. La présentation des méthodes est basée sur une approche compréhensive et intuitive plutôt que mathématique, sans pour autant négliger la rigueur statistique.

Remerciements : Ce manuel a été réalisé avec le soutien de la fabriqueREL. Fondée en 2019, la fabriqueREL est portée par divers établissements d'enseignement supérieur du Québec et agit en collaboration avec les services de soutien pédagogique et les bibliothèques. Son but est de faire des ressources éducatives libres (REL) le matériel privilégié en enseignement supérieur au Québec.

Maquette de la page couverture et identité graphique du livre : Andrés Henao Florez.

Mise en page : Philippe Apparicio et Marie-Hélène Gadbois Del Carpio.

Révision linguistique : Denise Latreille.

© Philippe Apparicio, Jean Dubé, Jérémy Gelb et Joan Carles Martori.

Pour citer cet ouvrage : Apparicio P., J. Dubé, J. Gelb et J. C. Martori (2024). *Méthodes de régression spatiale : un grand bol d'R*. Université Laval et Université de Sherbrooke. fabriqueREL. Licence CC BY-SA.



Sauf indications contraires, le contenu de ce manuel électronique est disponible en vertu des termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International](#).

Vous êtes autorisé-e à :

Partager – copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.

Adapter – remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale.

Selon les conditions suivantes :

Paternité – Vous devez citer le nom des auteurs originaux.

Mêmes conditions – Si vous remixez, transformez, ou créez à partir du matériel composant l'Œuvre originale, vous devez diffuser l'Œuvre modifiée avec la même licence.



Université de
Sherbrooke



fabriqueREL
RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES

Un manuel sous la forme d'une ressource éducative libre

Pourquoi un manuel sous licence libre?

Les logiciels libres sont aujourd'hui très répandus. Comparativement aux logiciels propriétaires, l'accès au code source permet à quiconque de l'utiliser, de le modifier, de le dupliquer et de le partager. Le logiciel R, dans lequel sont mises en œuvre les méthodes de régression spatiale décrites dans ce livre, est d'ailleurs à la fois un langage de programmation et un logiciel libre (sous la licence publique générale [GNU GPL2](#)). Par analogie aux logiciels libres, il existe aussi des **ressources éducatives libres (REL)** « dont la licence accorde les permissions désignées par les 5R (**R**etenir – **R**éutiliser – **R**éviser – **R**emixer – **R**edistribuer) et donc permet nécessairement la modification » ([fabriqueREL](#)). La licence de ce livre, CC BY-SA (figure 1), permet donc de :

- **Retenir**, c'est-à-dire télécharger et imprimer gratuitement le livre. Notez qu'il aurait été plutôt surprenant d'écrire un livre payant sur un logiciel libre et donc gratuit. Aussi, nous aurions été très embarrassés que des personnes étudiantes avec des ressources financières limitées doivent payer pour avoir accès au livre, sans pour autant savoir préalablement si le contenu est réellement adapté à leurs besoins.
- **Réutiliser**, c'est-à-dire utiliser la totalité ou une section du livre sans limitation et sans compensation financière. Cela permet ainsi à d'autres personnes enseignantes de l'utiliser dans le cadre d'activités pédagogiques.
- **Réviser**, c'est-à-dire modifier, adapter et traduire le contenu en fonction d'un besoin pédagogique précis puisqu'aucun manuel n'est parfait, tant s'en faut! Le livre a d'ailleurs été écrit intégralement dans R avec [Quarto](#). Quiconque peut ainsi télécharger gratuitement le code source du livre sur [github](#) et le modifier à sa guise (voir l'encadré intitulé *Suggestions d'adaptation du manuel*).
- **Remixer**, c'est-à-dire « combiner la ressource avec d'autres ressources dont la licence le permet aussi pour créer une nouvelle ressource intégrée » ([fabriqueREL](#)).
- **Redistribuer**, c'est-à-dire distribuer, en totalité ou en partie le manuel ou une version révisée sur d'autres canaux que le site Web du livre (par exemple, sur le site Moodle de votre université ou en faire une version imprimée).

La licence de ce livre, CC BY-SA (figure 1), oblige donc à :

- Attribuer la paternité de l'auteur dans vos versions dérivées, ainsi qu'une mention concernant les grandes modifications apportées, en utilisant la formulation suivante : Apparicio Philippe et Jérémy Gelb (2024). *Méthodes d'analyses spatiales : un grand bol d'R*. Université de Sherbrooke. [fabriqueREL](#). Licence CC BY-SA.
- Utiliser la même licence ou une licence similaire à toutes versions dérivées.




Figure 1: Licence Creative Commons du livre

💡 Astuce

Suggestions d'adaptation du manuel

Pour chaque méthode d'analyse spatiale abordée dans le livre, une description détaillée et une mise en œuvre dans R sont disponibles. Par conséquent, plusieurs adaptations du manuel sont possibles :

- Conserver uniquement les chapitres sur les méthodes ciblées dans votre cours.
- En faire une version imprimée et la distribuer aux personnes étudiantes.
- Modifier la description d'une ou de plusieurs méthodes en effectuant les mises à jour directement dans les chapitres.
- Insérer ses propres jeux de données dans les sections intitulées *Mise en œuvre dans R*.
- Modifier les tableaux et figures.
- Ajouter une série d'exercices.
- Modifier les quiz de révision.
- Rédiger un nouveau chapitre.
- Modifier des syntaxes R. Plusieurs *packages* R peuvent être utilisés pour mettre en œuvre telle ou telle méthode. Ces derniers évoluent aussi très vite et de nouveaux *packages* sont proposés fréquemment! Par conséquent, il peut être judicieux de modifier une syntaxe R du livre en fonction de ses habitudes de programmation dans R (utilisation d'autres *packages* que ceux utilisés dans le manuel par exemple) ou de bien mettre à jour une syntaxe à la suite de la parution d'un nouveau *package* plus performant ou intéressant.
- Toute autre adaptation qui permet de répondre au mieux à un besoin pédagogique.

Comment lire ce manuel?

Le livre comprend plusieurs types de blocs de texte qui en facilitent la lecture.

Package

Bloc *packages*

Habituellement localisé au début d'un chapitre, il comprend la liste des *packages* R utilisés pour un chapitre.

Objectif

Bloc objectif

Il comprend une description des objectifs d'un chapitre ou d'une section.

Note

Bloc notes

Il comprend une information secondaire sur une notion, une idée abordée dans une section.

Aller plus loin

Bloc pour aller plus loin

Il comprend des références ou des extensions d'une méthode abordée dans une section.

Astuce

Bloc astuce

Il décrit un élément qui vous facilitera la vie : une propriété statistique, un *package*, une fonction, une syntaxe R.

Attention

Bloc attention

Il comprend une notion ou un élément important à bien maîtriser.

Exercice

Bloc exercice

Il comprend un court exercice de révision à la fin de chaque chapitre.

Comment utiliser les données du livre pour reproduire les exemples?

Ce livre comprend des exemples détaillés et appliqués dans R pour chacune des méthodes abordées. Ces exemples se basent sur des jeux de données structurés et mis à disposition avec le livre. Ils sont disponibles sur le *repo github* dans le sous-dossier *data*, à l'adresse <https://github.com/SerieBoldR/RegressionsSpatiales/tree/main/data>.

Une autre option est de télécharger le *repo* complet du livre directement sur *github* (<https://github.com/SerieBoldR/RegressionsSpatiales>) en cliquant sur le bouton Code, puis le bouton Download ZIP (figure 2). Les données se trouvent

alors dans le sous-dossier nommé **data**.




Figure 2: Téléchargement de l'intégralité du livre

Liste des packages utilisés

Dans ce livre, nous utilisons de nombreux *packages* R que vous pouvez installer avec le code ci-dessous.

```
# Liste des packages
ListePackages <- c("adespatial", "car", "corrplot", "DHARMA", "dplyr",
                  "future", "future.apply", "GGally", "ggplot2", "ggpubr",
                  "GWmodel", "mcgv", "mgcViz", "mgwrsar", "plm",
                  "RColorBrewer", "sf", "spatialreg", "spdep", "spgwr",
                  "splm", "spmoran", "tmap")
# Packages non installés dans la liste
PackagesNonInstalles <- ListePackages[!(ListePackages %in% installed.packages()[,"Package"])]
# Installation des packages manquants
if(length(new.packages)) install.packages(PackagesNonInstalles)
```

Bref historique sur les modèles de régressions spatiales en économie et en géographie

Depuis une cinquantaine d'années, les économistes et les géographes conçoivent et utilisent largement des méthodes de régression prenant en compte la dimension spatiale : modèles d'économétrie spatiale, régressions géographiquement pondérées, modèles généralisés additifs intégrant une dimension spatiale, modèles avec des vecteurs propres spatiaux, etc.

La notion d'autocorrélation spatiale, étroitement liée aux régressions spatiales, remonte à une période encore plus ancienne. Elle a été introduite notamment par les travaux de Patrick Moran, d'abord en 1948 puis en 1950, suivis par ceux de

Robert Geary en 1954 et de Nathan Mantel en 1967 (Moran 1948; Moran 1950; Geary 1954; Mantel 1967). La formalisation des relations spatiales trouve son origine, plus précisément, dans la première loi de la géographie énoncée par Waldo Tobler en 1970 qui stipule que « tout interagit avec tout, mais les objets proches ont plus de chance de le faire que les objets éloignés [*Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things*] » (1970).

En économie, le terme « économétrie spatiale » a été utilisé pour la première fois par Jean Paelinck (1978) à la fin des années 1970. Cependant, il est resté relativement peu exploité jusqu’aux travaux de Luc Anselin, qui publie en 1988 un ouvrage de référence sur le sujet intitulé *Spatial econometrics: methods and models* (Anselin 1988). Il faut néanmoins attendre le développement des outils informatiques avant de voir les applications affluées. Ainsi, au début des années 1990, l’économétrie spatiale a véritablement pris son essor (voir Anselin (2010) pour un historique détaillé). Depuis, ce domaine a gagné en importance, s’établissant presque comme un incontournable pour la prise en compte des effets spatiaux, mais aussi, et surtout, des fameux efforts de débordements (nous y reviendrons). Ces dernières décennies, plusieurs ouvrages traitant des modèles économétriques spatiaux ont été publiés, principalement en anglais (Anselin et Florax 1995; Anselin, Florax et Rey 2013; LeSage et Pace 2009; Bivand et al. 2008; Anselin et Rey 2014). Ils méritent grandement d’être consultés, surtout celui de LeSage et Pace (2009). Peu de références sont disponibles en français. Le livre de référence de Dubé et Legros (2014) constitue vraisemblablement une référence intéressante, notamment par la présentation vulgarisée des modèles et des concepts.

En géographie, Daniel Griffith est certainement l’un des géographes les plus actifs dans le domaine des régressions spatiales, y allant de plusieurs propositions dans le but de contrôler pour la présence d’autocorrélation spatiale résiduelle. Ses premiers travaux remontent aux années 1980, et il a publié depuis un grand nombre d’ouvrages (notamment, Daniel A. Griffith 1988; Daniel A. Griffith 2003; Daniel A. Griffith, Chun et Li 2019). Puis, dans les années 1990, trois géographes – Stewart Fotheringham, Chris Brunsdon et Martin Charlton – ont introduit la régression géographiquement pondérée, une méthode permettant d’analyser localement les relations entre la variable dépendante et les variables indépendantes d’un modèle de régression (Fotheringham, Charlton et Brunsdon 1996; Brunsdon, Fotheringham et Charlton 1996; Brunsdon, Fotheringham et Charlton 1998). En 2003, la parution de leur ouvrage intitulé *Geographically weighted regression: the analysis of spatially varying relationships* (Fotheringham, Brunsdon et Charlton 2003) a largement contribué à la popularisation de cette méthode.

Structure du livre

Depuis une cinquantaine d’années, les économètres, les épidémiologistes et les géographes conçoivent et utilisent largement des méthodes de régression prenant en compte la dimension spatiale, dont les principales sont présentées dans ce manuel. Ce dernier est structuré en cinq grandes sections.

Partie 1. Notions de base. Dans cette première partie, nous présentons les jeux de données utilisées pour mettre en œuvre les différentes méthodes de régression spatiale présentées dans le livre (chapitre 1). Nous discutons aussi de plusieurs notions fondamentales et méthodes qu’il importe de bien maîtriser avant d’aborder les chapitres suivants consacrés aux méthodes de régression spatiale, notamment : l’autocorrélation spatiale (globale et locale), la notion de variable spatialement décalée et la régression linéaire multiple. Nous concluons ce chapitre en exposant les raisons qui justifient l’utilisation de différentes formes de régressions spatiales pour modéliser des données spatiales ou spatiotemporelles. chapitre 2

Partie 2. Modèles d’économétrie spatiale. Cette seconde partie est consacrée aux modèles d’économétrie spatiale qui vise à modéliser la **dépendance spatiale**. Dans le chapitre 2, nous décrivons ainsi les principaux modèles spatiaux autorégressifs qui permettent d’introduire l’autocorrélation spatiale sur les variables indépendantes (modèle SLX), la variable dépendante (SAR), sur le terme d’erreur (SEM), à la fois sur la variable dépendante et les variables indépendantes

(SDM) ou à la fois sur les variables indépendantes et sur le terme d'erreur (SDEM). Dans le chapitre 3, nous abordons une extension des modèles autorégressifs, soit les modèles spatiaux par panel qui permettent de modéliser des données spatiales longitudinales.

Partie 3. Régressions géographiquement pondérées. Dans cette partie, nous abordons les régressions géographiquement pondérées (GWR) qui permettent de modéliser l'**hétérogénéité spatiale**, soit l'instabilité des relations entre la variable dépendante et celles indépendantes. Premièrement, nous décrivons les formes dites classiques de la GWR qui s'appliquent à des variables dépendantes continues, dichotomiques (logistique) et de comptage (Poisson) (chapitre 4). Deuxièmement, nous abordons des extensions de la GWR, particulièrement la GWR mixte, la GWR multiéchelle et les GWR mixtes avec des variables spatialement décalées (MGWR-SAR) (chapitre 5).

Partie 4. Autres modèles de régressions spatiales. Cette quatrième et dernière partie comprend deux chapitres. Le chapitre 6 est consacré aux modèles généralisés additifs qui permettent d'introduire l'espace deux manières différentes : les modèles GAM avec une *spline* bivariée avec les coordonnées géographiques (x, y) pour capturer les variations continues dans l'espace; les modèles GAM avec un lissage par champ aléatoire de Markov (*random markov field* – RMF) pour modéliser la dépendance spatiale entre les unités spatiales voisines. Dans le chapitre 7, nous abordons les modèles linéaires généralisés avec des vecteurs spatiaux proposés par Daniel Griffith (2003; Daniel A. Griffith, Chun et Li 2019).

Remerciements

De nombreuses personnes ont contribué à l'élaboration de ce manuel.

Ce projet a bénéficié du soutien pédagogique et financier de la **fabriqueREL** (ressources éducatives libres). Les différentes rencontres avec le comité de suivi nous ont permis de comprendre l'univers des ressources éducatives libres (REL) et notamment leurs **fameux 5R** (Retenir — Réutiliser — Réviser — Remixer — Redistribuer), de mieux définir le besoin pédagogique visé par ce manuel, d'identifier des ressources pédagogiques et des outils pertinents pour son élaboration. Ainsi, nous remercions chaleureusement les membres de la **fabriqueREL** pour leur soutien inconditionnel :

- Marianne Demers-Desmarais, bibliothécaire, Université Laval.
- Julie-Christine Gagné, conseillère en pédagogie universitaire, Université Laval.
- Claude Potvin, conseiller pédagogique à la fabriqueREL, Université Laval.
- Nadia Villeuneuve, bibliothécaire, Université Laval.

À MODIFIER PLUS TARD. Nous remercions aussi les membres du comité de révision pour leurs commentaires et suggestions très constructifs. Ce comité est composé de quatre personnes étudiantes du **Département de géomatique appliquée** de l'**Université de Sherbrooke** :

- Gaël Machemin et Loek Pascaud, étudiants à la **maîtrise en géomatique appliquée et télédétection (type recherche)**.
- Rosemarie Légaré, étudiante à la **maîtrise en géomatique appliquée et télédétection**.
- Marie-Hélène Gadbois Del Carpio, étudiante à la **maîtrise en géomatique appliquée et télédétection** a participé activement à la mise en page du manuel; elle est désormais une grande spécialiste des feuilles de style en cascade (CSS) et de Quarto.

Finalement, nous remercions Denise Latreille, réviseuse linguistique et chargée de cours à l'Université Sherbrooke, pour la révision du manuel.

À propos des auteurs

Philippe Apparicio est professeur titulaire au Département de géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Il y enseigne aux programmes de 1^{er} et 2^e cycles de géomatique les cours *Transport et mobilité durable*, *Modélisation et analyse spatiale* et *Géomatique appliquée à la gestion urbaine*. Géographe de formation, ses intérêts de recherche incluent la justice et l'équité environnementale, la mobilité durable, les pollutions atmosphérique et sonore, et le vélo en ville. Il a publié une centaine d'articles scientifiques dans différents domaines des études urbaines et de la géographie mobilisant la géomatique et l'analyse spatiale.

Jean Dubé est professeur titulaire à l'École Supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD) de l'Université Laval. Économiste de formation, ses intérêts de recherche portent notamment sur l'évaluation d'impact des politiques publiques liées à l'aménagement et au développement. Ses recherches portent sur la mesure des externalités urbaines par le marché immobilier, les décisions de localisation des entreprises et des ménages et les déterminants de la croissance urbaine et régionale. Il est aussi rédacteur de la *Revue canadienne des sciences régionales* (RCSR).

Jérémy Gelb a obtenu un doctorat en études urbaines à l'INRS en 2022 (*L'exposition des cyclistes aux pollutions atmosphérique et sonore en milieu urbain : comparaison empirique de plusieurs villes à travers le monde*), sous la supervision de Philippe Apparicio. Il utilise quotidiennement les systèmes d'information géographique (SIG) et des méthodes d'analyses spatiales. Il est tombé dans la marmite de l'*open source* avec le triptyque QGIS, R et Python au début de sa maîtrise. Il a développé deux *packages* : *geomeans* et *spNetwork*, permettant respectivement d'effectuer des analyses de classification floue non supervisée pondérée spatialement et des estimations de densité par kernel sur réseau. Il travaille actuellement comme conseiller en science des données à l'Autorité régionale de transport métropolitain qui gère la planification du transport collectif dans la région de Montréal. Ces travaux portent sur la qualité des milieux urbains, l'accessibilité spatiale, le transport, l'équité environnementale, les SIG et l'analyse spatiale.

Joan Carles Martori est professeur d'économie appliquée au département d'économie et de commerce de l'Université de Vic - Université centrale de la Catalogne (Barcelone, Espagne). Il enseigne les statistiques appliquées et l'économétrie dans des cours de premier et de deuxième cycle. Il est le chercheur principal du groupe *Data Analysis and Modelling*. Économiste de formation, ses recherches portent sur la ségrégation résidentielle, les inégalités et l'équité environnementale à l'aide des statistiques spatiales et de techniques économétriques. Il a contribué au développement du *package* R *AQuadtree* sur la confidentialité des données spatiales ponctuelles. En tant que statisticien appliqué, il collabore avec d'autres disciplines telles que l'éducation et la santé.

Partie 1. Notions de base

1 Autocorrélation spatiale, dépendance spatiale et hétérogénéité spatiale d'un modèle de régression

Avant d'explorer les différents types de régressions spatiales dans les chapitres suivants, il est primordial de comprendre plusieurs notions clés, comme l'autocorrélation spatiale, la dépendance spatiale et l'hétérogénéité spatiale. Aussi, de nombreuses méthodes de régression spatiale s'appuient sur l'utilisation de matrices de pondération spatiale. Nous proposons également un bref rappel sur la régression linéaire multiple.

🎯 Objectif

Objectifs d'apprentissage visés dans ce chapitre

À la fin de ce chapitre, vous devriez être en mesure de :

- Connaître les principales matrices de pondérations spatiales.
- Maîtriser les notions d'autocorrélation spatiale, de dépendance spatiale et d'hétérogénéité spatiale.
- Comprendre la notion de variable spatialement décalée.
- Calculer une mesure d'autocorrélation spatiale globale (I de Moran) dans R.
- Évaluer la dépendance spatiale d'un modèle de régression multiple en calculant le I de Moran sur ses résidus.

📦 Package

Liste des *packages* utilisés dans ce chapitre

- Pour importer et manipuler des fichiers géographiques :
 - `sf` pour importer et manipuler des données vectorielles.
- Pour cartographier des données :
 - `ggplot2` et `ggpubr` pour construire des graphiques.
 - `tmap` pour construire des cartes thématiques.
 - `RColorBrewer` pour construire une palette de couleur.
- Pour les mesures d'autocorrélation spatiale : - `spdep` pour construire des matrices de pondération spatiales et calculer le I de Moran.

1.1 Description des jeux de données utilisés dans le manuel

Plusieurs jeux de données sont utilisés dans ce livre et sont déjà structurés et disponibles au format `.Rdata`.

⚠ Attention**Manipulation, structuration et cartographie de données spatiales**

Ce livre n'a pas pour objectif de traiter la phase préparatoire consistant à structurer les données spatiales dans R avant l'application de modèles de régression spatiale. Nous partons du principe que les lectrices et lecteurs maîtrisent déjà l'utilisation des *packages* `sf` et `tmap` pour manipuler, structurer et cartographier des données spatiales. Si ce n'est pas le cas, nous vous encourageons à consulter le chapitre intitulé *Manipulation des données spatiales dans R* (Apparicio et Gelb 2024).

1.1.1 Jeu de données sur l'agglomération de Lyon

Premièrement, nous utiliserons le jeu de données spatiales `LyonIris` du *package* `geocmeans`. Ce jeu de données spatiales pour l'agglomération lyonnaise (France) comprend dix variables, dont quatre environnementales (EN) et six socioéconomiques (SE), pour les îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS) de l'agglomération lyonnaise (tableau 1.1 et figure 1.1).

Tableau 1.1: Statistiques descriptives du jeu de données LyonIris

Nom	Intitulé	Type	Moy.	E.-T.	Min.	Max.
Lden	Bruit routier (Lden dB(A))	EN	55,6	4,9	33,9	71,7
NO2	Dioxyde d'azote (ug/m ³)	EN	28,7	7,9	12,0	60,2
PM25	Particules fines (PM _{2,5})	EN	16,8	2,1	11,3	21,9
VegHautPrt	Canopée (%)	EN	18,7	10,1	1,7	53,8
Pct0_14	Moins de 15 ans (%)	SE	18,5	5,7	0,0	54,0
Pct_65	65 ans et plus (%)	SE	16,2	5,9	0,0	45,1
Pct_Img	Immigrants (%)	SE	14,5	9,1	0,0	59,8
TxChom1564	Taux de chômage	SE	14,8	8,1	0,0	98,8
Pct_brevet	Personnes à faible scolarité (%)	SE	23,5	12,6	0,0	100,0
NivVieMed	Médiane du niveau de vie (milliers d'euros)	SE	21,8	4,9	11,3	38,7

1.1.2 Jeu de données sur la région métropolitaine de Montréal

Deuxièmement, nous utiliserons un jeu de données spatiales sur les parts modales dans la région de Montréal extraites du recensement de 2021 de Statistique Canada pour la région métropolitaine de Montréal (tableau 1.2). En guise d'exemple, les proportions des navetteurs utilisant respectivement le transport en commun et l'automobile par secteur de recensement sont présentées à la figure 1.2.

Tableau 1.2: Statistiques descriptives du jeu de données sur Montréal

Nom	Intitulé	Moy.	E.-T.
prt_monoparental	Proportion de familles monoparentales	0,2	0,1
prt_minorite_vis	Proportion de minorités visibles	0,3	0,2
prt_chomage	Proportion de chômeurs	0,1	0,0
prt_personnes_faibles_revenu	Proportion de personnes à faible revenu	7,9	6,3

Tableau 1.2: Statistiques descriptives du jeu de données sur Montréal

Nom	Intitulé	Moy.	E.-T.
revenu_median	Revenu médian à faible revenu	40,2	9,5
densite_population_km2	Habitants au km2	5 758,2	5 429,8
mode_tc	Transports en commun (effectifs)	242,7	197,8
mode_auto	Automobile (effectifs)	1 200,3	811,9
mode_pieton	Marche (effectifs)	90,6	70,7
mode_velo	Vélo (effectifs)	28,0	34,2
total_commuters	Total navetteurs (effectifs)	1 588,4	803,5
acs_idx_emp_velo	Accessibilité aux emplois en heure de pointe à vélo	0,2	0,2
acs_idx_emp_tc_peak	Accessibilité aux emplois en heure de pointe en transport collectif	0,2	0,2
acs_idx_emp_pieton	Accessibilité aux emplois en heure de pointe à la marche	0,1	0,1
prt_tc	Proportion de navetteurs en transport en commun	0,2	0,1
prt_auto	Proportion de navetteurs en auto	0,7	0,2
prt_actif	Proportion de navetteurs en transport actif (vélo et marche)	0,1	0,1

1.1.3 Jeu de données sur Barcelone

1.1.4 Jeu de données sur la région métropolitaine de Montréal

1.1.5 Jeu de données sur la densité pour six villes espagnoles

1.1.6 Jeu de données sur la densité pour six régions métropolitaines espagnoles

1.2 Matrices des pondérations spatiales

🎯 Objectif

Utilité des matrices de pondérations spatiales

Ces matrices permettent de définir les relations spatiales entre les entités spatiales d'une couche géographique, et plus spécifiquement la manière de mesurer leur relation d'adjacence (voisinage) ou de proximité (distance). Nous verrons qu'elles sont largement utilisées dans les régressions spatiales, notamment dans les modèles d'économétrie spatiale abordées dans la seconde partie du livre. Elles sont aussi nécessaires au calcul des mesures d'autocorrélation globales ou locales section 1.4.2 et à la construction des variables spatialement décalées section 1.3.

Il existe huit principales matrices de pondération spatiale regroupées en deux grandes catégories : celles de contiguïté (basées sur l'adjacence) et celles de proximité (basées sur la distance) (tableau 1.3). Lorsque la couche géographique est composée de points, seules les matrices de proximité peuvent être utilisées.

Tableau 1.3: Matrices de pondération spatiale selon la géométrie

Matrice	Points	Lignes	Polyg.	Raster
Matrices de contiguïté (basées sur l'adjacence)				
Partage d'un nœud (Queen)		X	X	X
Partage d'un segment (Rook)		X	X	X
Partage d'un nœud et ordre d'adjacence (Queen)		X	X	X
Partage d'un segment et ordre d'adjacence (Rook)		X	X	X
Matrices de proximité (basées sur la distance)				
Connectivité selon la distance	X	X	X	X
Inverse de la distance	X	X	X	X
Inverse de la distance au carré	X	X	X	X
Nombre de plus proches voisins	X	X	X	X

1.2.1 Matrices de contiguïté

La relation d'adjacence (de contiguïté) vise à déterminer si deux entités spatiales sont ou non voisines selon le partage soit d'un nœud, soit d'un segment (frontière commune). La contiguïté est liée à la notion de topologie qui prend en compte les relations de voisinage entre des entités spatiales, sans tenir compte de leurs tailles et de leurs formes géométriques. Elle peut être représentée à partir d'une **matrice de contiguïté** (avec une valeur de 1 quand deux entités sont voisines et de 0 pour une situation inverse) ou d'un **graphe** (formé de points représentant les entités spatiales et de lignes reliant les entités voisines) (figure 1.3).

Trois évaluations de la contiguïté sont représentées à la figure 1.4 :

- **Adjacence selon le partage d'un segment**, soit d'une frontière commune entre les polygones (A).
- **Adjacence selon le partage d'un nœud** (B).
- **Ordre d'adjacence selon le partage d'un segment** (C). L'ordre d'adjacence indique le nombre de frontières à traverser pour se rendre à l'entité spatiale contiguë, soit :
 - **Ordre 1** : une frontière à traverser pour se rendre dans l'entité spatiale adjacente.
 - **Ordre 2** : deux frontières à traverser pour atteindre les entités de la deuxième couronne.
 - **Ordre 3** : trois frontières à traverser pour atteindre les entités de la troisième couronne.
 - Etc.

Bien entendu, les ordres d'adjacence peuvent être également définis selon le partage d'un nœud commun.

Habituellement appelée W , la matrice de contiguïté est binaire selon le partage tant d'un nœud (*Queen* en anglais) (équation 1.1) que d'un segment commun (*Rook* en anglais) (équation 1.2).

$$w_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si les entités spatiales } i \text{ et } j \text{ ont au moins un nœud commun; } i \neq j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.1)$$

$$w_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si les entités spatiales } i \text{ et } j \text{ partagent une frontière commune; } i \neq j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.2)$$




Figure 1.1: Cartographie des variables du jeu de données LyonIris




Figure 1.2: Parts modales de transport en commun et de l'automobile (proportion)

1.2.2 Matrices de proximité

Pour construire une matrice de pondération spatiale selon la proximité, nous pouvons utiliser plusieurs types de distance (Apparicio et al. 2017) : certaines sont cartésiennes, d'autres, dites réticulaires, sont calculées à partir d'un réseau de rues (figure 1.5).

Les distances cartésiennes – euclidienne et de Manhattan (équation 1.3 et équation 1.4) – sont facilement calculables à partir des coordonnées géographiques (x, y) lorsque la couche géographique est dans un système de projection plane (figure 1.5, a). Si la projection de la couche est sphérique (longitude/latitude), il convient d'utiliser la formule de haversine (basée sur la trigonométrie sphérique) pour obtenir la distance à vol d'oiseau (équation 1.5).

Par contre, comme leurs noms l'indiquent, le calcul des distances réticulaires (figure 1.5, b) nécessite d'avoir un réseau de rues dans un système d'information géographique (par exemple, l'extension *Network Analyst* d'ArcGIS Pro) ou dans R (notamment avec le *package* R5R) pour calculer le chemin le plus rapide (voir le chapitre intitulé *Mesures d'accessibilité spatiale selon différents modes de transport* (Apparicio et Gelb 2024)).

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \quad (1.3)$$

$$d_{ij} = |x_i - x_j| + |y_i - y_j| \quad (1.4)$$

$$d_{ij} = 2R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\delta_i - \delta_j}{2} \right) + \cos \delta_i \cdot \cos \delta_j \cdot \sin^2 \left(\frac{\phi_i - \phi_j}{2} \right)} \right) \quad (1.5)$$

avec R étant le rayon de la terre; δ_i et δ_j les coordonnées de longitude pour les points i et j ; ϕ_i et ϕ_j les coordonnées de latitude pour les points i et j .

Les deux couches géographiques sont différentes, mais la position de leurs entités spatiales respectives est identique : les deux couches partagent ainsi la même topologie.




Figure 1.3: Relation topologique entre des entités spatiales polygonales





Figure 1.4: Relations de voisinage et évaluation de la contiguïté

(a) Distances cartésiennes



(b) Distances sur un réseau de rues



Figurée adaptée de Apparicio et al. (2017).

Figure 1.5: Les différents types de distance

1.2.2.1 Matrice de distance binaire (de connectivité)

À partir d'une matrice de distance entre les entités spatiales d'une couche géographique, il est possible de créer une matrice de pondération binaire (équation 1.6). Ce type de matrice est habituellement appelée **matrice de connectivité**. Il convient alors de fixer un seuil de distance maximal. Par exemple, avec un seuil de 500 mètres, $w_{ij} = 1$ si la distance entre les entités spatiales i et j est inférieure ou égale à 500 mètres; sinon $w_{ij} = 0$. Notez que pour des lignes et des polygones, la distance est habituellement calculée à partir de leurs centroïdes.

$$w_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } d_{ij} \leq \bar{d}; i \neq j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.6)$$

avec d_{ij} étant la distance entre les entités spatiales i et j , et $\bar{d}$ étant un seuil de distance maximal fixé par la personne utilisatrice (par exemple, 500 mètres).

En guise d'exemple, à la figure 1.6, seuls les polygones jaunes seraient considérés comme voisins du polygone bleu avec un seuil de distance maximal fixé à 2,5 kilomètres (valeur de 1); les roses se verraient affecter la valeur de 0.




Figure 1.6: Illustration de la connectivité basée sur la distance

1.2.2.2 Matrices basées sur la distance

Une fois les distances calculées entre les entités spatiales, les pondérations peuvent être calculées avec l'inverse de la distance ($1/d_{ij}$) ou l'inverse de la distance au carré ($1/d_{ij}^2$) (équation 1.7).

$$w_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{d_{ij}^\gamma} \\ 0 \end{cases} \quad \text{si } i = j \quad (1.7)$$

avec $\gamma = 1$ pour une matrice de l'inverse de la distance et $\gamma = 2$ pour l'inverse de la distance au carré.

Analysons le graphique à la figure 1.7. Premièrement, nous constatons que plus la distance est grande, plus la valeur de la pondération est faible et inversement. De la sorte, nous accordons un rôle plus important aux entités spatiales proches les unes des autres qu'à celles éloignées. Deuxièmement, les pondérations chutent beaucoup plus rapidement avec l'inverse de la distance au carré qu'avec l'inverse de la distance. Autrement dit, le recours à une matrice de pondération calculée avec l'inverse de la distance au carré a comme effet d'accorder un poids plus important aux entités géographiques très proches.




Figure 1.7: Comparaison des matrices inverse de la distance et inverse de la distance au carré

Notez que l'équation 1.7 peut être légèrement modifiée en introduisant un seuil maximal de la distance au-delà duquel les pondérations sont mises à 0 (équation 1.8). Autrement dit, cela permet de ne pas tenir compte des entités spatiales distantes à plus d'un seuil fixé par l'analyste, ce qui est particulièrement intéressant lorsque vous analysez un phénomène dont la diffusion (ou propagation) cesse au-delà d'une certaine distance.

$$w_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{d_{ij}^\gamma} & \text{si } d_{ij} \leq \bar{d} \\ 0 & \text{si } d_{ij} > \bar{d} \\ 0 & \text{si } i = j \end{cases} \quad (1.8)$$

1.2.2.3 Matrices selon le critère des plus proches voisins

Une autre façon très utilisée pour définir une matrice de proximité à partir d'une matrice de distance consiste à retenir uniquement les n plus proches voisins. La matrice est aussi binaire avec les valeurs de 1 si les observations sont parmi

les n plus proches de l'entité spatiale i et de 0 pour une situation inverse.

1.2.3 Standardisation des matrices de pondération spatiale en ligne

Il est recommandé de standardiser les matrices de pondération en ligne. La somme de la matrice de pondération sera alors égale au nombre d'entités spatiales de la couche géographique.

⚠ Attention

Quel est l'intérêt de la standardisation?

Nous verrons dans les sections suivantes que ces matrices sont utilisées pour évaluer le degré d'autocorrélation spatiale globale et locale. Or, il est fréquent de comparer les valeurs des mesures d'autocorrélation spatiale obtenues avec différentes matrices d'adjacence et de proximité (contiguïté selon le partage d'un nœud, d'une frontière commune; inverse de la distance, inverse de la distance au carré, etc.). Autrement dit, la standardisation des matrices de pondération spatiale permet de vérifier si le degré de (dis)ressemblance des entités spatiales en fonction d'une variable donnée est plus fort avec une matrice de contiguïté, d'inverse de la distance ou encore d'inverse de la distance au carré, etc.

Pour illustrer comment réaliser une standardisation, nous utilisons une couche géographique comprenant peu d'entités spatiales, soit celle des quatre arrondissements de la ville de Sherbrooke (figure 1.8).




Figure 1.8: Arrondissements de la ville de Sherbrooke

Au tableau 1.4, différentes matrices de contiguïté et de distance ont été calculées, puis standardisées. Voici comment interpréter les différentes sections du tableau :

- **Contiguïté selon le partage d'une frontière commune.** La valeur de 1 signale que deux arrondissements sont voisins, sinon la valeur est à 0. Tel qu'indiqué aux équation 1.1 et équation 1.2, un arrondissement ne peut être voisin de lui-même (ex.: valeur de 0 pour la cellule Bro. et Bro.). L'arrondissement de Brompton–Rock Forest–Saint-Élie–Deauville (Bro.) a deux voisins, soit ceux des Nations et de Fleurimont (Nat. et Fle.), comme indiqué par la valeur 2 dans la colonne total. Par contre, les arrondissements des Nations et de Fleurimont sont voisins de tous les autres (valeur de 3 dans la colonne total).
- **Standardisation de la matrice de contiguïté.** Il suffit de diviser chaque valeur de la matrice de contiguïté par la somme de la ligne correspondante. De la sorte, la somme de chaque ligne est égale à 1 et la somme de l'ensemble des valeurs de la matrice est égale au nombre d'entités spatiales (ici 4).
- **Distance (km).** Nous avons calculé la distance euclidienne en kilomètres entre les centroïdes des arrondissements.
- **Inverse de la distance.** Les valeurs sont obtenues avec la formule $1/d_{ij}$. Par exemple, entre Bro. et Nat., nous avons $1/7,9930 = 0,1251$.
- **Inverse de la distance au carré.** Les valeurs sont obtenues avec la formule $1/d_{ij}^2$. Par exemple, entre Bro. et Nat., nous avons $1/7,9930^2 = 0,0160$.
- **Standardisation de l'inverse de la distance.** Comme précédemment, il suffit de diviser chaque valeur de la matrice par la somme de la ligne correspondante. Par exemple, pour Bro. et Nat., nous avons $0,1251/0,3241 = 0,3860$. Remarquez que la somme des lignes est bien égale à 1.
- **Standardisation de l'inverse de la distance au carré.** Comme précédemment, il suffit de diviser chaque valeur de la matrice par la somme de la ligne correspondante. Par exemple, pour Bro. et Nat., nous avons $0,0160/0,0360 = 0,4440$. Remarquez que la somme des lignes est bien égale à 1.

Tableau 1.4: Standardisation de matrices de pondération spatiale

Arrondissement	Bro.	Nat.	Len.	Fle.	Somme (lignes)
Matrice de contiguïté selon le partage d'une frontière commune					
Bro.	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	2,0000
Nat.	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	3,0000
Len.	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	2,0000
Fle.	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	3,0000
Standardisation de la matrice de contiguïté					
Bro.	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	1,0000
Nat.	0,3330	0,0000	0,3330	0,3330	1,0000
Len.	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	1,0000
Fle.	0,3330	0,3330	0,3330	0,0000	1,0000
Distance (km)					
Bro.	0,0000	7,9930	18,9940	16,1140	
Nat.	7,9930	0,0000	11,1190	9,1650	
Len.	18,9940	11,1190	0,0000	9,2590	
Fle.	16,1140	9,1650	9,2590	0,0000	
Matrice selon l'inverse de la distance					
Bro.	0,0000	0,1251	0,0526	0,0621	0,2398
Nat.	0,1251	0,0000	0,0899	0,1091	0,3241

Len.	0,0526	0,0899	0,0000	0,1080	0,2505
Fle.	0,0621	0,1091	0,1080	0,0000	0,2792
Matrice selon l'inverse de la distance au carré					
Bro.	0,0000	0,0160	0,0030	0,0040	0,0230
Nat.	0,0160	0,0000	0,0080	0,0120	0,0360
Len.	0,0030	0,0080	0,0000	0,0120	0,0230
Fle.	0,0040	0,0120	0,0120	0,0000	0,0280
Standardisation de l'inverse de la distance					
Bro.	0,0000	0,5220	0,2190	0,2590	1,0000
Nat.	0,3860	0,0000	0,2770	0,3370	1,0000
Len.	0,2100	0,3590	0,0000	0,4310	1,0000
Fle.	0,2220	0,3910	0,3870	0,0000	1,0000
Standardisation de l'inverse de la distance au carré					
Bro.	0,0000	0,6960	0,1300	0,1740	1,0000
Nat.	0,4440	0,0000	0,2220	0,3330	1,0000
Len.	0,1300	0,3480	0,0000	0,5220	1,0000
Fle.	0,1430	0,4290	0,4290	0,0000	1,0000

1.2.4 Mise en œuvre dans R

⚠ Attention

Construction des matrices dans R avec le *packagespdep*.

Le package *spdep* dispose de différentes fonctions pour construire des matrices de contiguïté, de connectivité et de distance :

- `poly2nb` pour des matrices de contiguïté.
- `nblag` et `nblag_cumul` pour des matrices de contiguïté avec des ordres d'adjacence.
- `dnearneigh` pour des matrices de connectivité.
- `as.matrix(dist(coords))` et `mat2listw` pour des matrices de distance.
- `knn2nb` pour des matrices selon le critère des plus proches voisins.

1.2.4.1 Matrices de pondération spatiale selon la contiguïté

Pour créer des matrices de pondération spatiale selon la contiguïté, nous utilisons deux fonctions du *package spdep* :

- `poly2nb(Nom de l'objet sf, queen=TRUE)` crée une matrice de contiguïté sous la forme d'une classe `nb` (*A neighbours list with class nb*). Avec le paramètre `queen=TRUE`, la contiguïté est évaluée selon le partage d'un nœud; avec `queen=FALSE`, la contiguïté est évaluée selon le partage d'un segment (frontière). La matrice spatiale comprend une ligne par polygone avec les index de ceux qui sont adjacents. Par exemple, `Queen[[1]]` renvoie la liste des polygones voisins à la première entité spatiale, soit 24 36 44 73, c'est-à-dire quatre voisins.

- `nb2listw(objet nb, zero.policy=TRUE, style = "W")` crée une matrice de pondération spatiale à partir de n'importe quelle matrice spatiale (de contiguïté ou de distance). Le paramètre `style = "W"`, qui est par défaut, permet de standardiser la matrice en ligne. Par exemple, `W.Queen$weights[[1]]` renvoie les valeurs des pondérations pour la première entité spatiale, soit 0.25 0.25 0.25 0.25 (0,25 = 1 / 4 voisins). Pour obtenir une matrice non standardisée, vous devez écrire `style = "B"`, alors `W.Queen$weights[[1]]` renverra les valeurs de 1 1 1 1.

```
library(sf)      # pour importer des couches géographiques
library(spdep)  # pour construire les matrices de pondération
## Utilisation du jeu de données sur l'agglomération de Lyon
load("data/Lyon.Rdata")
## Matrice selon le partage d'un nœud (Queen)
# Création de la matrice spatiale
Queen <- poly2nb(LyonIris, queen=TRUE)
# Affichage de la première ligne de la matrice
Queen[[1]]
```

```
[1] 27 36 44 73
```

```
# Création de la matrice de pondération avec une standardisation en ligne
W.Queen <- nb2listw(Queen, zero.policy=TRUE, style = "W")
# Affichage de la première ligne des pondérations standardisée
W.Queen$weights[[1]]
```

```
[1] 0.25 0.25 0.25 0.25
```

```
cat("La somme de la première ligne de la matrice de pondération est égale à",
    sum(W.Queen$weights[[1]]))
```

La somme de la première ligne de la matrice de pondération est égale à 1

```
# Affichage de la première ligne des pondérations non standardisée
nb2listw(Queen, zero.policy=TRUE, style = "B")$weights[[1]]
```

```
[1] 1 1 1 1
```

```
## Matrice selon le partage d'un segment (Rook)
Rook <- poly2nb(LyonIris, queen=FALSE)
W.Rook <- nb2listw(Rook, zero.policy=TRUE, style = "W")
## Comparaison des deux matrices de contiguïté
# Résultat de la matrice de pondération (Queen)
summary(W.Queen)
```

Characteristics of weights list object:

Neighbour list object:

Number of regions: 506

Number of nonzero links: 2854

Percentage nonzero weights: 1.114687

Average number of links: 5.640316

Link number distribution:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	17
	13	50	84	108	103	70	41	22	7	5	1	1	1

13 least connected regions:

81 91 105 148 160 174 183 325 425 468 480 489 506 with 2 links

1 most connected region:

154 with 17 links

Weights style: W

Weights constants summary:

	n	nn	S0	S1	S2
W	506	256036	506	192.1431	2097.903

Résultat de la matrice de pondération (Rook)

`summary(W.Rook)`

Characteristics of weights list object:

Neighbour list object:

Number of regions: 506

Number of nonzero links: 2660

Percentage nonzero weights: 1.038916

Average number of links: 5.256917

Link number distribution:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
	14	60	104	126	97	58	24	13	6	2	1	1

14 least connected regions:

81 91 105 148 160 174 183 325 376 425 468 480 489 506 with 2 links

1 most connected region:

154 with 15 links

Weights style: W

Weights constants summary:

	n	nn	S0	S1	S2
W	506	256036	506	204.0416	2099.405

1.2.4.2 Matrices de pondération spatiale selon la contiguïté et un ordre d'adjacence

Le code ci-dessous génère les matrices de pondération spatiale standardisées en ligne selon les ordre d'adjacence de 1 à 3.

```
# Création des matrices d'ordre 1, 2 et 3
Queen1 <- poly2nb(LyonIris, queen=TRUE)
Queen2 <- nblag_cumul(nblag(Queen1, 2))
Queen3 <- nblag_cumul(nblag(Queen1, 3))
# Création des matrices de pondération spatiale standardisées en lignes
W.Queen1 <- nb2listw(Queen, zero.policy=TRUE, style = "W")
W.Queen2 <- nb2listw(Queen2, zero.policy=TRUE, style = "W")
W.Queen3 <- nb2listw(Queen3, zero.policy=TRUE, style = "W")
```

1.2.4.3 Matrice de connectivité (matrice distance binaire)

La fonction `dnearneigh(sf points, d1=, d2=)` crée une matrice de connectivité à partir d'une couche de points. Les paramètres `d1` et `d2` permettent de spécifier le rayon de recherche (ex. : avec `d1 = 0` et `d2 = 2500`, le seuil maximal de distance est de 2500 mètres). Si votre couche `sf` comprend des lignes ou des polygones, utilisez la fonction `st_centroid` ou `st_point_on_surface()` pour les convertir en points (section 1.2.2).

```
## Conversion des polygones en points avec st_centroid
IRIS.centroides <- st_centroid(LyonIris)
## Matrice binaire avec un seuil de 2500 mètres
Connect2500m <- dnearneigh(IRIS.centroides, d1 = 0, d2 = 2500)
## Matrice de pondération spatiale standardisée en ligne
W.Connect2500m <- nb2listw(Connect2500m, zero.policy=TRUE, style = "W")
```

1.2.4.4 Matrices de pondération spatiale selon l'inverse de la distance et l'inverse de la distance au carré

Le code ci-dessous, qui permet de les créer les matrices de l'inverse de la distance et de l'inverse de la distance au carré, comprend les étapes suivantes :

- Récupération des coordonnées géographiques des entités spatiales.
- Création de la matrice de distance euclidienne $n \times n$ (n étant le nombre d'entités spatiales de la couche).
- Calcul des matrices d'inverse de la distance et d'inverse de la distance au carré.
- Standardisation de ces deux matrices et transformation dans des objets `listw` avec la fonction `mat2listw`.

```
## Coordonnées des centroïdes des entités spatiales
coords <- st_coordinates(IRIS.centroides)
## Création de la matrice de distance
distances <- as.matrix(dist(coords, method = "euclidean"))
# S'assurer que la diagonale de la matrice est à 0
```

```
diag(distances) <- 0
## Matrices inverse de la distance et inverse de la distance au carré
InvDistances <- ifelse(distances!=0, 1/distances, distances)
InvDistances2 <- ifelse(distances!=0, 1/distances^2, distances)
## Matrices de pondération spatiale standardisées en ligne
W_InvDistances <- mat2listw(InvDistances, style="W")
W_InvDistances2 <- mat2listw(InvDistances2, style="W")
```

💡 Astuce

Intégration d'autres types de distance

À la section 1.2.2, nous avons vu que plusieurs types de distances peuvent être utilisés : cartésiennes (euclidienne et de Manhattan) et réticulaires (chemin le plus rapide à pied, à vélo, en automobile et en transport en commun). Pour construire une matrice de distance de Manhattan, vous devez changer la valeur du paramètre `method` de la fonction `dist` comme suit : `as.matrix(dist(coords, method = "manhattan"))`.

Pour intégrer une distance réticulaire, vous devez la calculer, soit dans R (Apparicio et Gelb 2024), soit dans un logiciel de système d'information géographique (QGIS ou ArcGIS Pro avec l'extension *Network Analyst* par exemple) et l'importer dans R. Le reste du code sera alors identique.

Nous avons vu qu'il est possible d'utiliser une matrice de distance en fixant une distance maximale au-delà de laquelle les pondérations sont mises à 0 (équation 1.8). Le code ci-dessous permet de créer des matrices de pondération standardisées avec l'inverse de la distance et l'inverse de la distance au carré avec des seuils de 2500 et de 5000 mètres.

```
## Coordonnées des centroïdes des entités spatiales
coords <- st_coordinates(IRIS.centroides)
## Création de la matrice de distance
distances <- as.matrix(dist(coords, method = "euclidean"))
## Création de différentes matrices avec différents seuils
InvDistances.1000m <- ifelse(distances<=1000 & distances!=0, 1/distances, 0)
InvDistances.2500m <- ifelse(distances<=2500 & distances!=0, 1/distances, 0)
InvDistances.5000m <- ifelse(distances<=5000 & distances!=0, 1/distances, 0)
InvDistances2.2500m <- ifelse(distances<=2500 & distances!=0, 1/distances^2, 0)
InvDistances2.5000m <- ifelse(distances<=5000 & distances!=0, 1/distances^2, 0)
## Matrices de pondération spatiale standardisées en ligne
W_InvDistances.1000 <- mat2listw(InvDistances.1000m, style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances.2500 <- mat2listw(InvDistances.2500m, style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances.5000 <- mat2listw(InvDistances.5000m, style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances2.2500 <- mat2listw(InvDistances2.2500m, style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances2.5000 <- mat2listw(InvDistances2.5000m, style="W", zero.policy = TRUE)
```

Spécifier un seuil de distance trop réduit peut toutefois être problématique. Par exemple, sur les 506 IRIS de l'agglomération de Lyon, 68 n'ont pas de voisins à 1000 mètres, indiqués par le résultat suivant : 68 regions with no links.

```
summary(W_InvDistances.1000, zero.policy=TRUE)
```

Characteristics of weights list object:

Neighbour list object:

Number of regions: 506

Number of nonzero links: 3992

Percentage nonzero weights: 1.559156

Average number of links: 7.889328

68 regions with no links:

5 9 11 16 20 22 26 29 39 46 49 51 59 64 67 69 79 81 88 97 98 99 103 105

108 113 114 117 118 121 124 126 128 129 130 131 133 135 137 141 143 151

153 157 158 160 161 162 163 165 166 167 168 169 171 176 177 178 179 181

184 185 186 370 377 387 415 506

86 disjoint connected subgraphs

Link number distribution:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

68 39 25 28 27 30 34 40 38 14 18 12 13 16 8 10 11 11 10 13 7 11 7 3 5 5

26 28

2 1

39 least connected regions:

7 8 13 14 15 25 28 35 41 42 43 48 52 56 61 65 71 72 85 86 91 93 94 96 106 116 138 140 148 155 172 174 183 187 22

1 most connected region:

424 with 28 links

Weights style: W

Weights constants summary:

	n	nn	S0	S1	S2
W	438	191844	438	203.0076	1789.585

⚠ Attention

Réduction de la taille des matrices de distance

Plusieurs logiciels (notamment ArcGIS Pro et GeoDa) réduisent par défaut la taille des matrices de distance de la façon suivante : 1) construction d'une matrice de distance uniquement pour l'entité la plus proche (la matrice résultante est donc de dimension $n \times 1$); 2) obtention de la distance maximale dans cette matrice, soit la distance la plus grande entre une entité spatiale et celle la plus proche; 3) construction de la matrice de distance finale avec comme seuil la distance maximale obtenue à l'étape précédente.

Cette réduction procure deux avantages importants :

- **Une diminution considérable des temps de calcul**, surtout pour les couches géographiques comprenant un nombre très élevé d'entités spatiales. Par exemple, avec une couche de 50 entités spatiales, la matrice des distances comprendra 2500 valeurs ($50 \times 50 = 2500$) tandis qu'avec 1000 entités spatiales, elle en comprendra un million ($1000 \times 1000 = 1\,000\,000$).
- Comme décrit plus haut, il est préférable d'**éviter d'avoir une matrice de distances avec des entités spatiales sans voisins**, puisque cela a un impact négatif sur les mesures d'autocorrélation spatiale.

La syntaxe ci-dessous permet ainsi de construire des matrices de pondération (inverse de la distance et inverse de la distance au carré) à partir de la distance maximale et un SR et son voisin le plus proche.

```
## Coordonnées des centroïdes des entités spatiales
coords <- st_coordinates(IRIS.centroides)
## Trouver le plus proche voisin
k1 <- knn2nb(knearneigh(coords))
## Affichage de la distance la plus proche pour les 506 IRIS
round(unlist(nbdists(k1,coords)),0)
```

```
[1] 506 739 776 451 1000 284 547 629 1206 449 1145 603 727 965 370
[16] 1835 389 334 725 1264 523 1543 449 710 990 1692 617 643 1145 509
[31] 489 488 600 334 841 407 770 301 1072 884 426 985 899 417 249
[46] 1316 588 426 1067 402 1366 718 452 657 696 600 759 482 1841 225
[61] 999 452 229 1616 418 220 1144 547 1482 284 985 926 417 716 678
[76] 355 345 603 1020 188 2040 325 841 770 767 727 767 1082 614 622
[91] 746 225 974 841 348 926 1108 1354 1290 545 220 355 1723 338 1686
[106] 370 188 1130 249 451 348 340 1063 1256 471 746 1094 1507 303 471
[121] 2332 831 301 1129 229 1638 677 2237 1092 2157 1050 452 1058 389 2523
[136] 682 1385 418 692 629 1097 459 1543 520 340 325 617 718 303 495
[151] 2218 369 1175 619 993 392 3366 1072 453 1050 1464 1385 1780 657 1181
[166] 1170 1324 1170 1477 352 1477 752 394 852 611 1562 1279 1279 1539 352
[181] 1035 611 394 1834 1300 1057 852 249 460 427 370 272 410 343 319
[196] 346 235 271 491 159 398 386 272 403 512 325 209 286 270 261
[211] 286 157 832 452 450 464 280 492 236 561 276 186 804 219 576
[226] 290 275 560 321 221 583 252 456 460 325 191 314 756 346 482
[241] 472 523 863 259 271 247 238 341 383 699 423 247 221 509 358
[256] 385 316 539 219 602 368 883 599 346 393 245 599 492 940 398
[271] 458 290 414 475 321 286 438 276 347 660 394 155 269 249 328
[286] 393 503 270 392 630 269 281 725 394 408 259 493 517 523 459
[301] 284 438 390 280 311 407 489 534 329 413 301 368 311 462 289
[316] 251 276 387 293 815 467 340 492 261 165 475 602 235 404 384
[331] 976 300 407 486 309 211 319 275 341 756 283 395 299 469 360
[346] 360 870 261 159 211 530 236 292 209 329 346 519 531 597 394
[361] 290 290 165 270 531 343 175 335 281 1046 398 390 267 267 507
[376] 358 1071 341 249 361 292 540 373 157 273 286 1173 253 423 442
[391] 472 274 299 318 335 345 487 503 278 442 341 660 249 238 238
[406] 511 295 725 469 220 481 422 416 456 1038 416 509 318 462 245
[421] 658 341 570 175 291 374 269 355 408 312 514 287 786 520 380
[436] 286 360 520 800 444 475 343 438 641 383 444 508 325 530 448
[451] 533 562 490 290 293 284 155 252 318 289 348 429 210 318 447
[466] 318 297 546 495 311 376 376 443 546 220 277 327 688 362 146
[481] 830 460 431 620 603 725 396 495 362 277 146 298 422 389 389
[496] 422 327 678 688 425 607 289 522 396 431 2365
```

```
## Trouver la distance maximale
plusprochevoisin.max <- max(unlist(nbdists(k1,coords)))
cat("Distance maximale au plus proche voisin :", round(plusprochevoisin.max,0), "mètres")
```

Distance maximale au plus proche voisin : 3366 mètres

```
## Matrice de distance avec la valeur maximale
# les voisins les plus proches avec le seuil de distance maximal
Voisins.DistMax <- dnearneigh(coords, 0, plusprochevoisin.max)
# Distances avec le seuil maximum
distances <- nbdists(Voisins.DistMax, coords)
# Inverse de la distance
InvDistances <- lapply(distances, function(x) (1/x))
# Inverse de la distance au carré
InvDistances2 <- lapply(distances, function(x) (1/x^2))
## Matrices de pondération spatiale standardisées en ligne
W_InvDistances <- nb2listw(Voisins.DistMax, glist = InvDistances, style = "W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances2 <- nb2listw(Voisins.DistMax, glist = InvDistances2, style = "W", zero.policy = TRUE)
```

1.2.4.5 Matrices de pondération spatiale selon le critère des plus proches voisins

La fonction `knearneigh` du *package* `spdep` crée des matrices de distance selon le critère des plus proches voisins, dont le nombre est fixé avec le paramètre `k`.

```
## Coordonnées géographiques des centroïdes des polygones
coords <- st_coordinates(st_centroid(LyonIris))
## Matrices des plus proches voisins de 2 à 5
k2 <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 2))
k3 <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 3))
k4 <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 4))
k5 <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 5))
## Matrices de pondération spatiale standardisées en ligne
W.k2 <- nb2listw(k2, zero.policy=FALSE, style = "W")
W.k3 <- nb2listw(k3, zero.policy=FALSE, style = "W")
W.k4 <- nb2listw(k4, zero.policy=FALSE, style = "W")
W.k5 <- nb2listw(k5, zero.policy=FALSE, style = "W")
```

 Astuce**L'ensemble des matrices en quelques lignes de code!**

```

library(dplyr)
# Nom de la couche sf départ à changer au besoin
Couche.sf <- LyonIris

# Matrice de contiguïté
Queen <- poly2nb(Couche.sf, queen=TRUE)
Rook <- poly2nb(Couche.sf, queen=FALSE)
W.Queen <- nb2listw(Queen, zero.policy=TRUE, style = "W")
W.Rook <- nb2listw(Rook, zero.policy=TRUE, style = "W")

# Matrice de contiguïté (ordre 2 à 5)
W.Rook2 <- nblag_cumul(nblag(Rook, 2)) %>% nb2listw(zero.policy=TRUE, style = "W")
W.Rook3 <- nblag_cumul(nblag(Rook, 3)) %>% nb2listw(zero.policy=TRUE, style = "W")
W.Rook4 <- nblag_cumul(nblag(Rook, 4)) %>% nb2listw(zero.policy=TRUE, style = "W")
W.Rook5 <- nblag_cumul(nblag(Rook, 5)) %>% nb2listw(zero.policy=TRUE, style = "W")

# Matrice de connectivité binaire
Centroides <- st_centroid(Couche.sf)
W.Connect2500m <- dnearneigh(Centroides, d1 = 0, d2 = 2500) %>%
  nb2listw(zero.policy=TRUE, style = "W")

# Inverse de la distance et inverse de la distance au carré (matrices complètes)
distances <- as.matrix(dist(st_coordinates(Centroides), method = "euclidean"))
diag(distances) <- 0
W_InvDistances <- ifelse(distances!=0, 1/distances, distances) %>% mat2listw(style="W")
W_InvDistances2 <- ifelse(distances!=0, 1/distances^2, distances) %>% mat2listw(style="W")

# Inverse de la distance et inverse de la distance au carré (matrices réduites)
coords <- st_coordinates(Centroides)
plusprochevoisin.max <- max(unlist(nbdists(knn2nb(knearneigh(coords)), coords)))
dists <- nbdists(dnearneigh(coords, 0, plusprochevoisin.max), coords)
W_InvDistancesReduite <- lapply(dists, function(x) (1/x)) %>%
  nb2listw(Voisins.DistMax, glist = ., style = "W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances2Reduite <- lapply(dists, function(x) (1/x^2)) %>%
  nb2listw(Voisins.DistMax, glist = ., style = "W", zero.policy = TRUE)

# Inverse de la distance et inverse de la distance au carré avec un seuil de distance
W_InvDistances.1000m <- ifelse(distances<=1000 & distances!=0, 1/distances, 0) %>%
  mat2listw(style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances.2500m <- ifelse(distances<=2500 & distances!=0, 1/distances, 0) %>%
  mat2listw(style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances.5000m <- ifelse(distances<=5000 & distances!=0, 1/distances, 0) %>%
  mat2listw(style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances2.2500m <- ifelse(distances<=2500 & distances!=0, 1/distances^2, 0) %>%
  mat2listw(style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances2.5000m <- ifelse(distances<=5000 & distances!=0, 1/distances^2, 0) %>%
  mat2listw(style="W", zero.policy = TRUE)

```

```

## Matrices des plus proches voisins de 2 à 5

```

```

W.k2 <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 2)) %>% nb2listw(zero.policy=FALSE, style = "W")
W.k3 <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 3)) %>% nb2listw(zero.policy=FALSE, style = "W")
W.k4 <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 4)) %>% nb2listw(zero.policy=FALSE, style = "W")

```


1.3 Variable spatialement décalée

À partir des matrices de pondérations standardisées en ligne, qu'elles soient de contiguïté ou de proximité, il est possible de calculer pour une version spatialement décalée d'une variable initiale. De la sorte, pour une entité spatiale i , il est possible de connaître la valeur moyenne d'une variable pour ses entités voisines ou proches (dépendamment si la matrice est définie selon la contiguïté ou la proximité). Au chapitre 2, nous verrons que ces variables spatiales décalées sont utilisées dans plusieurs modèles d'économétrie spatiale.

i Note

Comment calculer une variable spatialement décalée avec une matrice de pondération spatiale?

À la figure 1.9, nous détaillons le calcul de la valeur d'une variable spatialement décalée pour l'entité spatiale **A** à partir d'une matrice de contiguïté (selon le partage d'un segment) standardisée en ligne. Notez que **A** est adjacente à quatre entités spatiales (b, c, d et e).



Moyenne = 66,96. Écart-type = 25,50.

^a w_{ij} = poids standardisés en ligne de la matrice de contiguïté, soit 1/4 voisins.

^b cote $z = (117 - 66,96) / 25,50 = 1,96$

^c $105 \times 0,25 = 26,25$ ^d $1,49 \times 0,25 = 0,37$

$W.x_a = 93,75$, soit la moyenne de X pour les entités spatiales adjacentes à **A**

$W.Zx_a = 1,05$, soit la moyenne de la cote Z pour les entités spatiales adjacentes à **A**

Figure 1.9: Illustration du calcul d'une variable spatialement décalée

La fonction `lag.listw` du package `spdep` permet de créer une variable spatialement décalée en spécifiant la matrice de pondération spatiale et un vecteur numérique : `wzx <- lag.listw(listw, zx)`. Dans la syntaxe ci-dessous, nous créons une version spatiale décalée de la variable *dioxyde d'azote* (**N02**) de la couche **sf** *LyonIris* avec une matrice de pondérations spatiales standardisées en ligne (définie selon la contiguïté avec le partage d'un segment, **W.Rook**), puis nous cartographions les deux versions de la variable (initiale et spatialement décalée) à la figure 1.10.

```
# Chargement des données
library(tmap)
library(spdep)
load("data/Lyon.Rdata")
# Matrice de pondération spatiale standardisée en ligne selon la contiguïté
W.Rook <- nb2listw(poly2nb(LyonIris, queen=FALSE), zero.policy=TRUE, style = "W")
# Variable spatialement décalée
LyonIris$W_N02 <- lag.listw(W.Rook, LyonIris$N02)
# Cartographie avec tmap
tmap_mode("plot")
legende.parametres <- list(text.separator = "à", decimal.mark = ",", big.mark = " ")
Carte1 <- tm_shape(LyonIris)+
  tm_borders(col="gray25", lwd=.2)+
  tm_fill(col="N02", palette="Reds", n=5, style="quantile",
          legend.format = legende.parametres,
          title = "(a) Variable initiale")+
  tm_layout(frame=FALSE)+tm_scale_bar(breaks=c(0,5))
Carte2 <- tm_shape(LyonIris)+
  tm_borders(col="gray25", lwd=.2)+
  tm_fill(col="W_N02", palette="Reds", n=5, style="quantile",
          legend.format = legende.parametres,
          title = "(b) Spatialement décalée")+
  tm_layout(frame=FALSE)
tmap_arrange(Carte1, Carte2, ncol = 2, nrow = 1)
```




Figure 1.10: Exemple de variable spatialement décalée

1.4 Autocorrélation spatiale

L'autocorrélation spatiale permet d'estimer la corrélation d'une variable par rapport à sa localisation dans l'espace. Autrement dit, elle permet de vérifier si les entités proches ou voisines ont tendance à être (dis)semblables en fonction d'un phénomène donné (soit une variable). On distingue trois formes d'autocorrélation spatiale :

- **(a) Autocorrélation spatiale positive** : lorsque les entités spatiales voisines ou proches se ressemblent davantage que celles non contiguës ou éloignées. Cela renvoie ainsi à la première loi de la géographie : « tout interagit avec tout, mais les objets proches ont plus de chance de le faire que les objets éloignés » (traduction libre) (Tobler 1970).
- **(b) Autocorrélation spatiale négative** : lorsque les entités spatiales voisines ou proches ont tendance à être dissemblables, comparativement à celles non contiguës ou éloignées.
- **(c) Absence d'autocorrélation spatiale** : lorsque les valeurs de la variable sont distribuées aléatoirement dans l'espace; autrement dit, lorsqu'il n'y a pas de relation entre le voisinage ou la proximité des entités spatiales et leur degré de ressemblance.

🎯 Objectif

Différentes mesures d'autocorrélation spatiale

On distingue habituellement les statistiques d'autocorrélation spatiale globales et locales :

- Les statistiques d'autocorrélation spatiale globales qui renvoient une valeur pour l'ensemble de l'espace d'étude. Succinctement, elles permettent de vérifier si les entités proches ou voisines d'une couche géographique ont tendance à être (dis)semblables en fonction d'un phénomène donné (soit une variable).
- Les mesures d'autocorrélation spatiale locales renvoient des valeurs pour chacune des entités spatiales. Succinctement, il s'agit de vérifier si chaque entité spatiale est significativement (dis)semblable de celles voisines ou proches.

Nous aborderons ici uniquement une **statistique d'autocorrélation spatiale globale**, soit le ***I* de Moran**, pour évaluer l'autocorrélation spatiale d'une variable continue. Pour aborder une panoplie de mesures globales ou locales, nous invitons à consulter le chapitre intitulé *Autocorrélation spatiale* (Apparicio et Gelb 2024).

1.4.1 Formulation du *I* de Moran

Pour évaluer le degré d'autocorrélation spatiale d'une variable continue, les deux principales statistiques utilisées sont le *I* de Moran (1950) et le *c* de Geary (1954). Nous présentons ici uniquement le *I* de Moran pour deux raisons principales. Premièrement, étant basée sur la covariance, son interprétation est bien plus facile que celle du *c* de Geary (basé sur la variance des écarts), c'est-à-dire qu'elle est très similaire au bien connu **coefficient de corrélation de Pearson** (Apparicio et Gelb 2022). Deuxièmement, elle constitue la mesure la plus utilisée. Le *I* de Moran s'écrit :

$$I = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}} \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \text{ avec :} \quad (1.9)$$

- n , le nombre d'entités spatiales dans la couche géographique;
- w_{ij} , la valeur de la pondération spatiale entre les entités spatiales i et j ;
- x_i et x_j , les valeurs de la variable continue pour les entités spatiales i et j ;
- $\bar{x}$, la valeur moyenne de la variable X à l'étude.

Note**Standardisation de la matrice de pondération et I de Moran**

Nous avons vu que si la matrice de pondération spatiale est standardisée en ligne (section 1.2.3), alors chaque ligne de la matrice vaut 1 et la somme de l'ensemble des valeurs de la matrice est égale au nombre d'entités spatiales (n). Or, dans l'équation 1.9), $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}$ représente la somme des pondérations de la matrice, soit n si elles sont standardisées en ligne. Puisque $\frac{n}{n} = 1$, alors l'équation du I de Moran est simplifiée comme suit :

$$I = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (1.10)$$

Comme évoqué dans la section 1.2.3, cela démontre l'intérêt de la standardisation : la comparaison des valeurs du I de Moran obtenues avec différentes matrices de contiguïté afin de sélectionner (éventuellement) celle avec laquelle l'autocorrélation spatiale est la plus forte.

1.4.2 Interprétation du I de Moran

Avec une matrice standardisée, la statistique du I de Moran varie de -1 à 1 et s'interprète de la façon suivante :

- quand $I > 0$, l'autocorrélation est positive, c'est-à-dire que les entités géographiques ont tendance à se ressembler d'autant plus qu'elles sont voisines ou proches;
- quand $I = 0$, l'autocorrélation est nulle, c'est-à-dire que la contiguïté ou la proximité spatiale des zones ne jouent aucun rôle;
- quand $I < 0$, l'autocorrélation est négative, c'est-à-dire que les entités géographiques ont tendance à être dissemblables d'autant plus qu'elles sont voisines ou proches.

Les limites de -1 et 1 sont les maximums théoriques du I de Moran. Dans la pratique, elles sont limitées par la matrice spatiale utilisée dans le calcul. En effet, selon la matrice spatiale, le maximum du I de Moran peut être inférieur à 1, et son minimum supérieur à -1. Le calcul de ces bornes propres à chaque matrice spatiale peut se faire en utilisant les maximums et minimums des valeurs propres de $\frac{W+W^T}{2}$, quand la matrice spatiale est standardisée. À titre d'exemple, nous calculons ci-dessous les maximums et minimums possibles pour une matrice de contiguïté selon le partage d'un nœud (*Queen*) pour les 506 IRIS de l'agglomération de Lyon. Il apparaît ainsi que pour la matrice de contiguïté selon le partage d'un nœud (*Queen*), quelle soit la variable analysée, la valeur de I de Moran ne pourra pas dépasser les limites -0,64 et 1,04.

```
# Matrice de contiguïté selon le partage d'un nœud (Queen)
Queen <- poly2nb(LyonIris, queen = TRUE)
WQueen <- nb2listw(Queen, style = 'W')
QueenMat <- listw2mat(WQueen)
values <- range(eigen((QueenMat + t(QueenMat))/2)$values)
print(round(values,2))
```

```
[1] -0.69  1.04
```

1.4.3 Significativité du I de Moran

Comme pour le coefficient de corrélation calculé entre deux variables, il est possible de tester la significativité de la valeur du I de Moran obtenue. Sans que nous détaillions les calculs de significativité, notez qu'il existe trois manières de tester la significativité :

- selon l'hypothèse de la normalité;
- selon l'hypothèse de la randomisation;
- selon des permutations Monte-Carlo (habituellement avec 999 échantillons).

Aller plus loin

Comment calculer les trois tests de significativité du I de Moran?

Pour une description détaillée du calcul des trois tests, consultez l'ouvrage de Jean Dubé et Diego Legros (2014).

1.4.4 Mise en œuvre dans R

Objectif

Calcul du I de Moran dans R

Pour illustrer le calcul de I de Moran dans R, nous utilisons la couche des IRIS de l'agglomération de Lyon. Les étapes suivantes sont réalisées :

1. Construire une panoplie de matrices de pondération spatiale selon la contiguïté, la connectivité, la proximité et le critère des plus proches voisins.
2. Comparer les valeurs de significativité (p) pour une variable continue (N02).
3. Pour cette même variable, trouver avec quelle matrice la valeur du I de Moran est la plus forte.

1.4.4.1 Étape 1. Construction des matrices de pondération spatiale

```
library(dplyr)
library(sf)
library(spdep)
load("data/Lyon.Rdata")
# Matrice de contiguïté
Queen <- poly2nb(LyonIris, queen=TRUE)
Rook <- poly2nb(LyonIris, queen=FALSE)
W.Queen <- nb2listw(Queen, zero.policy=TRUE, style = "W")
W.Rook <- nb2listw(Rook, zero.policy=TRUE, style = "W")
# Matrice de contiguïté (ordre 2 à 5)
W.Rook2 <- nblag_cumul(nblag(Rook, 2)) %>% nb2listw(zero.policy=TRUE, style = "W")
W.Rook3 <- nblag_cumul(nblag(Rook, 3)) %>% nb2listw(zero.policy=TRUE, style = "W")
W.Rook4 <- nblag_cumul(nblag(Rook, 4)) %>% nb2listw(zero.policy=TRUE, style = "W")
```

```

W.Rook5 <- nblag_cumul(nblag(Rook, 5)) %>% nb2listw(zero.policy=TRUE, style = "W")
# Matrice de connectivité binaire
Centroides <- st_centroid(LyonIris)
W.Connect2500m <- dnearneigh(Centroides, d1 = 0, d2 = 2500) %>%
  nb2listw(zero.policy=TRUE, style = "W")
# Inverse de la distance et inverse de la distance au carré (matrices complètes)
distances <- as.matrix(dist(st_coordinates(Centroides), method = "euclidean"))
diag(distances) <- 0
W_InvDistances <- ifelse(distances!=0, 1/distances, distances) %>% mat2listw(style="W")
W_InvDistances2 <- ifelse(distances!=0, 1/distances^2, distances) %>% mat2listw(style="W")
# Inverse de la distance et inverse de la distance au carré (matrices réduites)
coords <- st_coordinates(Centroides)
plusprochevoisin.max <- max(unlist(nbdists(knn2nb(knearneigh(coords)), coords)))
dists <- nbdists(dnearneigh(coords, 0, plusprochevoisin.max), coords)
W_InvDistancesReduite <- lapply(dists, function(x) (1/x)) %>%
  nb2listw(Voisins.DistMax, glist = ., style = "W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances2Reduite <- lapply(dists, function(x) (1/x^2)) %>%
  nb2listw(Voisins.DistMax, glist = ., style = "W", zero.policy = TRUE)
# Inverse de la distance et inverse de la distance au carré avec un seuil de distance
W_InvDistances.1000m <- ifelse(distances<=1000 & distances!=0, 1/distances, 0) %>%
  mat2listw(style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances.2500m <- ifelse(distances<=2500 & distances!=0, 1/distances, 0) %>%
  mat2listw(style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances.5000m <- ifelse(distances<=5000 & distances!=0, 1/distances, 0) %>%
  mat2listw(style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances2.2500m <- ifelse(distances<=2500 & distances!=0, 1/distances^2, 0) %>%
  mat2listw(style="W", zero.policy = TRUE)
W_InvDistances2.5000m <- ifelse(distances<=5000 & distances!=0, 1/distances^2, 0) %>%
  mat2listw(style="W", zero.policy = TRUE)
## Matrices des plus proches voisins de 2 à 5
W.k2 <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 2)) %>% nb2listw(zero.policy=FALSE, style = "W")
W.k3 <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 3)) %>% nb2listw(zero.policy=FALSE, style = "W")
W.k4 <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 4)) %>% nb2listw(zero.policy=FALSE, style = "W")
W.k5 <- knn2nb(knearneigh(coords, k = 5)) %>% nb2listw(zero.policy=FALSE, style = "W")

```

1.4.4.2 Étape 2. Calcul du I de Moran et des trois tests de significativité

Les fonctions `moran.test` et `moran.mc` du *package* `spdep` permettent de calculer le *I* de Moran selon les trois façons de tester la significativité :

- selon l'hypothèse de la normalité avec le paramètre `randomisation = FALSE`
 - `moran.test(ObjetSf$Variable, listw=MatriceW, zero.policy=TRUE, randomisation = FALSE)`
- selon l'hypothèse de la randomisation avec le paramètre `randomisation = TRUE`

1 Autocorrélation spatiale, dépendance spatiale et hétérogénéité spatiale d'un modèle de régression

- `moran.test(ObjetSf$Variable, listw=MatriceW, zero.policy=TRUE, randomisation = TRUE)`
- selon des permutations Monte-Carlo (ci-dessus avec 999 permutations)
 - `moran.mc(ObjetSf$Variable, listw=MatriceW, zero.policy=TRUE, nsim=999)`

Bien entendu, dans les sorties des trois méthodes, la valeur du I de Moran est la même, contrairement à la valeur de p qui peut varier.

```
moran.test(LyonIris$N02,      # nom de l'objet sf et de la variable continue
           listw=W.Queen,     # nom de la matrice de pondération spatiale
           zero.policy=TRUE,
           randomisation = FALSE) # significativité selon l'hypothèse de la normalité
```

Moran I test under normality

```
data: LyonIris$N02
weights: W.Queen
```

```
Moran I statistic standard deviate = 30.135, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
```

Moran I statistic	Expectation	Variance
0.8189249687	-0.0019801980	0.0007420591

```
moran.test(LyonIris$N02,      # nom de l'objet sf et de la variable continue
           listw=W.Queen,     # nom de la matrice de pondération spatiale
           zero.policy=TRUE,
           randomisation = TRUE) # significativité selon l'hypothèse de la randomisation
```

Moran I test under randomisation

```
data: LyonIris$N02
weights: W.Queen
```

```
Moran I statistic standard deviate = 30.135, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
```

Moran I statistic	Expectation	Variance
0.8189249687	-0.0019801980	0.0007420917

```
moran.mc(LyonIris$N02,      # nom de l'objet sf et de la variable continue
          listw=W.Queen,     # nom de la matrice de pondération spatiale
          zero.policy=TRUE,
          nsim=999)         # 999 permutations
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: LyonIris$NO2
weights: W.Queen
number of simulations + 1: 1000

statistic = 0.81892, observed rank = 1000, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater
```

La statistique du I de Moran ($I = 0,82$, $p < 0,001$) indique que la variable *dioxyde d'azote* a une forte autocorrélation spatiale positive.

1.4.4.3 Étape 3. Identification de la plus forte autocorrélation spatiale selon les différentes matrices

La syntaxe ci-dessous permet de calculer la statistique du I de Moran avec plusieurs matrices de pondération spatiale.

```
## Création d'une liste pour toutes les matrices
ListeMatrices <- list(W.Queen = W.Queen,
                      W.Rook = W.Rook,
                      W.Rook2 = W.Rook2,
                      W.Rook3 = W.Rook3,
                      W.Rook4 = W.Rook4,
                      W.Rook5 = W.Rook5,
                      W.Connect2500m = W.Connect2500m,
                      W_InvDistances = W_InvDistances,
                      W_InvDistances2 = W_InvDistances2,
                      W_InvDistancesReduite = W_InvDistancesReduite,
                      W_InvDistances2Reduite = W_InvDistances2Reduite,
                      W_InvDistances.1000m = W_InvDistances.1000m,
                      W_InvDistances.2500m = W_InvDistances.2500m,
                      W_InvDistances2.2500m = W_InvDistances2.2500m,
                      W_InvDistances2.5000m = W_InvDistances2.5000m,
                      W.k2 = W.k2,
                      W.k3 = W.k3,
                      W.k4 = W.k4,
                      W.k5 = W.k5)

## Vecteur pour le I de Moran et la valeur de p
MoranI <- c()
Pvalue <- c()
i<-0
## Boucle pour calculer le I de Moran avec la liste des matrices
for (e in ListeMatrices){
  i<-i+1
  Test <- moran.mc(LyonIris$NO2,
                   listw=e,
```

```

      zero.policy=TRUE,
      nsim=999)
MoranI[i] <- Test$statistic
Pvalue[i] <- Test$p.value
}
# Création d'un DataFrame avec les valeurs du I de Moran et de p
MoranData1 <- data.frame(Matrices=names(ListeMatrices),
      MoranIs=round(MoranI, 4),
      Pvalues=Pvalue)
print(MoranData1)

```

	Matrices	MoranIs	Pvalues
1	W.Queen	0.8189	0.001
2	W.Rook	0.8244	0.001
3	W.Rook2	0.7174	0.001
4	W.Rook3	0.6215	0.001
5	W.Rook4	0.5192	0.001
6	W.Rook5	0.4194	0.001
7	W.Connect2500m	0.6327	0.001
8	W_InvDistances	0.1946	0.001
9	W_InvDistances2	0.4769	0.001
10	W_InvDistancesReduite	0.6301	0.001
11	W_InvDistances2Reduite	0.7011	0.001
12	W_InvDistances.1000m	0.6302	0.001
13	W_InvDistances.2500m	0.6766	0.001
14	W_InvDistances2.2500m	0.7235	0.001
15	W_InvDistances2.5000m	0.6554	0.001
16	W.k2	0.8083	0.001
17	W.k3	0.7903	0.001
18	W.k4	0.7865	0.001
19	W.k5	0.7844	0.001

La lecture détaillée du tableau 1.5 permet d'avancer plusieurs constats intéressants :

- D'emblée, signalons que toutes les valeurs sont positives et significatives, témoignant d'une autocorrélation spatiale positive.
- Concernant les **matrices de contiguïté**, l'autocorrélation spatiale est plus forte selon le partage d'un segment que d'un nœud (0,8244 contre 0,8189). Par conséquent, si nous devons choisir une matrice de contiguïté, il serait préférable d'utiliser celle définie selon le partage d'une chaîne (*Rook*).
- Sans surprise, plus nous ajoutons des **ordres d'adjacence**, plus la valeur de la statistique du *I* de Moran est faible, passant de 0,7174 à 0,4194 du deuxième au cinquième ordre.
- Concernant les **matrices de proximité**, la méthode de l'inverse de la distance au carré, qui accorde un poids plus important aux entités spatiales très proches (comparativement à l'inverse de la distance), renvoie des valeurs toujours plus élevées, et ce, que la matrice soit complète ou réduite. Aussi, les matrices de distance réduites présentent toujours des valeurs plus fortes que celles complètes.

- Concernant les matrices **selon le critère des plus proches voisins**, l'autocorrélation spatiale diminue légèrement de $k = 2$ à $k = 5$. D'ailleurs, la valeur la plus forte est pour deux voisins ($I = 0,8083$).

Tableau 1.5: Résultats du I de Moran selon les différentes matrices

Nom	Description	I de Moran	p (999 permutations)
Matrices de contiguïté			
W.Queen	Partage d'un nœud	0,8189	0,001
W.Rook	Partage d'un segment	0,8244	0,001
Matrices de contiguïté selon le partage d'un segment et ordre d'adjacence			
W.Rook2	Ordre 2	0,7174	0,001
W.Rook3	Ordre 3	0,6215	0,001
W.Rook4	Ordre 4	0,5192	0,001
W.Rook5	Ordre 5	0,4194	0,001
Matrices de connectivité			
W.Connect2500m	2500 mètres	0,6327	0,001
Matrices de distance (complètes)			
W_InvDistances	Inverse de la distance	0,1946	0,001
W_InvDistances2	Inverse de la distance au carré	0,4769	0,001
Matrices de distance (réduites)			
W_InvDistancesReduite	Inverse de la distance	0,6301	0,001
W_InvDistances2Reduite	Inverse de la distance au carré	0,7011	0,001
Matrices de distance avec un seuil maximal			
W_InvDistances.1000m	Inverse de la distance (2500 mètres)	0,6302	0,001
W_InvDistances.2500m	Inverse de la distance (5000 mètres)	0,6766	0,001
W_InvDistances2.2500m	Inverse de la distance au carré (2500 mètres)	0,7235	0,001
W_InvDistances2.5000m	Inverse de la distance au carré (5000 mètres)	0,6554	0,001
Matrices selon le critère des plus proches voisins			
W.k2	2 voisins	0,8083	0,001
W.k3	3 voisins	0,7903	0,001
W.k4	4 voisins	0,7865	0,001
W.k5	5 voisins	0,7844	0,001

Quelle est la matrice de pondérations spatiales avec laquelle la dépendance spatiale de la variable est la plus forte?

Pour la trouver, nous construisons un graphique avec les valeurs du I de Moran triées par ordre décroissant. La valeur la plus forte est obtenue avec la matrice de contiguïté selon le partage d'un segment.

```
library(ggplot2)
ggplot(data=MoranData1, aes(x=reorder(Matrices,MoranIs), y=MoranIs)) +
  geom_segment(aes(x=reorder(Matrices,MoranIs),
                    xend=reorder(Matrices,MoranIs),
                    y=0, yend=MoranIs)) +
  geom_point(size=4, fill="red", shape=21)+
```

```
xlab("Matrice de pondération spatiale") +
ylab("I de Moran")+
coord_flip()
```




Figure 1.11: Valeurs du I de Moran selon les différentes matrices de pondération spatiale

1.4.4.4 Étape 4. Comparaison des valeurs du I de Moran pour plusieurs variables avec la même matrice

La syntaxe ci-dessous permet de calculer la statistique du I de Moran pour plusieurs variables avec la même matrice de pondération spatiale (ici, matrice de contiguïté selon le partage d'un segment).

```
## Vecteur pour les variables à analyser
listeVars <- c("Lden", "NO2", "PM25", "VegHautPrt",
              "Pct0_14", "Pct_65", "Pct_Img", "TxChom1564", "Pct_brevet", "NivVieMed")

## Boucle pour calculer le I de Moran pour les différentes variables
MoranData2 <- t(sapply(listeVars, function(e){
  Test <- moran.mc(LyonIris[[e]],
                  listw=W.Rook,
                  zero.policy=TRUE,
                  nsim=999)
  result <- c(round(Test$statistic,4),
              Test$p.value)
}))

MoranData2 <- data.frame(MoranData2)
```



```
names(MoranData2) <- c('MoranIs', 'Pvalues')
MoranData2$Variable <- listeVars
rownames(MoranData2) <- NULL
print(MoranData2)
```

	MoranIs	Pvalues	Variable
1	0.5677	0.001	Lden
2	0.8244	0.001	N02
3	0.9371	0.001	PM25
4	0.5869	0.001	VegHautPrt
5	0.4421	0.001	Pct0_14
6	0.3013	0.001	Pct_65
7	0.4708	0.001	Pct_Img
8	0.2944	0.001	TxChom1564
9	0.5323	0.001	Pct_brevet
10	0.6286	0.001	NivVieMed

De nouveau, en quelques lignes de code, il est aisé de réaliser un graphique pour comparer les valeurs du I de Moran pour les différentes variables (figure 1.12).

```
library(ggplot2)
ggplot(data=MoranData2, aes(x=reorder(Variable,MoranIs), y=MoranIs)) +
  geom_segment(aes(x=reorder(Variable,MoranIs), xend=reorder(Variable,MoranIs), y=0, yend=MoranIs)) +
  geom_point(size=4, fill="red", shape=21)+
  xlab("Variable continue") + ylab("I de Moran")+
  coord_flip()
```




Figure 1.12: Valeurs du I de Moran pour les quatre variables

1.5 Bref retour sur la régression linéaire multiple

À titre de rappel, la régression linéaire multiple permet d'exprimer une variable d'intérêt, habituellement notée par le terme variable dépendante (y) en fonction de plusieurs variables que l'on pense liées, théoriquement, à la variable d'intérêt. Celles-ci sont habituellement désignées comme des variables explicatives ou indépendantes (notés x_k).

L'équation de régression s'écrit alors :

$$y_i = \alpha + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_K x_{Ki} + \varepsilon_i \quad (1.11)$$

Où :

- y_i , est la valeur de la variable dépendante y pour l'observation spatiale i .
- x_{ki} , est la valeur de la variable indépendante x_k pour l'observation spatiale i .
- α , est le paramètre d'ordonnée à l'origine, ou encore la constante. Elle représente la valeur moyenne de la variable dépendante lorsque l'ensemble des variables indépendantes (ou explicatives) sont nulles.
- $k = 1, 2, \dots, K$ est le nombre de variables indépendantes.
- β_1 à β_K , sont les coefficients de régression liés à chacune des variables indépendantes.
- ε_i , est le terme d'erreur, soit la partie de la valeur de la variable dépendante qui n'est pas expliquée par le modèle de régression. Le terme d'erreur est habituellement supposé de moyenne nulle, de variance homogène et indépendant.

À noter que le terme d'erreur est, par définition, inobservable. En revanche, il est possible d'approximer cette valeur en calculant le résidu, $\hat{\varepsilon}_i$, parfois aussi noté $\hat{e}_i$ (équations 1.12 et 1.13).

$$\hat{\varepsilon}_i = \hat{y}_i - y_i \quad (1.12)$$

$$\hat{\varepsilon}_i = y_i - \left[\hat{\alpha} + \hat{\beta}_1 x_{1i} + \hat{\beta}_2 x_{2i} + \cdots + \hat{\beta}_K x_{Ki} \right] \quad (1.13)$$

Il existe plusieurs manières d'exprimer cette relation sous forme plus compacte. L'une de celle-ci consiste à introduire le terme de sommation dans l'équation :

$$y_i = \alpha + \sum_{k=1}^K \beta_k x_{ki} + \varepsilon_i \quad (1.14)$$

Une autre approche, plus pratique et compacte, consiste à utiliser la notation matricielle :

$$y = \iota\alpha + \mathbf{X}\beta + \varepsilon \quad (1.15)$$

Où :

- y , est un vecteur de dimension $(N \times 1)$ où N est le nombre total d'observations mobilisées dans l'analyse, avec $i = 1, 2, \dots, N$.
- ι est un vecteur de dimension $(N \times 1)$ comportant uniquement des valeurs de 1.
- $\mathbf{X}$, une matrice de dimension $(N \times K)$ renfermant l'ensemble des K vecteurs de variables explicatives en plus d'une colonne de 1, dans la première colonne de la matrice, pour la constante, d'où $(K + 1)$.
- α est un scalaire identifiant l'ordonnée à l'origine.
- β , est un vecteur de dimension $(K + 1)$ qui renferme l'ensemble des coefficients de régression, pour les K variables indépendantes et la constante.
- ε , un vecteur de dimension $(N \times 1)$ des termes d'erreurs.

De manière plus explicite, les différents vecteurs et matrices prennent les formes suivantes :

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} \quad (1.16)$$

$$\iota = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.17)$$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & \cdots & x_{1k} & \cdots & x_{1K} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & \cdots & x_{2k} & \cdots & x_{2K} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{i1} & x_{i2} & x_{i3} & \cdots & x_{ik} & \cdots & x_{iK} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{N1} & x_{N2} & x_{N3} & \cdots & x_{Nk} & \cdots & x_{NK} \end{bmatrix} \quad (1.18)$$

$$\beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \\ \vdots \\ \beta_K \end{bmatrix} \quad (1.19)$$

Les modèles de régression linéaire sont largement mobilisés lorsqu'on s'intéresse à l'effet d'une variable spécifique sur le comportement de la variable d'intérêt. Le terme « effet marginal » est souvent associé aux coefficients estimés, β_k . Les coefficients permettent de simuler l'effet d'une variation d'une variable dépendante, Δx_k , sur la variation du comportement de la variable expliquée, Δy .

En termes plus techniques, les effets marginaux permettent d'exprimer l'effet de la dérivée partielle, c'est-à-dire d'isoler comment la variable d'intérêt bouge lorsqu'une des variables indépendantes bouge :

$$\frac{\partial y}{\partial x_k} = \beta_k \quad (1.20)$$

Ces effets sont habituellement l'essence de l'intérêt des modèles de régression. Par exemple, une variation de deux unités de la variable x_k devrait entraîner une variation dans y de $2\beta_k$ unités. Cette analyse est souvent le centre d'intérêt des modèles de régression, bien que l'interprétation causale ne soit pas nécessairement directe (Dubé et al. 2024).

Aller plus loin

Régression linéaire multiple

Afin de bien maîtriser les principes de base et les hypothèses de la régression linéaire multiple, mesurer la qualité d'ajustement du modèle, introduire des variables explicatives particulières (variable qualitative dichotomique ou polytomique, variable d'interaction, etc.), interpréter les résultats d'un modèle de régression la mettre en œuvre dans R, nous vous invitons à lire le [chapitre suivant](#) (Apparicio et Gelb 2022).

1.6 Pourquoi recourir à des régressions spatiales?

Deux motivations principales peuvent conduire à réaliser des régressions spatiales : la **dépendance spatiale** ou l'**hétérogénéité** du modèle de régression classique appliquées à des données spatiales (Chi et Zhu 2019, pp. 41-43).

1.6.1 Dépendance spatiale

Dans un modèle, les résidus (ϵ) sont la différence entre les valeurs observées (y_i) et les valeurs prédites par le modèle ($\hat{y}_i$). Une des hypothèses de la régression linéaire multiple est que les observations doivent être indépendantes les unes des autres (*indépendance du terme d'erreur*). Le non-respect de cette hypothèse produit des résultats biaisés, notamment pour les coefficients de régression. Un simple test de présence d'autocorrélation spatiale entre les résidus permet de vérifier si cette hypothèse est respectée (section 1.4).

Le rejet de cette hypothèse d'indépendance rend les coefficients estimés, selon la forme fonctionnelle postulée (ou processus générateur des données – PGD), par le modèle biaisés et/ou biaise le calcul des écarts-types, invalidant ainsi les tests de significativité usuels. La présence d'autocorrélation spatiale entre les résidus est donc un premier test nécessaire pour s'assurer de la qualité des résultats issus du modèle de régression linéaire.

À noter qu'une autocorrélation spatiale entre certaines variables observables, dépendante ou indépendantes, est possible sans pour autant que les résidus soient autocorrélés. Dans ce cas, les relations entre les variables indépendantes permettent de capter l'effet spatial contenu dans la variable dépendante et les résultats d'estimations sont valides si les résidus sont homoscedastiques, c'est-à-dire de variance homogène (autrement, le problème peut facilement être réglé par un simple ajout d'option dans la commande du modèle de régression). Ce n'est donc pas sur les variables observables que le test de détection d'autocorrélation spatiale est important, mais bien sur les résidus du modèle.

Pour être valides, les résultats d'un modèle de régression linéaire construit avec des données spatiales ne devraient pas avoir des résidus spatialement autocorrélés. Si c'est le cas, alors certaines options sont envisageables pour tenter de remédier à la situation. La plus simple étant l'ajout de variables indépendantes spatialement structurées, afin de capter l'autocorrélation résiduelle. Les méthodes plus avancées proposent d'intégrer formellement cette relation spatiale dans le PGD.

Pour illustrer le problème de dépendance spatiale d'un modèle, nous calculons le modèle MCO suivant avec le jeu de données des IRIS de l'agglomération lyonnaise : `lm(PM25 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet + NivVieMed, data = LyonIris)`.

```
load("data/Lyon.Rdata")
## Modèle MCO
Modele.MCO <- lm(PM25 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet + NivVieMed, data = LyonIris)
summary(Modele.MCO)
```

Call:

```
lm(formula = PM25 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet +
    NivVieMed, data = LyonIris)
```

Residuals:

```
Min      1Q  Median      3Q      Max
```

```
-6.8510 -1.1962 -0.0094 1.2337 7.5446
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	23.382778	0.775600	30.148	< 2e-16 ***
Pct0_14	-0.151750	0.016326	-9.295	< 2e-16 ***
Pct_65	-0.049786	0.014571	-3.417	0.000685 ***
Pct_Img	0.088013	0.013240	6.648	7.82e-11 ***
Pct_brevet	-0.076002	0.009635	-7.888	1.94e-14 ***
NivVieMed	-0.113065	0.026357	-4.290	2.15e-05 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.731 on 500 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.3539, Adjusted R-squared: 0.3474

F-statistic: 54.78 on 5 and 500 DF, p-value: < 2.2e-16

Pour vérifier la dépendance spatiale du modèle, nous calculons le I de Moran sur les résidus avec la fonction `lm.morantest` du *package* `spdep` et nous cartographions les résidus avec le *package* `tmap`. La statistique du I de Moran sur les résidus ($I = 0,66$, $p < 0,001$) indique clairement que le modèle OLS a un problème de dépendance spatiale et que ses coefficients de régression reportés plus haut sont certainement biaisés. Aussi, la cartographie des coefficients de régression montre que des résidus positifs dans les IRIS des quartiers centraux, tandis que les résidus négatifs sont concentrés dans les IRIS des quartiers ou des municipalités périphériques (figure 1.13). Par conséquent, le recours à des régressions spatiales est certainement nécessaire pour remédier à ce problème de dépendance spatiale du modèle MCO.

```
library(spdep)
library(tmap)
## Modèle MCO
LyonIris$MCO.Residus <- Modele.MCO$residuals
## Matrice de contiguïté
Rook <- poly2nb(LyonIris, queen=TRUE)
W.Rook <- nb2listw(Rook, zero.policy=TRUE, style = "W")
# I de Moran sur les résidus du modèle global (MCO)
lm.morantest(Modele.MCO, W.Rook)
```

Global Moran I for regression residuals

data:

```
model: lm(formula = PM25 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet +
NivVieMed, data = LyonIris)
```

weights: W.Rook

Moran I statistic standard deviate = 24.453, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: greater

sample estimates:

Observed Moran I	Expectation	Variance
0.6552777081	-0.0053724124	0.0007299083

```
# Cartographie des résidus
tmap_mode("plot")
tm_shape(LyonIris)+
  tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="MCO.Residus", n = 6, style = "pretty",
          legend.format = list(text.separator = "à",
                                decimal.mark = ","),
          midpoint = 0,
          palette = "-RdBu",
          title = "MCO") +
tm_layout(frame=FALSE)+
tm_scale_bar(breaks = c(0,5))
```




Figure 1.13: Cartographie des résidus d'un modèle MCO

Aller plus loin

Dépendance spatiale et méthodes de régression spatiale : quelles solutions?

Les modèles d'économétrie spatiale (chapitre 2 et chapitre 3) sont des solutions particulièrement intéressantes pour remédier au problème de dépendance spatiale d'un modèle et obtenir des coefficients de régression non biaisés.

Les modèles linéaires généralisés avec des vecteurs spatiaux (chapitre 7) permettent de capturer les tendances spatiales en résumant la matrice de pondérations spatiales W .

1.6.2 Hétérogénéité spatiale

L'hétérogénéité ou la non-stationnarité (*spatial heterogeneity* ou *nonstationarity*) se manifeste quand les relations entre la variables dépendante et indépendantes varient dans l'espace (en d'autres termes à travers les entités spatiales du jeu de données). Cela contrevient ainsi à l'hypothèse de l'homogénéité spatiale ou de stationnarité spatiale selon laquelle les coefficients du modèles doivent être constant dans l'espace.

Aller plus loin

Hétérogénéité ou non-stationnarité spatiale et méthodes de régression spatiale : quelles solutions?

Les régressions géographiquement pondérées (chapitre 4 et chapitre 5), sont des outils d'exploration particulièrement adaptés pour explorer et cartographier l'instabilité des relations entre les variables dépendante et indépendantes d'un modèle de régression.

Les modèles généralisés additifs (chapitre 6) permettent d'introduire des lissages spatiaux pour capturer les tendances spatiales, soit de manière continues (avec une spline bivariée sur les coordonnées géographiques), soit de manière discrète (avec un lissage par champ aléatoire de Markov).

Partie 2. Économétrie spatiale

2 Modèles d'économétrie spatiale

Dans ce chapitre, nous décrivons uniquement les modèles économétriques spatiaux dont la variable dépendante est continue. Sommairement, ces modèles sont des extensions de la régression linéaire multiple, mais dans lequel une spécification explicite des relations spatiales entre les observations est introduite. Cette spécification vise ultimement à capter des effets spatiaux qui influencent le processus générateur de données (PGD), c'est-à-dire le modèle économétrique que l'on spécifie.

Objectif

Objectifs d'apprentissage visés dans ce chapitre

À la fin de ce chapitre, vous devriez être en mesure de :

- Saisir les raisons motivant le choix d'un modèle de régression (externalités, effets d'entraînement, effets mixtes, etc.).
- Comprendre les différents modèles spatiaux autorégressifs (SLX, SAR, SEm, SDM, SDEM, Manski).
- Utiliser une stratégie pour choisir un modèle (tests du multiplicateur de Lagrange, tests du ratio de vraisemblance, critère d'information d'Akaike).
- Vérifier si le modèle autorégressif a corrigé ou non la dépendance spatiale du modèle MCO.
- Mettre en pratique ces modèles spatiaux dans R.

Package

Liste des *packages* utilisés dans ce chapitre

- Pour importer et manipuler des fichiers géographiques :
 - `sf` pour importer et manipuler des données vectorielles.
- Pour construire des cartes et des graphiques :
 - `tmap` est certainement le meilleur *package* pour la cartographie.
 - `ggplot2` et `ggpubr` pour construire des graphiques.
- Pour construire des modèles spatiaux :
 - `spdep` pour construire des matrices de pondération spatiales et calculer le I de Moran.
 - `spatialreg` pour construire des modèles économétriques spatiaux.

Attention

Régression linéaire multiple et modèles économétriques spatiaux

Avant de lire ce chapitre, il convient de bien maîtriser la régression linéaire multiple. Une brève récapitulation est proposée dans la section 1.5.

2.1 Les différents modèles spatiaux autorégressifs

Selon Jean Dubé et Diègo Legros, quelques raisons expliquent « le choix d'un modèle autorégressif : la présence d'externalités, les effets d'entraînement, l'omission de variables importantes, la présence d'hétérogénéité spatiale des comportements, les effets mixtes » (2014, 120). Les effets mixtes représentent une combinaison d'effets spatiaux. Dans tous les cas, la prise en compte des effets spatiaux passe par la spécification d'une matrice de pondérations spatiales, notée W et de dimension $(N \times N)$. Une synthèse des différents modèles spatiaux autorégressifs, décrits dans les sections suivantes, est présenté au tableau 2.1, indiquant s'ils sont ou non mixtes, et le type d'effet qu'ils permettent de prendre en compte.

Tableau 2.1: Synthèse des différentes modèles d'économétrie spatiale

	SLX	SAR	SEM	SDM	SDM
Externalités spatiale	X			X	X
Effets d'entraînement		X		X	
Omission de variables			X		X
Hétérogénéité spatiale			X		X
Effets mixtes				X	X
Application de la matrice de pondération spatiale	VI	VD	TE	VI et VD	VI et TE

VD = Variable dépendante. VI = Variables indépendantes. TE = terme d'erreur.

2.1.1 Modèle SLX : prise en compte des caractéristiques des voisins

2.1.1.1 Description du modèle SLX

Dans un modèle SLX (*spatial lag of X model*), la dimension spatiale est intégrée par une possible influence des variables indépendantes des observations voisines, ou des caractéristiques des voisins. Cette spécification vise habituellement à intégrer ce que l'on identifie dans la littérature par les effets d'externalités spatiales, c'est-à-dire capter l'influence des caractéristiques d'un voisin ($W\Delta x_k$) sur le comportement d'intérêt d'une observation donnée (Δy) (figure 2.1).




Figure 2.1: Effets marginaux dans un modèle SLX

Deux principaux avantages sont liés à cette spécification. Premièrement, cette approche peut se faire simplement en ajoutant des variables à l'équation de départ, soit la spécification du PGD original. La création de variables indépendantes, supposées exogènes, décalées spatialement peut être effectuée de manière simple (section 1.3). Deuxièmement, ce modèle peut être estimé par moindres carrés ordinaires (MCO), ce qui n'est pas possible avec les autres spécifications.

Note**Rappel sur les variables spatialement décalées**

Dans le premier chapitre (section 1.3), nous avons vu comment calculer une variable spatialement décalée avec une matrice de pondérations spatiales (figure 1.9). À titre de rappel, lorsque cette dernière est standardisée en ligne, elle correspond à la valeur moyenne dans les unités voisines ou proches (dépendamment si la matrice est définie selon la contiguïté ou la proximité).

Le modèle SLX prend la spécification suivante :

$$\mathbf{y} = \iota\alpha + \mathbf{X}\beta + \mathbf{WX}\theta + \varepsilon \quad (2.1)$$

Où :

- $\mathbf{y}$, est la variable dépendante, soit un vecteur de dimension $(N \times 1)$ où N est le nombre total d'observations mobilisées dans l'analyse, avec $i = 1, 2, \dots, N$.
- ι est un vecteur de dimension $(N \times 1)$ comportant uniquement des valeurs de 1.
- $\mathbf{X}$, une matrice de dimension $(N \times K)$ renfermant l'ensemble des K vecteurs de variables explicatives en plus d'une colonne de 1, dans la première colonne de la matrice, pour la constante, d'où $(K + 1)$.
- α est un scalaire identifiant l'ordonnée à l'origine.
- β , est un vecteur de dimension $(K + 1)$ qui renferme l'ensemble des coefficients de régression, pour les K variables indépendantes et la constante.
- $\mathbf{WX}$ est une matrice de variables indépendantes décalées spatialement, résultant d'une opération matricielle simple, soit $\mathbf{WX} = \mathbf{W} \times \mathbf{X}$, où $\mathbf{W}$ est de dimension $(N \times N)$, $\mathbf{X}$ est de dimension $(N \times K)$, d'où $\mathbf{WX}$ est de dimension $(N \times K)$, où chaque observations représente la moyenne des valeurs des variables indépendantes autour d'une observation donnée.
- θ est un vecteur de coefficients associés aux valeurs décalées spatialement des variables indépendantes (excluant la constante) de dimension $(K \times 1)$.
- ε , un vecteur de dimension $(N \times 1)$ des termes d'erreurs.

Le PGD suggère que la valeur de chaque unité spatiale du modèle est ainsi expliquée à la fois par ses propres caractéristiques et celles de ses voisins ou des observations à proximité en fonction de la matrice de pondérations spatiales ($\mathbf{W}$).

Une des particularités du modèle SLX est qu'il introduit une complexité dans l'interprétation des résultats et le calcul des effets marginaux puisque la variable x_k apparaît à deux endroits dans le modèle : d'abord dans la matrice des variables indépendantes originales ($\mathbf{X}$) et ensuite dans la matrice de variables indépendantes décalées spatialement ($\mathbf{WX}$). Lorsque la matrice de pondérations est standardisée en ligne, le calcul des effets marginaux est alors donné par la dérivée partielle suivante :

$$\frac{\partial y}{\partial x_k} = \mathbf{I}\beta_k + \mathbf{W}\theta_k \quad (2.2)$$

Pour une matrice de pondérations standardisées en ligne, cette expression se réduit à la valeur du coefficient associé à la variable indépendante originale, β_k , en plus de la valeur du coefficient associé à la variable décalée spatialement, θ_k . L'expression synthétise l'effet marginal total, alors que le coefficient β_k est habituellement désigné par l'effet direct et le coefficient θ_k synthétise l'effet indirect, puisque venant des voisins.

C'est d'ailleurs la valeur du coefficient θ_k qui introduit ce que l'on qualifie d'**externalité spatiale**. Elle exprime comment la variable dépendante varie lorsque les caractéristiques des voisins changent. Les changements dans la variable d'intérêt peuvent ainsi venir d'une variation des caractéristiques des voisins.

Ce modèle est aussi désigné sous le terme d'effet spatial local, par opposition à l'effet global (voir modèle SAR, section 2.1.2). La variation des caractéristiques des voisins a une portée limitée sur le changement de valeurs de la variable dépendante. Seulement certaines observations sont affectées : celles dont les caractéristiques des voisins ont changé.

⚠ Attention

Modèle SLX et correction de la dépendance spatiale du modèle MCO de départ

Si le modèle SLX offre une solution intéressante pour régler le potentiel problème d'autocorrélation spatiale des résidus, rien n'assure pour autant qu'il permet de régler tous les problèmes, même si les coefficients associés aux variables décalées spatialement sont statistiquement significatifs. L'inclusion de variables indépendantes additionnelles peut ne pas suffire à capter ce qui, au départ dans la régression par MCO, se cache dans les résidus du modèle. Un test d'autocorrélation spatiale sur les résidus du modèle SLX est un réflexe nécessaire à avoir.

2.1.1.2 Modèle SLX dans R

Pour illustrer la mise en œuvre dans R des différents modèles d'économétrie spatiale, nous utilisons le jeu de données sur Lyon (section 1.1.1). Les modèles seront construits avec comme variable dépendante le dioxyde d'azote (NO_2) et cinq variables sociodémographiques comme variables indépendantes (section 1.1.1). Le modèle MCO (non spatial) a déjà été présenté à la section 1.6.1.

Le modèle SLX est construit avec la fonction `lmSLX` du package `spatialreg` (Bivand, Millo et Piras 2021). Remarquez, dans le code ci-dessous, le paramètre `listw = W.Rook` qui est utilisé pour spécifier la matrice de pondérations spatiales.

```
## Chargement des packages et des données
library(sf)
library(tmap)
library(spdep)
library(spatialreg)
load("data/Lyon.Rdata")
## Matrice de contiguïté selon le partage d'un segment (Rook)
Rook <- poly2nb(LyonIris, queen=FALSE)
W.Rook <- nb2listw(Rook, zero.policy=TRUE, style = "W")
## Construction du modèle MCO
Modele.MCO <- lm(NO2 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                 data = LyonIris)
## Construction du modèle SLX
Modele.SLX <- spatialreg::lmSLX(NO2 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                                listw = W.Rook, # matrice de pondérations spatiales
                                data = LyonIris) # dataframe
```

```
## Résultats du modèle
summary(Modele.SLX)
```

Call:

```
lm(formula = formula(paste("y ~ ", paste(colnames(x)[-1], collapse = "+"))),
    data = as.data.frame(x), weights = weights)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	5.068e+01	4.188e+00	1.210e+01	1.040e-29
Pct0_14	-2.040e-01	6.268e-02	-3.255e+00	1.211e-03
Pct_65	-3.771e-02	5.361e-02	-7.033e-01	4.822e-01
Pct_Img	1.041e-01	4.849e-02	2.146e+00	3.235e-02
Pct_brevet	-7.363e-02	3.550e-02	-2.074e+00	3.857e-02
NivVieMed	-1.844e-01	1.106e-01	-1.667e+00	9.617e-02
lag.Pct0_14	-7.759e-01	1.030e-01	-7.537e+00	2.315e-13
lag.Pct_65	-6.454e-02	9.115e-02	-7.081e-01	4.792e-01
lag.Pct_Img	6.465e-01	8.593e-02	7.524e+00	2.526e-13
lag.Pct_brevet	-3.013e-01	6.157e-02	-4.893e+00	1.344e-06
lag.NivVieMed	-1.805e-02	1.750e-01	-1.031e-01	9.179e-01

⚠ Attention

Effets directs, indirects et totaux

La formulation d'un modèle SLX implique deux types d'effets pour les variables indépendantes (X) :

- les **effets directs**, soit ceux des caractéristiques des entités spatiales. Ils correspondent aux coefficients β des variables indépendantes (X). Autrement dit, pour une observation i , à chaque augmentation d'une unité d'une caractéristique X , la valeur de y_i va varier (augmenter ou diminuer) en fonction du coefficient β .
- les **effets indirects**, soit ceux des caractéristiques des entités spatiales voisines ou proches définies selon la matrice de pondérations spatiales. Ils correspondent aux coefficients θ des variables indépendantes spatialement décalées (WX). Autrement dit, les valeurs de WX des entités spatiales proches ou voisines j de i vont aussi être amenées à varier, impactant alors les valeurs y_i selon les coefficients θ .
- Pour calculer l'impact total, il suffit de sommer son effet direct (β_k) et son effet indirect (θ_k) pour obtenir son effet total.

Le code suivant permet de calculer ces effets directs et indirects.

```
## Effets directs, indirects et totaux (uniquement les coefficients)
impacts(Modele.SLX)
```

Impact measures (SLX, glht):

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-0.20403803	-0.77590830	-0.9799463
Pct_65	-0.03770918	-0.06453809	-0.1022473
Pct_Img	0.10406359	0.64653923	0.7506028
Pct_brevet	-0.07363272	-0.30128171	-0.3749144
NivVieMed	-0.18440960	-0.01804718	-0.2024568

```
## Effets directs, indirects et totaux (coefficients, valeurs de z et de p)
summary(impacts(Modele.SLX))
```

Impact measures (SLX, glht, n-k):

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-0.20403803	-0.77590830	-0.9799463
Pct_65	-0.03770918	-0.06453809	-0.1022473
Pct_Img	0.10406359	0.64653923	0.7506028
Pct_brevet	-0.07363272	-0.30128171	-0.3749144
NivVieMed	-0.18440960	-0.01804718	-0.2024568

Standard errors:

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	0.06268202	0.10295210	0.10045332
Pct_65	0.05361420	0.09114695	0.08556272
Pct_Img	0.04849085	0.08593145	0.08060028
Pct_brevet	0.03549819	0.06157121	0.05975821
NivVieMed	0.11063207	0.17499339	0.14911021

Z-values:

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-3.2551283	-7.5365951	-9.755241
Pct_65	-0.7033432	-0.7080664	-1.194998
Pct_Img	2.1460460	7.5238953	9.312658
Pct_brevet	-2.0742665	-4.8932234	-6.273857
NivVieMed	-1.6668729	-0.1031306	-1.357766

p-values:

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	0.0011334	4.8184e-14	< 2.22e-16
Pct_65	0.4818419	0.47890	0.23209
Pct_Img	0.0318693	5.3069e-14	< 2.22e-16
Pct_brevet	0.0380546	9.9198e-07	3.5221e-10
NivVieMed	0.0955397	0.91786	0.17454

À la lecture des valeurs de p , nous constatons que seule la variable Pct0_14 a un impact direct et indirect significatif au seuil 0,01. L'augmentation d'un point de pourcentage de la population de moins de 15 ans est associé localement à une réduction de 0,20 de la concentration annuelle du dioxyde d'azote. La même augmentation d'un point de pourcentage dans les entités envoient, entraîne une réduction de 0,78. L'effet total est donc une réduction de 0,98.

Dépendance spatiale du modèle SLX?

Ce modèle a-t-il corrigé le problème de dépendance spatiale du modèle de régression linéaire classique? Avec une valeur du I de Moran de 0,605 ($p < 0,001$), les résidus sont toujours fortement autocorrélés spatialement (figure 2.2).

```
lm.morantest(Modele.SLX, W.Rook, alternative="two.sided")
```

Global Moran I for regression residuals

```
data:
model: lm(formula = formula(paste("y ~ ", paste(colnames(x)[-1],
collapse = "+"))), data = as.data.frame(x), weights = weights)
weights: W.Rook
```

Moran I statistic standard deviate = 21.951, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: two.sided

sample estimates:

Observed Moran I	Expectation	Variance
0.6046602748	-0.0072844321	0.0007771643

```
LyonIris$SLX.Residus <- residuals(Modele.SLX)
tm_shape(LyonIris)+
  tm_fill(col="SLX.Residus", n = 5, style = "quantile",
          legend.format = list(text.separator = "à"),
          palette = "-RdBu", title = "Résidus") +
  tm_layout(frame=FALSE) +
  tm_scale_bar(breaks = c(0,5))
```




Figure 2.2: Cartographie des résidus du modèle SLX

2.1.2 Modèle SAR : autocorrélation spatiale sur la variable dépendante

2.1.2.1 Description du Modèle SAR

Une autre spécification consiste à inclure, comme variable additionnelle au modèle de départ, la variable dépendante spatialement décalée, notée $\mathbf{W}\mathbf{y}$. Le modèle, généralement désigné par le terme SAR (*spatial autoregressive*), le modèle prend la forme suivante :

$$\mathbf{y} = \rho \mathbf{W}\mathbf{y} + \iota\alpha + \mathbf{X}\beta + \epsilon \quad (2.3)$$

Où :

- $\mathbf{W}\mathbf{y}$, est un vecteur de la variable dépendante spatialement décalée de dimension $(N \times 1)$.
- ρ est un paramètre (scalaire, donc de dimension (1×1)) autorégressif, qui varie habituellement entre -1 et 1 (autrement un problème de non-stationnarité survient).

Par opposition au modèle SLX, cet ajout nécessite une autre méthode d'estimation que les moindres carrés ordinaires puisque la variable additionnelle du côté droit de l'équation est endogène, elle dépend des valeurs de la variable dépendante, qui elles, dépendent des valeurs prises par les caractéristiques des observations. La simple construction de variables spatialement décalées ne peut être considérée. Le processus générateur des données (PGD) s'exprime donc sous une forme un peu plus complexe, soit :

$$y = (\mathbf{I} - \rho W)^{-1} [\iota\alpha + X\beta + \varepsilon] \quad (2.4)$$

Où :

- $\mathbf{I}$, est une matrice identité, c'est-à-dire une matrice où la diagonale comporte des 1 et où les autres éléments sont nuls, de dimension $(N \times N)$.

Le modèle nécessite une méthode d'estimation appropriée. La première approche, par maximum de vraisemblance, fut proposée dès le départ par Anselin (1988). Cette approche a été largement mobilisée dans les premières applications. Bien qu'intéressante, cette approche repose sur certaines hypothèses, dont la distribution du terme d'erreur et l'absence d'hétéroscédasticité.

Plus récemment, Kelejian et Prucha (1998) ont proposé une approche basée sur les moindres carrés généralisés (MCG). Cette approche a l'avantage d'être plus rapide en plus de permettre de corriger pour la présence d'hétéroscédasticité. Elle a cependant le désavantage de reposer sur l'hypothèse importante d'exogénéité de la matrice de pondérations spatiales, qui sert d'instrument lors du processus d'estimation.

Ce modèle est habituellement qualifié d'**effet de débordement** ou d'**effet d'entraînement**, puisqu'une variation de la valeur de la variable dépendante d'une observation. Comparativement au modèle SLX, les effets marginaux sont identifiés comme étant globaux puisqu'une variation de la valeur de la variable dépendante, introduit une variation dans la valeur des variables dépendantes décalées spatialement qui, à leur tour, influence la variation dans les valeurs dépendantes des observations voisines et ainsi de suite (figure 2.3). Cette boucle de rétroaction peut être interprétée comme la résultante d'un équilibre général spatial.

La dérivée partielle du modèle SAR procure une forme plus complexe :




Figure 2.3: Effets marginaux dans un modèle SAR

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x_k} = (\mathbf{I} - \rho \mathbf{W})^{-1} \beta_k \quad (2.5)$$

C'est donc dire que les effets marginaux sont un peu plus complexes à analyser et à calculer. Une approche classique, celle proposée par LeSage et Pace (2009), consiste à calculer le résultat du produit matriciel, à partir d'une approximation basée sur une somme à perpétuité, et d'extraire la diagonale de la matrice résultante, qui représente l'effet direct, et la somme des éléments hors diagonale, qui représente les effets indirects, afin d'obtenir l'effet marginal total. C'est habituellement cette décomposition qui est proposée par la plupart des logiciels, incluant R. Cette approche peut paraître un peu plus complexe et plus difficilement interprétable puisque les effets marginaux directs ne sont pas définies par les coefficients β_k .

Deux autres approches sont également proposées. Une première, proposée par Abreu *et al.* (2004), reprend la sommation matricielle, mais en proposant une décomposition différente sur la base d'un vocabulaire différent également. Les auteurs proposent néanmoins que le coefficient de régression, β_k , s'interprète comme un effet direct.

Une seconde, proposée par Kim *et al.* (2003), Steimetz (2010), Dubé et Legros (2014) et Dubé *et al.* (2017) consiste essentiellement à tirer profit des propriétés de la matrice de pondérations standardisées en ligne afin d'y proposer une décomposition simple. Dans ce cas, les auteurs proposent les règles suivantes pour calculer les effets marginaux :

- β_k représente l'effet marginal direct.
- $\beta_k (1 - \rho)^{-1}$, ou encore $\frac{\beta_k}{(1-\rho)}$, identifie l'effet marginal total.
- $\rho \beta_k (1 - \rho)^{-1}$, ou encore $\frac{\rho \beta_k}{(1-\rho)}$, représente l'effet marginal indirect peut être obtenu en retranchant l'effet direct de l'effet total.

Des tests non-linéaires peuvent être mobilisés afin de tester la significativité des effets marginaux indirects et totaux, alors que le test de significativité du paramètre procure une façon simple de vérifier si l'effet direct est statistiquement significatif.

Tout comme pour la spécification SLX, rien n'indique pour autant que le modèle SAR permet de capter l'essentiel de l'autocorrélation spatiale résiduelle. Un test sur les résidus doit idéalement être mobilisé pour vérifier cette hypothèse critique. La détection d'une autocorrélation spatiale résiduelle significative peut invalider les résultats obtenus par cette approche.

2.1.2.2 Modèle SAR dans R

Le modèle SAR est construit avec la fonction `lagsarlm` du *package* `spatialreg`.

```
## Construction du modèle
Modele.SAR <- lagsarlm(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                      listw=W.Rook, # matrice de pondérations spatiales
                      data = LyonIris, # dataframe
                      type = 'lag') # Modèle lag par défaut

## Résultats du modèle
summary(Modele.SAR, Nagelkerke=TRUE)
```

```
Call:lagsarlm(formula = N02 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet +
  NivVieMed, data = LyonIris, listw = W.Rook, type = "lag")
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-12.86859	-1.88111	-0.49760	0.94464	18.21351

Type: lag

Coefficients: (asymptotic standard errors)

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	7.838906	1.646232	4.7617	1.919e-06
Pct0_14	-0.098708	0.030554	-3.2306	0.001235
Pct_65	-0.034543	0.026957	-1.2814	0.200044
Pct_Img	0.030241	0.024491	1.2348	0.216917
Pct_brevet	-0.019234	0.017855	-1.0772	0.281384
NivVieMed	-0.098413	0.048985	-2.0090	0.044534

Rho: 0.87939, LR test value: 620.31, p-value: < 2.22e-16

Asymptotic standard error: 0.01942

z-value: 45.283, p-value: < 2.22e-16

Wald statistic: 2050.5, p-value: < 2.22e-16

Log likelihood: -1366.157 for lag model

ML residual variance (sigma squared): 10.181, (sigma: 3.1908)

Nagelkerke pseudo-R-squared: 0.78962

Number of observations: 506

Number of parameters estimated: 8

AIC: 2748.3, (AIC for lm: 3366.6)

LM test for residual autocorrelation

test value: 0.6198, p-value: 0.43112

Dans les résultats ci-dessus, la valeur de Rho est de 0,88 ($LR = 620$, $p < 0,001$), traduisant un très fort effet d'entraînement. Autrement dit, lorsqu'en moyenne la concentration de dioxyde d'azote augmente dans les IRIS voisines (Wy), elle augmente aussi fortement chaque IRIS (y).

Effets directs, indirects et totaux

À nouveau, il est possible d'utiliser la fonction `impacts` pour obtenir les effets marginaux direct et indirects.

```
## Effets directs, indirects et totaux (uniquement les coefficients)
impacts(Modele.SAR, listw = W.Rook, R = 999)
```

```
Impact measures (lag, exact):
```

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-0.13878038	-0.6796248	-0.8184052
Pct_65	-0.04856624	-0.2378349	-0.2864012
Pct_Img	0.04251743	0.2082131	0.2507306
Pct_brevet	-0.02704205	-0.1324283	-0.1594703
NivVieMed	-0.13836534	-0.6775923	-0.8159576

```
## Effets directs, indirects et totaux (coefficients, valeurs de z et de p)
summary(impacts(Modele.SAR, listw = W.Rook, R = 999), zstats = TRUE, short = TRUE)
```

```
Impact measures (lag, exact):
```

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-0.13878038	-0.6796248	-0.8184052
Pct_65	-0.04856624	-0.2378349	-0.2864012
Pct_Img	0.04251743	0.2082131	0.2507306
Pct_brevet	-0.02704205	-0.1324283	-0.1594703
NivVieMed	-0.13836534	-0.6775923	-0.8159576

```
Simulation results ( variance matrix):
```

```
Simulated standard errors
```

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	0.04313045	0.2449654	0.2831264
Pct_65	0.03849640	0.2004078	0.2377760
Pct_Img	0.03456474	0.1818790	0.2154837
Pct_brevet	0.02451980	0.1268538	0.1507881
NivVieMed	0.06965130	0.3675675	0.4337042

```
Simulated z-values:
```

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-3.213636	-2.825405	-2.934139
Pct_65	-1.277323	-1.228225	-1.242002
Pct_Img	1.232238	1.173760	1.188369
Pct_brevet	-1.098273	-1.056580	-1.067462
NivVieMed	-1.988101	-1.878341	-1.911190

```
Simulated p-values:
```

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	0.0013107	0.0047221	0.0033447
Pct_65	0.2014883	0.2193624	0.2142358
Pct_Img	0.2178602	0.2404913	0.2346880

```
Pct_brevet 0.2720852 0.2907035 0.2857632
NivVieMed 0.0468005 0.0603345 0.0559802
```

L'interprétation des effets directs se rapproche de celle des coefficients classiques. Ainsi, selon ce modèle, l'augmentation du niveau de vie médian de 1000 € dans un IRIS est associée avec une diminution moyenne de la concentration de dioxyde d'azote de 0,14 dans cet IRIS. L'effet total est de -0,82, indiquant qu'en moyenne, l'augmentation de 1000 € du niveau de vie médian dans un IRIS est associée avec une diminution moyenne de 0,82 de la concentration de dioxyde d'azote dans l'ensemble des IRIS. Au final, l'effet indirect est simplement la différence entre l'effet total et l'effet direct. Nous pouvons constater ici que les effets indirects sont plus importants que les effets directs.

Dépendance spatiale du modèle SAR?

Ce modèle a-t-il corrigé le problème de dépendance spatiale du modèle de régression linéaire classique? Avec une valeur du I de Moran de -0,014 ($p = 0,654$), les résidus ne sont plus spatialement autocorrélés (figure 2.4).

```
## Autocorrélation spatiale des résidus
moran.mc(resid(Modele.SAR), W.Rook, nsim=999)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: resid(Modele.SAR)
weights: W.Rook
number of simulations + 1: 1000
```

```
statistic = -0.014281, observed rank = 326, p-value = 0.674
alternative hypothesis: greater
```

```
## Cartographie des résidus
LyonIris$SAR.Residus <- resid(Modele.SAR)
tm_shape(LyonIris)+
  tm_fill(col="SAR.Residus", n = 5, style = "quantile",
          legend.format = list(text.separator = "à"),
          palette = "-RdBu", title = "Résidus") +
  tm_layout(frame=FALSE) +
  tm_scale_bar(breaks = c(0,5))
```




Figure 2.4: Cartographie des résidus du modèle SAR

2.1.3 Modèle SEM : autocorrélation spatiale sur le terme d'erreur

2.1.3.1 Description du modèle SEM

L'autocorrélation spatiale résiduelle peut être liée à deux explications simples. La première est liée à **l'omission de variables spatiales importantes et significatives**, et pour laquelle on ne dispose d'aucune information spécifique. La seconde peut provenir d'une **forme d'hétérogénéité spatiale** qui n'est, autrement, pas intégrée à l'analyse. On peut ainsi imaginer que les comportements sont liés dans l'espace pour des raisons qui ne sont pas observables, et encore moins mesurables.

Dans les deux cas, on peut simplement corriger le problème sans pour autant tenter de tirer profit d'une forme spécifique de relations spatiales (externalités, effets d'entraînement). C'est essentiellement dans ces cas que les modèles avec spécifications autorégressive sur les termes d'erreurs (ou SEM – *spatial error model*) peuvent être intéressants : ils ne permettent pas d'apporter une richesse supplémentaire à l'analyse et l'interprétation, mais ils permettent vraisemblablement de corriger pour le problème d'interdépendance des termes d'erreurs. Plus spécifiquement, le modèle SEM s'exprime par la spécification suivante :

$$\mathbf{y} = \iota\alpha + \mathbf{X}\beta + \nu \quad (2.6)$$

$$\nu = \lambda\mathbf{W}\nu + \varepsilon$$

Où :

- $\mathbf{W}$ est une matrice de pondérations spatiales, standardisée en ligne, de dimension $(N \times N)$.
- λ est un paramètre (scalaire, donc de dimension (1×1)) autorégressif, qui varie habituellement entre -1 et 1 (autrement un problème de non-stationnarité survient).
- ν est un vecteur de termes d'erreurs spatialement autocorrélés de dimension $(N \times 1)$.
- ε est un vecteur de termes supposés indépendants de dimension $(N \times 1)$.

La forme réduite du PGD est donné par l'expression suivante :

$$\mathbf{y} = \iota\alpha + \mathbf{X}\beta + (\mathbf{I} - \lambda\mathbf{W})^{-1} \varepsilon \quad (2.7)$$

Où :

- $\mathbf{I}$ est une matrice identité, c'est-à-dire une matrice où la diagonale comporte des 1 et où les autres éléments sont nuls, de dimension $(N \times N)$.

Tout comme pour le cas du modèle SAR, le modèle SEM ne peut être estimé par moindres carrés ordinaires vu la forme complexe que prend le terme d'erreur dans la forme réduite du PGD. Le modèle est habituellement estimé par maximum de vraisemblance.

Un des avantages avec le modèle SEM est que l'interprétation des résultats est similaire à celle que l'on retrouve dans les régressions linéaires classiques. La dérivée partielle de la forme réduite du PGD est simplement égale au coefficient lié à la variable souhaitée :

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}_k} = \mathbf{I} \beta_k \quad (2.8)$$

Or, l'avantage de la structure spatiale des données est justement d'apporter une richesse supplémentaire à l'analyse que l'on ne peut intégrer avec des données a-spatiales. Pour cette raison, les modèles SEM ne sont pas particulièrement prisés par les chercheurs et chercheuses qui tentent d'intégrer l'espace aux modèles. Ils représentent une forme de solution de dernier recours lorsqu'il est impossible de capter la structure résiduelle spatiale autrement.

Tout comme pour les autres spécifications, il est judicieux de vérifier si le modèle permet adéquatement de contrôler pour l'autocorrélation résiduelle. À noter que le modèle SEM peut également mener à une réécriture qui, elle, permet d'intégrer des effets spatiaux qui permettent d'influencer l'interprétation des résultats. Cette forme est désignée par la spécification du modèle Durbin spatial.

2.1.3.2 Modèle SEM dans R

Le modèle SEM est construit avec la fonction `errorsarlm` du *package* `spatialreg`.

```
## Construction du modèle
Modele.SEM <- errorsarlm(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                        listw=W.Rook,      # matrice de pondérations spatiales
                        data = LyonIris) # dataframe

## Résultats du modèle
summary(Modele.SEM, Nagelkerke=TRUE)
```

```
Call:errorsarlm(formula = N02 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet +
  NivVieMed, data = LyonIris, listw = W.Rook)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-12.86150	-1.83161	-0.44106	0.91029	17.94924

Type: error

Coefficients: (asymptotic standard errors)

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	30.544576	2.358173	12.9526	< 2e-16
Pct0_14	-0.035019	0.033393	-1.0487	0.29431
Pct_65	-0.026039	0.028970	-0.8988	0.36874
Pct_Img	-0.016770	0.026176	-0.6407	0.52175
Pct_brevet	0.023708	0.019074	1.2430	0.21388
NivVieMed	-0.146309	0.060273	-2.4274	0.01521

Lambda: 0.91138, LR test value: 613.15, p-value: < 2.22e-16

Asymptotic standard error: 0.01651

z-value: 55.201, p-value: < 2.22e-16

Wald statistic: 3047.2, p-value: < 2.22e-16

Log likelihood: -1369.737 for error model

ML residual variance (sigma squared): 9.9971, (sigma: 3.1618)

Nagelkerke pseudo-R-squared: 0.78662

Number of observations: 506

Number of parameters estimated: 8

AIC: 2755.5, (AIC for lm: 3366.6)

Dans les résultats ci-dessus, la valeur de *lambda* est de 0,91 (LR = 613, $p < 0,001$), traduisant une très forte autocorrélation spatiale sur le terme d'erreur.

Dépendance spatiale du modèle SEM?

Ce modèle a-t-il corrigé le problème de dépendance spatiale du modèle de régression linéaire classique? Avec une valeur du *I* de Moran de -0,013 ($p = 0,614$), les résidus ne sont plus spatialement autocorrélés.

```
## Autocorrélation spatiale des résidus
moran.mc(resid(Modele.SEM), W.Rook, nsim=999)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

data: resid(Modele.SEM)

weights: W.Rook

number of simulations + 1: 1000

statistic = -0.011827, observed rank = 373, p-value = 0.627

alternative hypothesis: greater

Les modèles MCO et SEM sont-ils différents

Pour le vérifier, Pace et Lesage (2008) propose d'appliquer le test de Hausman qui s'interprète comme suit :

- Si $p < 0,05$, alors les coefficient du modèle MCO sont biaisés par l'erreur spatiale et il est préférable d'utiliser le modèle SEM. Cela est le cas pour notre modèle.
- Si $p > 0,05$, les résultats des modèles ne sont différents et l'on peut conserver le modèle MCO.

```
Hausman.test(Modele.SEM)
```

Spatial Hausman test (asymptotic)

data: NULL

Hausman test = -467.64, df = 6, p-value < 2.2e-16

2.1.4 Modèle SDM : autocorrélation spatiale sur la variable dépendante et les variables indépendantes

2.1.4.1 Description du modèle SDM

Le modèle spatial Durbin (SDM - *Spatial Durbin Model*) est un modèle mixte qui permet à la fois d'intégrer la relation spatiale sur la variable dépendante (**effets d'entraînement ou de débordement**) et sur les variables indépendantes (**externalités**). Elle permet, explicitement, de combiner les modèles SLX et SAR bien que son inspiration est issue d'une réécriture de la forme réduite du modèle SEM, où chaque élément est multiplié par le terme $\mathbf{I} - \lambda \mathbf{W}$:

$$\mathbf{y} = \lambda \mathbf{W} \mathbf{y} + \iota \alpha + \mathbf{X} \beta + \mathbf{W} \mathbf{X} \beta \lambda + \varepsilon$$

Où :

- $\beta \lambda$ est un nouvel ensemble de paramètres liés aux variables indépendantes spatialement décalées, qui est habituellement substitué par θ .

Tout comme pour le SEM et le SAR, le modèle SDM ne peut être estimé par moindres carrés ordinaires. Il faut recourir à la méthode du maximum de vraisemblance ou encore à la méthode des moments généralisés. Cette dernière approche offrant une flexibilité plus intéressante pour la présence d'hétéroscédasticité.

De la même manière, les coefficients estimés par le modèle permettent une décomposition plus sophistiquée des effets marginaux. La forme réduite du PGD est donnée par :

$$\mathbf{y} = (\mathbf{I} - \lambda \mathbf{W})^{-1} [\iota \alpha + \mathbf{X} \beta + \mathbf{W} \mathbf{X} \theta + \varepsilon]$$

Ainsi, le calcul des effets marginaux est donné par :

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}_k} = (\mathbf{I} - \lambda \mathbf{W})^{-1} [\mathbf{I} \beta_k + \mathbf{W} \theta_k]$$

En revenant à la proposition de certains auteurs (Kim, Phipps et Anselin 2003; Steimetz 2010; Dubé et Legros 2014; Dubé et al. 2017), les effets marginaux (figure 2.5) peuvent être exprimés par la décomposition suivante lorsque la matrice de pondérations en standardisée en ligne :

- Effet direct : β_k .
- Effet total : $\frac{(\beta_k + \theta_k)}{(1 - \rho)}$.
- Effet indirect : effet total - effet direct = $\frac{(\rho \beta_k + \theta_k)}{(1 - \rho)}$.




Figure 2.5: Effets marginaux dans un modèle SDM

À noter que les logiciels statistiques retournent les effets marginaux sur la base de la décomposition suggérée par LeSage et Pace (2009), issue de l'approximation du produit matriciel. Si l'effet marginal total est identique dans les deux cas, la différence vient essentiellement de la manière de calculer l'effet marginal direct, qui influence également le calcul de l'effet marginal indirect, obtenu par soustraction.

2.1.4.2 Modèle SDM dans R

Le modèle SDM est construit avec la fonction `lagsarlm` du *package* `spatialreg`. Notez que le paramètre `type = "mixed"` spécifie l'utilisation d'un modèle mixte.

```
## Construction du modèle
Modele.DurbinSpatial <- lagsarlm(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                                listw = W.Rook,      # matrice de pondérations spatiales
                                data = LyonIris,      # dataframe
                                type = "mixed")
## Résultats du modèle
summary(Modele.DurbinSpatial, Nagelkerke=TRUE)
```

```
Call:lagsarlm(formula = N02 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet +
              NivVieMed, data = LyonIris, listw = W.Rook, type = "mixed")
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-12.60922	-1.77753	-0.43909	0.99252	18.15526

Type: mixed

Coefficients: (asymptotic standard errors)

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	8.1130457	2.5671301	3.1604	0.001576
Pct0_14	-0.0574046	0.0344908	-1.6643	0.096043
Pct_65	-0.0238715	0.0293647	-0.8129	0.416256
Pct_Img	0.0048364	0.0266560	0.1814	0.856025
Pct_brevet	0.0112746	0.0195259	0.5774	0.563656
NivVieMed	-0.1463876	0.0605853	-2.4162	0.015682
lag.Pct0_14	-0.1242574	0.0581170	-2.1381	0.032512
lag.Pct_65	0.0255480	0.0499646	0.5113	0.609125
lag.Pct_Img	0.1559952	0.0482138	3.2355	0.001214
lag.Pct_brevet	-0.0883930	0.0342496	-2.5809	0.009856
lag.NivVieMed	0.1032469	0.0960201	1.0753	0.282257

Rho: 0.84127, LR test value: 492.38, p-value: < 2.22e-16

Asymptotic standard error: 0.023363

z-value: 36.009, p-value: < 2.22e-16

Wald statistic: 1296.7, p-value: < 2.22e-16

```
Log likelihood: -1353.106 for mixed model
ML residual variance (sigma squared): 9.9845, (sigma: 3.1598)
Nagelkerke pseudo-R-squared: 0.8002
Number of observations: 506
Number of parameters estimated: 13
AIC: 2732.2, (AIC for lm: 3222.6)
LM test for residual autocorrelation
test value: 0.0748, p-value: 0.78447
```

Effets directs, indirects et totaux

```
# Effets directs, indirects et totaux (uniquement les coefficients)
impacts(Modele.DurbinSpatial, listw = W.Rook, R = 999)
```

```
Impact measures (mixed, exact):
```

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-0.12369039	-1.02079497	-1.14448536
Pct_65	-0.02177191	0.03233406	0.01056215
Pct_Img	0.06632543	0.94692639	1.01325182
Pct_brevet	-0.01903815	-0.46681402	-0.48585217
NivVieMed	-0.15403413	-0.11775603	-0.27179016

```
# Effets directs, indirects et totaux (coefficients, valeurs de z et de p)
summary(impacts(Modele.DurbinSpatial, listw = W.Rook, R = 999), zstats = TRUE, short = TRUE)
```

```
Impact measures (mixed, exact):
```

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-0.12369039	-1.02079497	-1.14448536
Pct_65	-0.02177191	0.03233406	0.01056215
Pct_Img	0.06632543	0.94692639	1.01325182
Pct_brevet	-0.01903815	-0.46681402	-0.48585217
NivVieMed	-0.15403413	-0.11775603	-0.27179016

```
=====
Simulation results ( variance matrix):
=====
Simulated standard errors
```

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	0.04233325	0.3363783	0.3630822
Pct_65	0.03845770	0.2839958	0.3088663
Pct_Img	0.03372191	0.2746209	0.2946998
Pct_brevet	0.02560389	0.1958782	0.2128233
NivVieMed	0.06804988	0.4855284	0.5194799

```

Simulated z-values:
```

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-2.9506473	-3.0753362	-3.19318076
Pct_65	-0.5278306	0.1022732	0.02831646
Pct_Img	1.9445652	3.4594030	3.44621469
Pct_brevet	-0.6898820	-2.3845724	-2.27770912
NivVieMed	-2.2677169	-0.2629094	-0.54278877

Simulated p-values:

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	0.0031711	0.00210265	0.0014071
Pct_65	0.5976169	0.91853986	0.9774098
Pct_Img	0.0518273	0.00054137	0.0005685
Pct_brevet	0.4902684	0.01709898	0.0227439
NivVieMed	0.0233465	0.79262043	0.5872752

Dépendance spatiale du modèle SDM?

Avec une valeur du I de Moran de -0,005 ($p = 0,498$), les résidus du modèle SDEM ne sont pas spatialement autocorrélés.

```
moran.mc(resid(Modele.DurbinSpatial), W.Rook, nsim=999)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: resid(Modele.DurbinSpatial)
weights: W.Rook
number of simulations + 1: 1000
```

```
statistic = -0.0046127, observed rank = 496, p-value = 0.504
alternative hypothesis: greater
```

2.1.5 Modèle SDEM : autocorrélation spatiale sur les variables indépendantes et sur le terme d'erreur

2.1.5.1 Description du modèle SDEM


Une autre variante permettant de tirer profit de l'avantage des régressions spatiales, c'est-à-dire l'introduction d'effets liés aux externalités spatiales des observations, consiste à jumeler les modèles SLX et SEM pour obtenir le modèle Durbin avec termes d'erreurs spatialement liés (SDEM - *Spatial Durbin Error Model*). Le modèle s'écrit :

$$\mathbf{y} = \iota\alpha + \mathbf{X}\beta + \mathbf{W}\mathbf{X}\theta + \nu \quad (2.9)$$

$$\nu = \lambda\mathbf{W}\nu + \varepsilon$$

Tout comme pour les spécifications SAR, SEM et SDM, le modèle SDEM ne peut être estimé par la méthode des moindres carrés ordinaires et nécessite une méthode d'estimation appropriée.

Entre le modèle SEM et le modèle SDEM, il est clairement avantageux d'opter pour une spécification SDEM si le but est d'intégrer des effets spatiaux et de tenir compte des possibles relations spatiales dans l'interprétation des résultats de régression. Le calcul des effets marginaux (figure 2.6) permet de tenir compte de la spécificité des externalités spatiales.

$$\frac{\partial y}{\partial \mathbf{x}_k} = \mathbf{I}\beta_k + \mathbf{W}\theta_k \quad (2.10)$$


Modèle SEDM

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{W}\mathbf{X}\boldsymbol{\theta} + \mathbf{v}$$

$$\mathbf{v} = \lambda\mathbf{W}\mathbf{v} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

Figure 2.6: Effets marginaux dans un modèle SDEM

Dans le cas où la matrice de pondérations spatiales, $\mathbf{W}$, est standardisée en ligne, l'interprétation des effets marginaux est plutôt simple et directe :

- β_k est l'effet marginal direct.
- θ_k est l'effet marginal indirect et l'effet d'externalité spatiale.
- $\beta_k + \theta_k$ est l'effet marginal total.

Finalement, comme pour les spécifications précédentes, il est sage de vérifier, avec l'aide d'une statistique générale, si les résidus du modèle permettent de ne pas rejeter l'hypothèse d'indépendance entre les termes d'erreurs. Or, puisque la structure spatiale est explicitement intégrée dans le terme d'erreur du modèle, cette spécification réussit à contrôler le problème de manière efficace.

2.1.5.2 Modèle SDEM dans R

Construction du modèle SDEM dans R

Le modèle SDEM est construit avec la fonction `errorsarlm` du *package* `spatialreg`. Notez que le paramètre `etype = "mixed"` spécifie l'utilisation d'un modèle mixte.

```
## Construction du modèle
Modele.DurbinErreur <- errorsarlm(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                                listw=W.Rook, # matrice de pondérations spatiales
                                data = LyonIris, # dataframe
                                etype = 'emixed')
```



```
## Résultats du modèle
```

```
summary(Modele.DurbinErreur, Nagelkerke=TRUE)
```

```
Call:errorsarlm(formula = N02 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet +
  NivVieMed, data = LyonIris, listw = W.Rook, etype = "emixed")
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-12.99324	-1.82407	-0.45644	1.06084	18.21108

Type: error

Coefficients: (asymptotic standard errors)

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	37.061010	6.501018	5.7008	1.192e-08
Pct0_14	-0.081998	0.041699	-1.9664	0.04925
Pct_65	-0.026329	0.034714	-0.7585	0.44817
Pct_Img	0.004656	0.031028	0.1501	0.88072
Pct_brevet	0.009785	0.023884	0.4097	0.68203
NivVieMed	-0.167855	0.068005	-2.4683	0.01358
lag.Pct0_14	-0.176747	0.102345	-1.7270	0.08417
lag.Pct_65	0.010533	0.089183	0.1181	0.90599
lag.Pct_Img	0.092785	0.079704	1.1641	0.24437
lag.Pct_brevet	-0.038048	0.056688	-0.6712	0.50211
lag.NivVieMed	-0.102531	0.172405	-0.5947	0.55204

Lambda: 0.8976, LR test value: 464.09, p-value: < 2.22e-16

Asymptotic standard error: 0.018242

z-value: 49.204, p-value: < 2.22e-16

Wald statistic: 2421, p-value: < 2.22e-16

Log likelihood: -1367.25 for error model

ML residual variance (sigma squared): 10.046, (sigma: 3.1696)

Nagelkerke pseudo-R-squared: 0.78871

Number of observations: 506

Number of parameters estimated: 13

AIC: 2760.5, (AIC for lm: 3222.6)

Effets directs, indirects et totaux

```
## Effets directs, indirects et totaux (uniquement les coefficients)
```

```
impacts(Modele.DurbinErreur, listw = W.Rook, R = 999)
```

Impact measures (SDEM, glht):

	Direct	Indirect	Total
--	--------	----------	-------

```
Pct0_14    -0.081997642 -0.17674683 -0.25874447
Pct_65     -0.026329370  0.01053248 -0.01579689
Pct_Img     0.004656039  0.09278511  0.09744115
Pct_brevet  0.009784961 -0.03804813 -0.02826317
NivVieMed  -0.167855498 -0.10253070 -0.27038620
```

```
## Effets directs, indirects et totaux (coefficients, valeurs de z et de p)
summary(impacts(Modele.DurbinErreur, listw = W.Rook, R = 999), zstats = TRUE, short = TRUE)
```

Impact measures (SDEM, glht, n):

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-0.081997642	-0.17674683	-0.25874447
Pct_65	-0.026329370	0.01053248	-0.01579689
Pct_Img	0.004656039	0.09278511	0.09744115
Pct_brevet	0.009784961	-0.03804813	-0.02826317
NivVieMed	-0.167855498	-0.10253070	-0.27038620

Standard errors:

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	0.04169878	0.10234506	0.13146453
Pct_65	0.03471367	0.08918350	0.11192948
Pct_Img	0.03102807	0.07970364	0.09949722
Pct_brevet	0.02388387	0.05668833	0.07344175
NivVieMed	0.06800483	0.17240549	0.21172909

Z-values:

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-1.9664279	-1.7269698	-1.9681695
Pct_65	-0.7584727	0.1180989	-0.1411325
Pct_Img	0.1500589	1.1641264	0.9793354
Pct_brevet	0.4096890	-0.6711810	-0.3848379
NivVieMed	-2.4682880	-0.5947067	-1.2770385

p-values:

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	0.049249	0.084173	0.049049
Pct_65	0.448168	0.905989	0.887765
Pct_Img	0.880718	0.244373	0.327414
Pct_brevet	0.682034	0.502105	0.700358
NivVieMed	0.013576	0.552040	0.201589

Dépendance spatiale du modèle SDEM?

Avec une valeur du I de Moran de -0,010 ($p = 0,619$), les résidus du modèle SDEM ne sont pas spatialement autocorrélés.

```
moran.mc(resid(Modele.DurbinErreur), W.Rook, nsim=999)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: resid(Modele.DurbinErreur)
weights: W.Rook
number of simulations + 1: 1000
```

```
statistic = -0.010362, observed rank = 390, p-value = 0.61
alternative hypothesis: greater
```

2.1.6 Modèle généralisé : autocorrélation spatiale de l'ensemble des variables et composantes du modèle

2.1.6.1 Description du modèle généralisé

Le modèle spatial généralisé (*Manski model* en anglais), qui est essentiellement une extension du modèle SDM lorsque le processus autorégressif est ajouté aux termes d'erreurs, permet une représentation complète des possibilités. Il permet également de réfléchir à une stratégie du général vers le particulier pour la sélection de la spécification finale :

$$\mathbf{y} = \lambda \mathbf{W} \mathbf{y} + \iota \alpha + \mathbf{X} \beta + \mathbf{W} \mathbf{X} \theta + \nu \quad (2.11)$$

$$\nu = \lambda \mathbf{W} \nu + \varepsilon$$

La spécification tient compte, tout comme le modèle SDM, des effets de débordements (ou effets d'entraînement) spatiaux ainsi que des effets d'externalités spatiales.

Le modèle spatial généralisé ne peut être estimé par moindres carrés ordinaires. Il faut recourir à la méthode du maximum de vraisemblance ou encore à la méthode des moments généralisés. Cette dernière approche offrant une flexibilité intéressante pour la présence d'hétéroscédasticité.

D'une part, certains auteurs notent que des problèmes peuvent survenir lorsque les matrices de pondérations spatiales mobilisées pour estimer le modèle sont identiques pour l'ensemble des processus autorégressifs (Le Gallo 2002; Anselin et Bera 1998). D'autre part, Elhorst (2014) suggère d'estimer d'abord cette spécification afin de faire un choix de modèle, puisqu'il procure une structure emboîtée (voir section suivante).

2.1.6.2 Modèle généralisé (Manski) dans R

```
## Construction du modèle
Modele.Manski <- saccsarlml(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                           listw=W.Rook, # matrice de pondérations spatiales
                           data = LyonIris, # dataframe
                           type="sacmixed")

## Résultats du modèle
summary(Modele.Manski, Nagelkerke=TRUE)
```

```
Call:saccsarlml(formula = N02 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet +
  NivVieMed, data = LyonIris, listw = W.Rook, type = "sacmixed")
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-12.54832	-1.80538	-0.43054	0.99266	18.04011

Type: sacmixed

Coefficients: (asymptotic standard errors)

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	7.7927132	2.8939671	2.6927	0.007087
Pct0_14	-0.0555696	0.0347795	-1.5978	0.110094
Pct_65	-0.0233490	0.0294070	-0.7940	0.427199
Pct_Img	0.0035044	0.0268385	0.1306	0.896114
Pct_brevet	0.0122230	0.0196832	0.6210	0.534608
NivVieMed	-0.1463864	0.0606995	-2.4117	0.015880
lag.Pct0_14	-0.1211022	0.0602980	-2.0084	0.044601
lag.Pct_65	0.0258497	0.0495836	0.5213	0.602133
lag.Pct_Img	0.1541563	0.0497015	3.1016	0.001924
lag.Pct_brevet	-0.0874516	0.0348103	-2.5122	0.011997
lag.NivVieMed	0.1050658	0.0955590	1.0995	0.271556

Rho: 0.84762

Asymptotic standard error: 0.037124

z-value: 22.832, p-value: < 2.22e-16

Lambda: -0.027606

Asymptotic standard error: 0.11539

z-value: -0.23924, p-value: 0.81092

LR test value: 646.48, p-value: < 2.22e-16

Log likelihood: -1353.074 for sacmixed model

ML residual variance (sigma squared): 9.9326, (sigma: 3.1516)

Nagelkerke pseudo-R-squared: 0.80022

Number of observations: 506

Number of parameters estimated: 14

AIC: 2734.1, (AIC for lm: 3366.6)

```
## Effets marginaux
impacts(Modele.Manski, listw=W.Rook)
```

```
Impact measures (sacmixed, exact):
```

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-0.12204341	-1.03736491	-1.1594083
Pct_65	-0.02095459	0.03736568	0.0164111
Pct_Img	0.06560041	0.96904739	1.0346478
Pct_brevet	-0.01824321	-0.47544430	-0.4936875
NivVieMed	-0.15390071	-0.11726571	-0.2711664

```
summary(impacts(Modele.Manski, listw=W.Rook, R=500), zstats=TRUE)
```

```
Impact measures (sacmixed, exact):
```

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-0.12204341	-1.03736491	-1.1594083
Pct_65	-0.02095459	0.03736568	0.0164111
Pct_Img	0.06560041	0.96904739	1.0346478
Pct_brevet	-0.01824321	-0.47544430	-0.4936875
NivVieMed	-0.15390071	-0.11726571	-0.2711664

```
Simulation results ( variance matrix):
```

```
Direct:
```

```
Iterations = 1:500
Thinning interval = 1
Number of chains = 1
Sample size per chain = 500
```

1. Empirical mean and standard deviation for each variable,
plus standard error of the mean:

	Mean	SD	Naive SE	Time-series SE
Pct0_14	-0.12309	0.04345	0.001943	0.001783
Pct_65	-0.02095	0.03771	0.001686	0.001965
Pct_Img	0.06692	0.03177	0.001421	0.001421
Pct_brevet	-0.01831	0.02663	0.001191	0.001191
NivVieMed	-0.15027	0.06447	0.002883	0.002883

2. Quantiles for each variable:

	2.5%	25%	50%	75%	97.5%
Pct0_14	-0.204570	-0.15333	-0.12430	-0.092487	-0.03728
Pct_65	-0.096052	-0.04567	-0.02020	0.005465	0.05178
Pct_Img	0.003739	0.04677	0.06552	0.088509	0.13221

Pct_brevet -0.078183 -0.03542 -0.01767 -0.001097 0.03183
 NivVieMed -0.265452 -0.18750 -0.14710 -0.108946 -0.02633

=====

Indirect:

Iterations = 1:500
 Thinning interval = 1
 Number of chains = 1
 Sample size per chain = 500

1. Empirical mean and standard deviation for each variable,
 plus standard error of the mean:

	Mean	SD Naive	SE Time-series	SE
Pct0_14	-1.07768	0.3917	0.01752	0.01752
Pct_65	0.03302	0.3233	0.01446	0.01446
Pct_Img	1.00505	0.3131	0.01400	0.01400
Pct_brevet	-0.49166	0.2275	0.01018	0.01018
NivVieMed	-0.14521	0.5648	0.02526	0.02526

2. Quantiles for each variable:

	2.5%	25%	50%	75%	97.5%
Pct0_14	-1.9557	-1.2934	-1.04291	-0.8189	-0.4021
Pct_65	-0.5794	-0.1663	0.02325	0.2109	0.7024
Pct_Img	0.4985	0.7839	0.97179	1.1679	1.7026
Pct_brevet	-0.9757	-0.6274	-0.47703	-0.3387	-0.1124
NivVieMed	-1.2659	-0.5114	-0.13502	0.2345	0.9028

=====

Total:

Iterations = 1:500
 Thinning interval = 1
 Number of chains = 1
 Sample size per chain = 500

1. Empirical mean and standard deviation for each variable,
 plus standard error of the mean:

	Mean	SD Naive	SE Time-series	SE
Pct0_14	-1.20077	0.4178	0.01869	0.01869
Pct_65	0.01207	0.3472	0.01553	0.01553
Pct_Img	1.07196	0.3297	0.01475	0.01475
Pct_brevet	-0.50997	0.2454	0.01097	0.01097
NivVieMed	-0.29548	0.5971	0.02670	0.02670

2. Quantiles for each variable:

	2.5%	25%	50%	75%	97.5%
Pct0_14	-2.1103	-1.4406	-1.16962	-0.9276	-0.45479
Pct_65	-0.6537	-0.2024	0.01395	0.2141	0.73072
Pct_Img	0.5221	0.8384	1.03604	1.2431	1.81636
Pct_brevet	-1.0478	-0.6601	-0.49537	-0.3485	-0.09618
NivVieMed	-1.5437	-0.6696	-0.28987	0.1126	0.82184

=====

Simulated standard errors

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	0.04344701	0.3917346	0.4178141
Pct_65	0.03770769	0.3233064	0.3472158
Pct_Img	0.03177030	0.3131371	0.3297464
Pct_brevet	0.02662754	0.2275251	0.2453594
NivVieMed	0.06446729	0.5647968	0.5970849

Simulated z-values:

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	-2.8330900	-2.7510378	-2.87392371
Pct_65	-0.5555050	0.1021355	0.03477447
Pct_Img	2.1062238	3.2096089	3.25087128
Pct_brevet	-0.6877408	-2.1609089	-2.07847653
NivVieMed	-2.3310000	-0.2571035	-0.49487848

Simulated p-values:

	Direct	Indirect	Total
Pct0_14	0.004610	0.0059407	0.0040541
Pct_65	0.578549	0.9186491	0.9722596
Pct_Img	0.035185	0.0013292	0.0011505
Pct_brevet	0.491616	0.0307024	0.0376655
NivVieMed	0.019753	0.7970989	0.6206859

```
## Autocorrélation spatiale des résidus
moran.mc(resid(Modele.Manski), W.Rook, nsim=999)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: resid(Modele.Manski)
weights: W.Rook
number of simulations + 1: 1000
```

statistic = -0.0009215, observed rank = 498, p-value = 0.502

alternative hypothesis: greater

2.2 Quel modèle choisir?

Évidemment, la question qui brûle les lèvres est de savoir quelle spécification devrait-on retenir pour l'analyse empirique et la présentation des résultats? Deux avenues sont possibles.

D'une part, il est possible que certains impératifs théoriques guident la chercheuse ou le chercheur vers une spécification particulière. Ainsi, si l'on cherche à vérifier comment les caractéristiques des milieux avoisinants influencent une variable d'intérêt, alors les spécifications SLX ou SDEM sont à privilégier puisqu'elle permet explicitement d'aborder la question. Si l'intérêt est de voir comment une variation locale d'une variable d'intérêt peut avoir des influences à la grandeur du territoire, alors la spécification SAR est probablement à privilégier puisqu'elle permet d'évaluer l'impact spatial « global » d'un changement à microéchelle. Il est également possible qu'une question de recherche trouve un écho parmi les deux possibilités, dans lequel des cas le modèle SDM d'avère intéressant.

Si un chercheur souhaite essentiellement corriger la présence d'autocorrélation spatiale entre les résidus sans intégrer explicitement de liens spatiaux dans l'interprétation du modèle, alors la spécification SEM peut s'avérer intéressante. Il faut néanmoins avouer que cette correction de l'autocorrélation spatiale n'apporte que peu d'intérêt au niveau de l'interprétation outre corriger les écarts-types des coefficients estimés.

D'autre part, le choix peut également être basé sur des considérations plus statistiques. En lequel des cas le chercheur souhaite identifier, sur la base de critères préalablement définis, le modèle qui offre la performance la meilleure. Bien que le test de Moran permette de détecter la présence d'autocorrélation spatiale dans les résidus, le test n'est malheureusement pas mobilisable pour tenter d'identifier une spécification préférable.

Il existe trois différentes stratégies de tests : les tests de ratio de vraisemblance, qui nécessitent l'estimation des modèles contraints (les spécifications linéaires classiques) et non contraints (les modèles économétriques spatiaux); les tests de Wald, qui nécessitent aussi l'estimation des modèles contraints et non contraints; et les tests du multiplicateur de Lagrange (ou test LM), qui nécessitent uniquement l'estimation des modèles contraints.

2.2.1 Tests du multiplicateur de Lagrange (LM) sur le modèle MCO

Une procédure relativement simple existe pour discriminer entre les spécifications SAR, SEM et MCO. Puisque les modèles contraints sont relativement simples et directs, les tests LM sont souvent privilégiés en pratique. Ces tests (en version simple et robuste) ont été largement popularisés par Anselin *et al.* (1996) pour vérifier si le recours à un modèle autorégressif est nécessaire, comparativement à un modèle de régression classique (MCO).

Les tests sont calculés sur la base des estimations obtenues par MCO pour la spécification linéaire classique et avec l'aide d'une matrice de pondérations spatiales préalablement identifiées et calculées. Pour chaque spécification des modèles économétriques spatiaux, il existe une forme spécifique pour les tests-LM. Comment alors comparer les différentes statistiques pour identifier la spécification à retenir?

La démarche générale suivante, schématisée à la figure 2.7, peut être utilisée pour guider le choix d'une spécification :

1. Si toutes les valeurs des tests (simples et robustes) sont non significatives ($p > 0,05$), alors le recours à un modèle autorégressif n'est pas nécessaire. Nous pouvons conserver le modèle de régression classique (MCO).




Figure 2.7: Démarche pour choisir entre les modèles MCO, SAR et SEM

2. Si les valeurs de `LMlag` ou `RLMlag` sont non significatives ($p > 0,05$), alors le recours au modèle SAR n'est pas nécessaire.
3. Si les valeurs de `LMerr` ou `RLMerr` sont non significatives ($p > 0,05$), alors le recours au modèle SEM n'est pas nécessaire.
4. Si les valeurs de `RLMlag` et `RLMerr` sont significatives ($p < 0,001$), nous choisissons le modèle ayant la plus forte statistique.
 - Si `RLMlag` > `RLMerr`, il est suggéré d'utiliser la spécification SAR.
 - Si `RLMerr` > `RLMlag`, il est suggéré d'utiliser la spécification SEM.

Dans R, ces tests LM sont calculés sur le modèle MCO avec la fonction `lm.LMtests` et une matrice de pondérations spatiales. Dans les résultats ci-dessous, nous ne retenons pas le modèle SEM car la valeur de 0,740 pour le `RLMerr` n'est pas significative ($p = 0,3898$). Par contre, les valeurs de `LMlag` et de `RLMlag` (555 et 123) sont significatives, ce qui justifie la sélection du modèle SAR.

```
summary(lm.LMtests(model = Modele.MCO,
  listw = W.Rook,
  test = c("LMlag", "LMerr", "RLMlag", "RLMerr")))
```

Rao's score (a.k.a Lagrange multiplier) diagnostics for spatial dependence

data:

```
model: lm(formula = N02 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet +
  NivVieMed, data = LyonIris)
```

```
test weights: listw
```

	statistic	parameter	p.value
RSlag	554.65778	1	<2e-16 ***
RSerr	432.83282	1	<2e-16 ***
adjRSlag	122.56452	1	<2e-16 ***
adjRSerr	0.73955	1	0.3898

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

2.2.2 Tests du ratio de vraisemblance sur les modèles spatiaux

En partant de la structure emboîtée que représente le modèle spatial généralisé, il est possible de proposer une stratégie qualifiée de « général vers le particulier » à partir de la significativité des différents paramètres associés aux variables décalées spatialement (figure 2.8). Cette stratégie, basée sur les tests de ratios de vraisemblance qui sont issus de l'estimation des modèles non contraints, de la forme la plus générale, et des modèles contraints, la forme la plus spécifique (Elhorst 2014).

En comparant la vraisemblance des modèles, il est possible de vérifier si les deux spécifications sont relativement similaires. Si les vraisemblances sont similaires, la spécification contrainte est préférée à celle non contrainte puisque plus parcimonieuse, c'est-à-dire qu'elle permet d'exprimer le même type de relations avec moins de paramètres. Si les vraisemblances sont trop différentes, la spécification générale est alors préférée puisqu'elle permet de mieux expliquer la variable dépendante.

Cette procédure permet également de discriminer entre certaines spécifications intégrant plusieurs processus autorégressifs, tels que les modèles SDM et SDEM par rapport, respectivement, aux modèles SAR et SLX, et SEM et SLX. Elle permet également d'orienter le choix d'une forme fonctionnel sur un processus de sélection complet puisqu'il considère toutes les formes fonctionnelles et les variantes possibles.




Figure 2.8: Démarche à partir du modèle généralisé (modèle Manski)

Note**Description de la stratégie « général vers le particulier »**

Globalement, la procédure est la suivante :

Étape A. Sélection d'un modèle mixte à partir des coefficients autorégressifs du modèle généralisé :

1. Si la valeur du coefficient λ (lambda) n'est pas significativement différente de 0, alors nous calculons le modèle mixte SDM.
2. Si la valeur du coefficient ρ (rho) n'est pas significativement différente de 0, alors nous calculons le modèle mixte SDEM.

Étape B. Sélection du modèle SLX

3. Si les valeurs des coefficients ρ du modèle SDM et λ du modèle SDEM ne sont pas significativement différentes de 0 alors nous retenons le modèle SLX.

Étape C. Sélection d'un modèle sans effets mixtes

4. Si la valeur du coefficient ρ du SDM est significativement différente de 0, mais que toutes les coefficients θ (theta) des variables indépendantes spatialement décalées WX ne sont pas différentes de 0, alors nous retenons le modèle SAR.
5. Si la valeur du coefficient λ du SDEM est significativement différente de 0, mais que toutes les coefficients θ (theta) des variables indépendantes spatialement décalées WX ne sont pas différentes de 0, alors nous retenons le modèle SEM.

Étape D. Choix du modèle MCO

6. Si les tous coefficients θ (theta) des variables indépendantes spatialement décalées WX du modèle SLX ne sont pas différentes de 0, alors nous retenons le modèle aspatial (MCO).
7. Si le coefficient ρ (rho) du modèle SAR n'est pas significativement différent de 0, alors nous retenons le modèle aspatial (MCO).

Appliquons la stratégie « général vers le particulier » à notre jeu de données. Pour l'étape A, nous constatons que le coefficient lambda n'est pas significativement différent de 0 ($\lambda = -0,028$, $p = 0,811$), contrairement à celle de rho ($\rho = 0,848$, $p < 0,001$). Par conséquent, nous construisons uniquement le modèle SDM.

```
formule <- 'N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed'
# Étape A. Sélection d'un modèle mixte à partir
# des coefficients autorégressifs du modèle généralisé
Manski <- saccarlm(formule, listw=W.Rook, data = LyonIris, type="sacmixed")
Manski.lambda <- list(lambda = Manski$lambda,
                      se = Manski$lambda.se,
                      z = Manski$lambda / Manski$lambda.se,
                      p = 2 * (1 - pnorm(abs(Manski$lambda / Manski$lambda.se))))

Manski.rho <- list(rho = Manski$rho,
                  se = Manski$rho.se,
                  z = Manski$rho / Manski$rho.se,
                  p = 2 * (1 - pnorm(abs(Manski$rho / Manski$rho.se))))

Resultats.Manski <- data.frame(Parametre = c("lambda", "Rho"),
                              Coef = c(Manski.lambda$lambda, Manski.rho$rho),
                              z = c(Manski.lambda$z, Manski.rho$z),
                              p = c(Manski.lambda$p, Manski.rho$p)
                              )
```

Tableau 2.2: Résultats des coefficients autorégressifs du modèle généralisés

Parametre	Coef	z	p
lambda	-0,028	-0,239	0,811
Rho	0,848	22,832	0,000

Les résultats du modèle SDM montre que :

1. Le coefficient rho ($\rho = 0,841$, $p < 0,001$) est différent de 0, nous écartons le modèle SLX.
2. Plusieurs coefficients θ (theta) des variables indépendantes spatialement décalées **WX** sont pas différentes de 0, notamment lag.Pct_Img et lag.Pct_brevet, nous écartons aussi le modèle SAR.
3. Au final, nous retenons donc le modèle SDM.

```
Manski <- saccarlm(formule, listw=W.Rook, data = LyonIris, type="sacmixed")
SDM <- lagsarlm(formule, listw = W.Rook, data = LyonIris, type = "mixed")
summary(SDM)
```

```
Call:lagsarlm(formula = formule, data = LyonIris, listw = W.Rook,
              type = "mixed")
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-12.60922	-1.77753	-0.43909	0.99252	18.15526

Type: mixed

Coefficients: (asymptotic standard errors)

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	8.1130457	2.5671301	3.1604	0.001576
Pct0_14	-0.0574046	0.0344908	-1.6643	0.096043
Pct_65	-0.0238715	0.0293647	-0.8129	0.416256
Pct_Img	0.0048364	0.0266560	0.1814	0.856025
Pct_brevet	0.0112746	0.0195259	0.5774	0.563656
NivVieMed	-0.1463876	0.0605853	-2.4162	0.015682
lag.Pct0_14	-0.1242574	0.0581170	-2.1381	0.032512
lag.Pct_65	0.0255480	0.0499646	0.5113	0.609125
lag.Pct_Img	0.1559952	0.0482138	3.2355	0.001214
lag.Pct_brevet	-0.0883930	0.0342496	-2.5809	0.009856
lag.NivVieMed	0.1032469	0.0960201	1.0753	0.282257

Rho: 0.84127, LR test value: 492.38, p-value: < 2.22e-16

Asymptotic standard error: 0.023363

z-value: 36.009, p-value: < 2.22e-16

Wald statistic: 1296.7, p-value: < 2.22e-16

Log likelihood: -1353.106 for mixed model

ML residual variance (sigma squared): 9.9845, (sigma: 3.1598)

Number of observations: 506

Number of parameters estimated: 13

AIC: 2732.2, (AIC for lm: 3222.6)

LM test for residual autocorrelation

test value: 0.0748, p-value: 0.78447

2.2.3 Comparaison des modèles mixtes et non mixtes

Avec les tests du ratio de vraisemblance sur les modèles spatiaux, nous pouvons vérifier dans R de vérifier si le recours d'un modèle mixte est justifié comparativement à un modèle non mixte. Dans le code ci-dessous, nous vérifions si le modèle SDM est statistiquement différent du modèle SAR avec les fonctions `LR.Sarlm` et `anova`. Les résultats signalent un écart significatif des valeurs du log-vraisemblance (26,101, $p < 0,001$). Par conséquent, ce modèle mixte a un apport significatif.

```
## SDM et SEM sont-ils significativement différents?
LR.Sarlm(Modele.DurbinSpatial, Modele.SAR)
```

Likelihood ratio for spatial linear models

data:

Likelihood ratio = 26.101, df = 5, p-value = 8.528e-05

sample estimates:

Log likelihood of Modele.DurbinSpatial	Log likelihood of Modele.SAR
-1353.106	-1366.157

```
anova(Modele.DurbinSpatial, Modele.SAR)
```

	Model	df	AIC	logLik	Test	L.Ratio	p-value
Modele.DurbinSpatial	1	13	2732.2	-1353.1	1		
Modele.SAR	2	8	2748.3	-1366.2	2	26.101	8.5283e-05

À l'inverse, la différence entre les valeurs du log-vraisemblance des modèles SDEM et SEM n'est pas significative (4,9728, $p = 0,42$), signalant que l'utilisation d'un modèle SDEM comparativement à un modèle SEM n'est pas nécessaire.

```
## SDEM et SEM sont-ils significativement différents?
LR.Sarlm(Modele.DurbinErreur, Modele.SEM)
```

Likelihood ratio for spatial linear models

data:

Likelihood ratio = 4.9728, df = 5, p-value = 0.4192

sample estimates:

Log likelihood of Modele.DurbinErreur	Log likelihood of Modele.SEM
-1367.250	-1369.737

```
anova(Modele.DurbinErreur, Modele.SEM)
```

	Model	df	AIC	logLik	Test	L.Ratio	p-value
Modele.DurbinErreur	1	13	2760.5	-1367.2	1		
Modele.SEM	2	8	2755.5	-1369.7	2	4.9728	0.4192

2.2.4 Mesures AIC et BIC et dépendance spatiale

Bien que la procédure de test précédente soit intéressante, elle peut néanmoins mener à une certaine difficulté dans l'identification de la forme fonctionnelle préférable. Un arbitrage peut alors être mené à partir de statistiques alternatives telles que les critères d'information.

Le critère d'information d'Akaike (AIC) et le critère d'information bayésien (BIC) sont largement utilisés pour évaluer la qualité d'ajustement du modèle. Plus leurs valeurs sont faibles, plus la spécification est intéressante pour expliquer la variabilité de la variable dépendante, et moins la variabilité du terme d'erreur est grande. Il est donc possible de

comparer les valeurs des différents critères afin d'orienter le choix de la spécification finales (MCO, SLX, SAR, SEM, SDM et SDEM).

Nous pouvons aussi comparer l'autocorrélation spatiale des résidus des modèles avec le I de Moran.

```
## Valeurs d'AIC et de BIC
AICs <- AIC(Modele.MCO, Modele.SLX, Modele.SAR, Modele.SEM,
            Modele.DurbinSpatial, Modele.DurbinErreur)
BICs <- BIC(Modele.MCO, Modele.SLX, Modele.SAR, Modele.SEM,
            Modele.DurbinSpatial, Modele.DurbinErreur)
## Autocorrélation spatiale des résidus
IMoran.MCO <- moran.mc(resid(Modele.MCO), W.Rook, nsim=999)
IMoran.SLX <- moran.mc(resid(Modele.SLX), W.Rook, nsim=999)
IMoran.SLM <- moran.mc(resid(Modele.SAR), W.Rook, nsim=999)
IMoran.SEM <- moran.mc(resid(Modele.SEM), W.Rook, nsim=999)
IMoran.DurbinS <- moran.mc(resid(Modele.DurbinSpatial), W.Rook, nsim=999)
IMoran.DurbinE <- moran.mc(resid(Modele.DurbinErreur), W.Rook, nsim=999)
MoranI.s <- c(IMoran.MCO$statistic, IMoran.SLX$statistic,
              IMoran.SLM$statistic, IMoran.SEM$statistic,
              IMoran.DurbinS$statistic, IMoran.DurbinE$statistic)
MoranI.p <- c(IMoran.MCO$p.value, IMoran.SLX$p.value,
              IMoran.SLM$p.value, IMoran.SEM$p.value,
              IMoran.DurbinS$p.value, IMoran.DurbinE$p.value)
## Tableau
Comparaison <- data.frame(Modele = c("MCO", "SLX", "SAR", "SEM", "SDM", "SDEM"),
                          AIC = AICs$AIC,
                          BIC = BICs$BIC,
                          dl = AICs$df,
                          MoranI = MoranI.s,
                          MoranIp = MoranI.p)
Comparaison
```

	Modele	AIC	BIC	dl	MoranI	MoranIp
1	MCO	3366.626	3396.212	7	0.587312061	0.001
2	SLX	3222.594	3273.313	12	0.604660275	0.001
3	SAR	2748.314	2782.126	8	-0.014281059	0.660
4	SEM	2755.474	2789.286	8	-0.011826605	0.668
5	SDM	2732.212	2787.157	13	-0.004612686	0.508
6	SDEM	2760.501	2815.446	13	-0.010361653	0.612

Quelques lignes de code suffisent pour créer deux graphiques permettant de comparer visuellement les résultats des différents modèles (figure 2.9). Les résultats démontrent que :

- Les modèles MCO et SLX ont un problème de dépendance spatiale puisque leurs résidus sont significativement autocorrélés spatialement. Par conséquent, ils ne devraient pas être retenus.
- Les modèles SDM, SAR et SEM sont les plus performants avec les valeurs d'AIC les plus faibles.

```
library(ggplot2)
library(ggpubr)
## Graphique pour l'autocorrélation spatiale
g1 <- ggplot(data=Comparaison, aes(x=reorder(Modele, MoranI), y=MoranI)) +
  geom_segment(aes(x=reorder(Modele, MoranI),
    xend=reorder(Modele, MoranI),
    y=0, yend=MoranI)) +
  geom_point(size=4, fill="red", shape=21)+
  xlab("Modèle") + ylab("I de Moran")+
  labs(title="Autocorrélation spatiale des résidus",
    caption="Plus la valeur du I de Moran est faible, \nmoins il y a d'autocorrélation spatiale.")
## Graphique pour les valeurs d'AIC
g2 <- ggplot(data=Comparaison, aes(x=reorder(Modele, AIC), y=AIC)) +
  geom_segment(aes(x=reorder(Modele, AIC),
    xend=reorder(Modele, AIC),
    y=0, yend=AIC)) +
  geom_point(size=4, fill="red", shape=21)+
  xlab("Modèle") + ylab("AIC")+
  labs(title="Qualité d'ajustement du modèle",
    caption="Plus la valeur d'AIC est faible, \nplus le modèle est performant.")
## Figure avec les deux graphiques
ggarrange(g1, g2)
```




Figure 2.9: Comparaison des différents modèles

 Astuce**Quelques lignes de code pour tous les modèles!**

```

formule <- 'N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed'
MCO     <- lm(formule, data = LyonIris)
SLX     <- lmSLX(formule, listw = W.Rook, data = LyonIris)
SDM     <- lagsarlm(formule, listw = W.Rook, data = LyonIris, type = "mixed")
SDEM    <- errorsarlm(formule, listw=W.Rook, data = LyonIris, etype = 'emixed')
SAR     <- lagsarlm(formule, listw=W.Rook, data = LyonIris, type = 'lag')
SEM     <- errorsarlm(formule, listw=W.Rook, data = LyonIris)
Manski  <- sacsarlml(formule, listw=W.Rook, data = LyonIris, type="sacmixed")

```

2.3 Quiz de révision

Questions

- Dans un modèle SLX, la matrice de pondération spatiale est appliquée au niveau de :
 - Variable dépendante
 - Variables indépendantes
 - Terme d'erreur
 - Variable dépendante et variables indépendantes
 - Variable dépendante et terme d'erreur

Relisez au besoin la section [2.1.1](#).

- Dans un modèle SAR, la matrice de pondération spatiale est appliquée au niveau de :
 - Variable dépendante
 - Variables indépendantes
 - Terme d'erreur

Relisez au besoin la section [2.1.2](#).

- Dans un modèle SEM, la matrice de pondération spatiale est appliquée au niveau de :
 - Variable dépendante
 - Variables indépendantes
 - Terme d'erreur

Relisez au besoin la section [2.1.3](#).

- Dans un modèle mixte SDM, la matrice de pondération spatiale est appliquée au niveau de :
 - Variable dépendante
 - Variables indépendantes
 - Terme d'erreur

Relisez au besoin la section 2.1.4.

- Dans un modèle SDEM, la matrice de pondération spatiale est appliquée au niveau de :
 - Variable dépendante
 - Variables indépendantes
 - Terme d'erreur

Relisez au besoin la section 2.1.5.

- Quelle est la procédure popularisée par Luc Anselin pour discriminer entre les spécifications SAR, SEM et MCO?
 - Tests du multiplicateur de Lagrange (LM) sur le modèle MCO
 - Mesures AIC et BIC
 - I de Moran
 - Tests du ratio de vraisemblance sur les modèles spatiaux

Relisez au besoin la section 2.2.1.

Réponses

- Dans un modèle SLX, la matrice de pondération spatiale est appliquée au niveau de :
 - Variables indépendantes
- Dans un modèle SAR, la matrice de pondération spatiale est appliquée au niveau de :
 - Variable dépendante
- Dans un modèle SEM, la matrice de pondération spatiale est appliquée au niveau de :
 - Terme d'erreur
- Dans un modèle mixte SDM, la matrice de pondération spatiale est appliquée au niveau de :
 - Variable dépendante
 - Variables indépendantes
- Dans un modèle SDEM, la matrice de pondération spatiale est appliquée au niveau de :
 - Variables indépendantes
 - Terme d'erreur
- Quelle est la procédure popularisée par Luc Anselin pour discriminer entre les spécifications SAR, SEM et MCO?
 - Tests du multiplicateur de Lagrange (LM) sur le modèle MCO

2.4 Exercices de révision

Exercice

Exercice 1. Réalisation de modèles de régression autorégressifs spatiaux

```
library(sf)
library(spatialreg)
# Matrice de contiguïté selon le partage d'un segment (Rook)
load("data/Lyon.Rdata")
Rook <- poly2nb(LyonIris, queen=FALSE)
W.Rook <- nb2listw(Rook, zero.policy=TRUE, style = "W")
# Modèles
formule <- "PM25 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed"
# Modèles MOC, SLX, SDM, SDEM, SAR, SEM, Manski
à compléter
```

Correction à la section 8.2.1.

Exercice

Exercice 2. Tests du multiplicateur de Lagrange (LM) sur le modèle MCO

à compléter

Correction à la section 8.2.2.

Exercice

Exercice 3. Mesures AIC et BIC et dépendance spatiale

```
## Valeurs d'AIC et de BIC
à compléter
## Autocorrélation spatiale des résidus
à compléter
## Tableau
Comparaison <- à compléter
Comparaison
```

Correction à la section 8.2.3.

3 Modèles d'économétrie spatiale par panel

Dans ce chapitre, nous abordons une extension des modèles autorégressifs, soit les modèles spatiaux par panel qui permettent de modéliser des données spatiales longitudinales.

Objectif

Objectifs d'apprentissage visés dans ce chapitre

À la fin de ce chapitre, vous devriez être en mesure de :

- Comprendre les différentes formulations des modèles spatiaux par panel (SLPDM, SEPDM et SEPDM).
- Assimiler les principes fondamentaux de ces différentes modèles.
- Identifier le modèle spatial par panel le plus approprié (SLPDM, SEPDM et SEPDM).
- Analyser les résultats produits par ces différentes modèles.
- Mettre en pratique ces modèles spatiaux par panel dans R.

Package

Liste des *packages* utilisés dans ce chapitre

- Pour importer et manipuler des fichiers géographiques :
 - `sf` pour importer et manipuler des données vectorielles.
- Pour construire des cartes et des graphiques :
 - `tmap` pour construire des cartes thématiques.
 - `ggplot2` est un *package* pour construire des graphiques.
- Pour les régressions :
 - `spdep` pour construire des matrices spatiales et calculer des mesures d'autocorrélation spatiale.
 - `plm` pour construire des modèles de régression par panel.
 - `spplm` pour construire des modèles de régression spatiale par panel.

3.1 Bref retour sur les modèles en panel

3.2 Formulation des différents modèles spatiaux par panel

3.2.1 Description des différents modèles

3.2.2 Modèle SLPDM : autocorrélation sur la variable dépendante

3.2.3 Modèle SEPDM : autocorrélation sur le terme d'erreur

3.2.4 Modèle SEPDM : autocorrélation sur la variable dépendante et les variables indépendantes

3.3 Sélection du modèle spatial par panel le plus approprié

3.4 Mise en œuvre dans R

3.5 Quiz de révision

3.6 Exercices de révision

Exercice

Exercice 1. Calcul du centre moyen et de la distance standard pour les accidents
Complétez le code ci-dessous.

```
library(sf)
library(tmap)
```

Correction à la section 8.3.1.

Exercice

Exercice 2. Calcul et cartographie de la densité des accidents dans un maillage irrégulier
Pour l'année 2021, complétez le code ci-dessous.

```
library(sf)
library(tmap)
```

Correction à la section 8.3.2.

Exercice

Exercice 3. Calcul et cartographie de la densité des accidents dans un maillage régulier
Pour l'année 2021, complétez le code ci-dessous.

```
library(sf)
library(spatstat)
library(tmap)
```

Correction à la section [8.3.3](#).

Partie 3. Régressions géographiquement pondérées

4 Régressions géographiquement pondérées classiques

La régression géographiquement pondérée (*geographically weighted regression* - **GWR**, en anglais) a été formalisée au milieu des années 1990 par Chris Brunsdon, Steward Fotheringham et Martin Charlton (1996), puis largement décrite dans un ouvrage de référence (Fotheringham, Brunsdon et Charlton 2003). Dans le cadre de ce chapitre, nous abordons uniquement la GWR classique qui s'applique à une variable dépendante continue (GWR gaussienne).

Objectif

Objectifs d'apprentissage visés dans ce chapitre

À la fin de ce chapitre, vous devriez être en mesure de :

- Comprendre pourquoi utiliser une GWR.
- Assimiler les principes fondamentaux d'une GWR classique (distribution gaussienne).
- Analyser les résultats produits par une GWR.
- Saisir que la GWR est un outil exploratoire intéressant, comprenant toutefois plusieurs limites et critiques importantes.
- Mettre en pratique une GWR dans R.

Package

Liste des *packages* utilisés dans ce chapitre

- Pour importer et manipuler des fichiers géographiques :
 - `sf` pour importer et manipuler des données vectorielles.
 - `dplyr` pour manipuler les données.
- Pour construire des cartes et des graphiques :
 - `tmap` pour les cartes.
 - `ggplot2` et `ggpubr` pour construire des graphiques.
 - `corrplot` et `GGally` pour créer des graphiques de matrices de corrélation.
- Pour construire des modèles de régressions :
 - `spgwr` et `GWmodel` pour construire des GWR gaussienne, logistique et Poisson.
 - `spdep` pour calculer le I de Moran sur les résidus des modèles.

4.1 Principe de base

4.1.1 Pourquoi recourir à une régression géographiquement pondérée?

Dans le chapitre 2, nous avons vu que les modèles d'économétrie spatiale visent à contrôler la **dépendance spatiale** d'un modèle de régression classique (MCO), afin d'améliorer l'estimation des coefficients de régression. L'objectif des modèles de régression géographiquement pondérée est différent : ils visent à analyser les variations spatiales de la relation entre la variable dépendante et les variables indépendantes. Autrement dit, les modèles GWR visent à explorer l'**instabilité spatiale du modèle MCO** afin d'analyser localement la relation entre la variable dépendante et les variables indépendantes. Pour une description détaillée en français de la GWR, consultez Apparicio *et al.* (2007).

4.1.2 Formulation de la GWR

Contrairement à la régression linéaire classique et aux modèles spatiaux autorégressifs qui produisent une équation pour l'ensemble du tableau de données, la GWR produit une équation pour chaque unité spatiale i et ainsi, des valeurs locales de R^2 , β_0 , β_k , t de Student, etc. La résolution de cette équation de régression locale est aussi basée sur la méthode des moindres carrés et sur une matrice de pondération $W(i)$ dont les valeurs décroissent en fonction de la distance séparant les unités i et j . Autrement dit, plus j est proche de i , plus sa pondération est élevée et donc plus son « rôle » dans la détermination de l'équation de régression locale de i est important.

De la sorte, la GWR est une extension de la régression linéaire multiple classique où (u_i, v_i) représente les coordonnées géographiques du centroïde de l'unité spatiale et où les paramètres β_0 et β_k peuvent varier dans l'espace (équation 4.1).

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{j=1}^k \beta_j(u_i, v_i)x_{ij} + \epsilon_i \quad (4.1)$$

avec :

- (u_i, v_i) , les coordonnées géographiques de l'unité spatiale i .
- y_i , la variable dépendante pour l'unité spatiale i .
- $\beta_0(u_i, v_i)$, la constante pour l'unité spatiale i aux coordonnées géographiques (u_i, v_i) .
- $\beta_j(u_i, v_i)$, le coefficient de régression pour la variable x_j (avec k variables indépendantes) pour l'unité spatiale i aux coordonnées géographiques (u_i, v_i) .
- x_{ij} , la valeur de la variable indépendante x_j pour l'unité spatiale i .
- ϵ_i , le terme d'erreur pour l'unité spatiale i .

Fotheringham *et al.* (2003) proposent deux principales fonctions *kernel* pour définir la pondération $W(i)$ dans le modèle GWR : une fonction gaussienne (équation 4.2) et une fonction bicarrée (équation 4.3) où d_{ij} représente la distance euclidienne entre les points i et j et b , le rayon de zone d'influence autour du point i (*bandwidth*). Il existe une différence fondamentale entre les deux : la fonction gaussienne accorde un poids non nul à tous les points de l'espace d'étude aussi loin soient-ils, tandis que la fonction bicarrée ne tient pas compte des points distants à plus de b mètres de i , tel qu'illustré à la figure 4.1 avec une valeur fixée à 5000 mètres en guise d'exemple.

$$w_{ij} = \exp \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{d_{ij}}{b} \right)^2 \right) \quad (4.2)$$

$$w_{ij} = \left(1 - \left(\frac{d_{ij}}{b}\right)^2\right)^2 \text{ si } d_{ij} < b, \text{ sinon } w_{ij} = 0 \quad (4.3)$$

🔗 Aller plus loin

Autres fonctions Kernel pour la GWR

Outre les fonctions Kernel gaussienne et bicarrée, il est aussi possible d'utiliser des fonctions exponentielle (équation 4.4) et tricube (équation 4.5), et Boxcar (équation 4.6) implémentées dans les fonctions `bw.gw` et `gwr.basic` du package `GWmodel`.

$$w_{ij} = \exp\left(-\frac{d_{ij}}{b}\right) \quad (4.4)$$

$$w_{ij} = \left(1 - \left(\frac{d_{ij}}{b}\right)^3\right)^3 \text{ si } d_{ij} < b, \text{ sinon } w_{ij} = 0 \quad (4.5)$$

$$w_{ij} = 1 \text{ si } d_{ij} < b, \text{ sinon } w_{ij} = 0 \quad (4.6)$$




Figure 4.1: Fonctions kernel pour définir la matrice de pondération $W(i)$

Dans le modèle GWR, la valeur de b est soit fixée par la personne utilisatrice, soit optimisée avec la valeur de CV (*cross-validation*) ou celle de l'AIC. Notez qu'il est possible d'optimiser la taille de la zone d'influence à partir de la distance (euclidienne le plus souvent, mais d'autres types de distances peuvent être utilisées) ou du nombre de plus proches voisins.

4.1.3 Exemple applicatif de la GWR

Pour démontrer l'utilité de la GWR comme outil d'exploration de l'instabilité spatiale d'un modèle classique, nous utilisons le jeu de données sur Lyon (section 1.1.1). Les modèles de régression (global et GWR) sont construits avec comme variable dépendante le dioxyde d'azote (NO_2) et cinq variables sociodémographiques comme variables indépendantes (section 1.1.1).

4.1.3.1 Résultats du modèle global

Les résultats de la régression linéaire multiple (modèle global) sont présentés au tableau 4.1. Les variables sociodémographiques (variables indépendantes) introduites dans le modèle expliquent 28,3 % de la variance du dioxyde d'azote (variable dépendante). La constante et tous les coefficients de régression du modèle sont significatifs ($p < 0,001$). Toutes choses étant égales par ailleurs, le pourcentage d'immigrants est associé positivement avec le dioxyde d'azote ($\beta = 0,283$), ce qui traduit une certaine iniquité environnementale pour ce groupe de population. À l'inverse, toutes les autres variables sont associées négativement.

Tableau 4.1: Résultats du modèle global (régression linéaire multiple)

Variable	Coef.	Erreur type	t	p
Constante	49,433	2,995	16,502	0,000
Pct0_14	-0,534	0,063	-8,461	0,000
Pct_65	-0,150	0,056	-2,674	0,008
Pct_Img	0,283	0,051	5,532	0,000
Pct_brevet	-0,240	0,037	-6,451	0,000
NivVieMed	-0,316	0,102	-3,107	0,002

Nombre d'observations = 506. R carré = 0,2832. R carré ajusté = 0,276.

L'objectif de la construction d'un modèle GWR est d'examiner l'instabilité spatiale de ce modèle, en analysant comment les associations observées dans le modèle global entre les cinq variables sociodémographiques et le dioxyde d'azote varient dans l'espace.

4.1.3.2 Résultats du modèle GWR

Définition de la zone d'influence

Puisque la superficie des 506 IRIS varie considérablement (avec de petits IRIS au centre de l'agglomération et de très grands IRIS en périphérie, figure 1.1), nous préférons optimiser la zone d'influence (b) avec le nombre de plus proches voisins et non la distance euclidienne avec l'approche *cross-validation*. Le résultat final de l'optimisation du nombre de plus proches voisins est de 92.

Comparaison des modèle global et GWR

L'analyse de variance entre les résidus des deux modèles démontre que le modèle GWR améliore de façon significative la capacité prédictive du modèle de régression globale (tableau 4.2). Les valeurs de R^2 passent d'ailleurs de 0,283 pour le modèle global à 0,784 pour le modèle GWR.

Tableau 4.2: Analyse de variance entre les modèles global et GWR

	dl	Somme des carrés	Moyenne des carrés	Valeur F
Résidus du modèle global	6,00	22 346,02		
Modèle GWR	101,13	15 581,60	154,08	
Résidus du modèle GWR	398,87	6 764,42	16,96	9,09

R carré du modèle global = 0,2832. R carré du modèle GWR = 0,7838.

Cartographie des valeurs de t

Afin de décrire les variations spatiales des associations entre les variables dépendantes et indépendantes, nous cartographions les valeurs de t pour chacune des cinq variables indépendantes (figure 4.2). Pour ce faire, nous utilisons les seuils de $\pm 1,96$, $2,58$ et $3,29$, indiquant des seuils de signification à 5 %, 1 % et 0,1 %. La cartographie des valeurs de t illustre clairement les variations spatiales de l'association entre les variables indépendantes et le dioxyde d'azote.

Premièrement, le modèle global avait révélé que toutes les variables indépendantes étaient significativement associées au seuil de 0,1 %, toutes choses étant égales par ailleurs. Or, localement certaines variables ne sont plus significatives au seuil de 5 % (valeurs de t comprises entre $-1,96$ et $1,96$), soit les IRIS en gris à la figure 4.2. Par exemple, le pourcentage d'enfants de moins de 15 ans est associé négativement au dioxyde d'azote uniquement dans la partie sud de l'agglomération.

Deuxièmement, le sens de la relation, c'est-à-dire du coefficient et de sa valeur de t associé, change pour certaines variables indépendantes. Cela est particulièrement le cas de la variable *médiane du niveau de vie (milliers d'euros)* qui affiche des valeurs positives dans le centre-ville, mais des valeurs négatives en périphérie. Autrement dit, une hausse du niveau de vie des résidents est associée à une réduction du dioxyde d'azote dans les quartiers et municipalités périphériques de l'agglomération, mais à une augmentation dans les quartiers centraux.

Cartographie du nombre de variables significative et de la variable plus significatives

Pour compléter l'exploration des résultats de la GWR, il est possible de répondre à deux dernières questions avec de nouvelles analyses cartographiques (figure 4.3) :

- Quelle est la variable indépendante la plus significative localement ?
- Comment de variables indépendantes sont localement significatives (au seuil de 5 %) ?

Les deux variables les plus significatives localement sont celles relatives au niveau de vie à la population de moins de 15 ans (toutes deux 124 IRIS). Aussi, 159 modèles locaux ne présentent aucune variable significative au seuil retenu.

4.2 Mise en œuvre et analyse dans R

Il existe deux principaux *packages* pour mettre en œuvre des modèles GWR, soit *spgwr* (Bivand et Yu 2023) et *GWmodel* (Isabella Gollini et al. 2015; Binbin Lu et al. 2014). La construction d'un modèle GWR comprend les étapes suivantes :

1. Sélection de la taille de la zone d'influence (*bandwidth*) optimale.
2. Réalisation de la GWR avec la taille de la zone d'influence optimale.
3. Comparaison des modèles MCO et GWR.
4. Cartographie des résultats du modèle GWR (R^2 , coefficients, valeurs de t , etc.).




Figure 4.2: Cartographie des valeurs de t : moins de 15 ans (%)




Figure 4.3: Variables indépendantes significatives du modèle GWR

4.2.1 GWR avec le package `spgwr`

4.2.1.1 Définition de la taille de la zone d'influence

La sélection de la taille de la zone d'influence optimale est réalisée avec la fonction `gwr.sel` pour laquelle :

- le paramètre `gweight` permet de spécifier une fonction *kernel* gaussienne (`gwr.gauss`) ou bicarrée (`gwr.gauss`).
- le paramètre `adapt` permet de spécifier si vous optimisez le nombre de plus proches voisins (`adapt=TRUE`) ou la distance (`adapt=FALSE`).

```
## Chargement des packages et des données
library(sf)
library(tmap)
library(spgwr)
load("data/Lyon.Rdata")
## Ajout des coordonnées X et Y dans LyonIris
xy <- st_coordinates(st_centroid(LyonIris))
LyonIris$X <- xy[,1]
LyonIris$Y <- xy[,2]
## Optimisation du nombre de voisins avec le CV
bwCV.voisins <- gwr.sel(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                        data = LyonIris,
```

```

method = "cv",          # Méthode cv ou AIC
gweight=gwr.bisquare,   # gwr.gauss ou gwr.bisquare
adapt=TRUE,
verbose = FALSE,
RMSE = TRUE,
longlat = FALSE,
coords=cbind(LyonIris$X,LyonIris$Y))

## Optimisation du nombre de voisins avec l'AIC
bwaAIC.voisins <- gwr.sel(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
  data = LyonIris,
  method = "AIC",        # Méthode cv ou AIC
  gweight=gwr.bisquare,  # gwr.gauss ou gwr.bisquare
  adapt=TRUE,            # adaptatif
  verbose = FALSE,
  RMSE = TRUE,
  longlat = FALSE,
  coords=cbind(LyonIris$X,LyonIris$Y))

## Optimisation de la distance avec le CV
bwnaCV.dist <- gwr.sel(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
  data = LyonIris,
  method = "cv",        # méthode cv ou AIC
  gweight=gwr.Gauss,    # gwr.gauss ou gwr.bisquare
  adapt=FALSE,          # non adaptatif
  verbose = FALSE,
  RMSE = TRUE,
  longlat = FALSE,
  coords=cbind(LyonIris$X,LyonIris$Y))

## Optimisation de la distance avec l'AIC
bwnaAIC.dist <- gwr.sel(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
  data = LyonIris,
  method = "AIC",       # méthode cv ou AIC
  gweight=gwr.Gauss,    # gwr.gauss ou gwr.bisquare
  adapt=FALSE,          # non adaptatif
  RMSE = TRUE,
  verbose = FALSE,
  longlat = FALSE,
  coords=cbind(LyonIris$X,LyonIris$Y))

## Affichage des résultats d'optimisation
cat("Sélection de la taille de la zone optimale (bandwidth)",
  "\n avec le nombre de plus proches voisins :",
  "\n  CV =", round(bwCV.voisins,4), "nombre de voisins =",
  round(bwCV.voisins*nrow(LyonIris)),
  "\n  AIC =", round(bwaAIC.voisins,4), "nombre de voisins =",
  round(bwaAIC.voisins*nrow(LyonIris)),
  "\nSélection de la taille de la zone optimale (bandwidth) avec la distance :",
  "\n  CV =", round(bwnaCV.dist, 0), "mètres",

```

```
"\n  AIC =", round(bwnaAIC.dist, 0), "mètres")
```

Sélection de la taille de la zone optimale (bandwidth)

avec le nombre de plus proches voisins :

CV = 0.1818 nombre de voisins = 92

AIC = 0.1067 nombre de voisins = 54

Sélection de la taille de la zone optimale (bandwidth) avec la distance :

CV = 1315 mètres

AIC = 1662 mètres

Les résultats ci-dessus montrent que le nombre de plus proches voisins pourrait être de 92 selon l'approche *cross-validation* et de 54 selon la méthode basée sur l'AIC. Si la valeur de b est basée sur la distance, elle serait alors optimale à 1315 et 1662 mètres selon les deux méthodes.

4.2.1.2 Réalisation de la GWR

Avec la fonction `gwr`, nous estimons un modèle GWR avec un *kernel* bicarré et un nombre optimisé de plus voisins selon la méthode CV, soit 92.

```
# Modèle global : régression linéaire multiple
Modele.Global <- lm(N02 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet + NivVieMed, data = LyonIris)
# Modèle GWR
Modele.GWR <- gwr(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
  data = LyonIris,
  adapt=bwCV.voisins,
  gweight=gwr.bisquare,
  hatmatrix=TRUE,
  se.fit=TRUE,
  coords=cbind(LyonIris$X,LyonIris$Y),
  longlat=FALSE)
```

Le code ci-dessous permet de renvoyer les statistiques univariées des coefficients des 506 régressions locales, réalisées pour chacune des 506 entités spatiales (IRIS), et les statistiques d'ajustement du modèle du modèle GWR (AIC, R^2 quasi-global, etc.).

```
Modele.GWR
```

Call:

```
gwr(formula = N02 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet +
  NivVieMed, data = LyonIris, coords = cbind(LyonIris$X, LyonIris$Y),
  gweight = gwr.bisquare, adapt = bwCV.voisins, hatmatrix = TRUE,
  longlat = FALSE, se.fit = TRUE)
```

Kernel function: `gwr.bisquare`

Adaptive quantile: 0.1818192 (about 92 of 506 data points)

Summary of GWR coefficient estimates at data points:

	Min.	1st Qu.	Median	3rd Qu.	Max.	Global
X.Intercept.	12.429518	30.249511	38.619342	48.038863	60.098584	49.4330
Pct0_14	-1.094802	-0.360556	-0.215643	-0.047687	0.382801	-0.5335
Pct_65	-0.715331	-0.158253	-0.031353	0.076086	0.464992	-0.1505
Pct_Img	-0.331892	-0.049146	0.077177	0.240755	0.670433	0.2829
Pct_brevet	-0.655221	-0.221655	-0.084954	0.047835	0.598456	-0.2400
NivVieMed	-1.140895	-0.560649	-0.214717	0.193768	1.311228	-0.3162

Number of data points: 506
 Effective number of parameters (residual: 2traceS - traceS'S): 107.1278
 Effective degrees of freedom (residual: 2traceS - traceS'S): 398.8722
 Sigma (residual: 2traceS - traceS'S): 4.118116
 Effective number of parameters (model: traceS): 81.53263
 Effective degrees of freedom (model: traceS): 424.4674
 Sigma (model: traceS): 3.992025
 Sigma (ML): 3.656286
 AICc (GWR p. 61, eq 2.33; p. 96, eq. 4.21): 2945.674
 AIC (GWR p. 96, eq. 4.22): 2829.504
 Residual sum of squares: 6764.424
 Quasi-global R2: 0.783008

4.2.1.3 Comparaison des modèles MCO et GWR

Le R^2 du modèle GWR est bien supérieur à celui du modèle classique MCO (0,783 contre 0,283).

```
R2.global <- summary(Modele.Global)$r.squared
rss <- sum((Modele.GWR$lm$y - Modele.GWR$SDF$pred)^2)
tss <- sum((Modele.GWR$lm$y - mean(Modele.GWR$SDF$pred))^2)
R2.GWRquasiglobal <- 1 - (rss / tss)
cat("R2 global (LM) = ", round(R2.global, 3),
    "\nR2 quasi-global (GWR) : ", round(R2.GWRquasiglobal, 3))
```

R2 global (LM) = 0.283

R2 quasi-global (GWR) : 0.784

Fotheringham *et al.* (2003) proposent plusieurs tests pour comparer les modèles GWR et classique qui sont implémentés dans le *package* *spgwr* : fonctions `BFC99.gwr.test(Modele.GWR)`, `BFC02.gwr.test(Modele.GWR)`, `LMZ.F1GWR.test(Modele.GWR)`, `LMZ.F2GWR.test(Modele.GWR)`. Si les valeurs de p de ces tests sont inférieures à 0,05, alors le modèle GWR améliore de façon significative la capacité prédictive du modèle de régression globale, ce que confirment les résultats ci-dessous.

```
anova(Modele.GWR)
```

Analysis of Variance Table

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value
OLS Residuals	6.00	22346.0		
GWR Improvement	101.13	15581.6	154.078	
GWR Residuals	398.87	6764.4	16.959	9.0854

`BFC99.gwr.test(Modele.GWR)`

Brunsdon, Fotheringham & Charlton (1999) ANOVA

data: Modele.GWR
 F = 9.0854, df1 = 350.93, df2 = 430.81, p-value < 2.2e-16
 alternative hypothesis: greater
 sample estimates:
 SS GWR improvement SS GWR residuals
 15581.596 6764.424

`BFC02.gwr.test(Modele.GWR)`

Brunsdon, Fotheringham & Charlton (2002, pp. 91-2) ANOVA

data: Modele.GWR
 F = 3.3035, df1 = 500.00, df2 = 398.87, p-value < 2.2e-16
 alternative hypothesis: greater
 sample estimates:
 SS OLS residuals SS GWR residuals
 22346.021 6764.424

`LMZ.F1GWR.test(Modele.GWR)`

Leung et al. (2000) F(1) test

data: Modele.GWR
 F = 0.37946, df1 = 430.81, df2 = 500.00, p-value < 2.2e-16
 alternative hypothesis: less
 sample estimates:
 SS OLS residuals SS GWR residuals
 22346.021 6764.424

`LMZ.F2GWR.test(Modele.GWR)`

Leung et al. (2000) F(2) test

```
data: Modele.GWR
F = 3.4476, df1 = 142.92, df2 = 500.00, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: greater
sample estimates:
    SS OLS residuals SS GWR improvement
      22346.02      15581.60
```

Un autre test (`LMZ.F3GWR.test`) permet de répondre à la question suivante : est-ce que les coefficients de régression du modèle GWR varient spatialement de façon significative? Les résultats ci-dessous démontrent que c'est le cas pour toutes les variables indépendantes et la constante ($p < 0,001$).

```
LMZ.F3GWR.test(Modele.GWR)
```

Leung et al. (2000) F(3) test

	F statistic	Numerator d.f.	Denominator d.f.	Pr(>)
(Intercept)	2.2771	134.3880	430.81	1.629e-10 ***
Pct0_14	2.7767	141.7244	430.81	5.636e-16 ***
Pct_65	2.0918	169.0472	430.81	8.399e-10 ***
Pct_Img	1.9486	106.4400	430.81	1.550e-06 ***
Pct_brevet	2.4445	121.2830	430.81	1.629e-11 ***
NivVieMed	3.6926	138.8118	430.81	< 2.2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Pour comparer **la dépendance spatiale** des deux modèles (MCO versus GWR), nous calculons le I de Moran sur leurs résidus avec une matrice de contiguïté standardisée selon le partage d'un segment (*Rook*). Avec une valeur du I de Moran de 0,587 ($p < 0,001$), les résidus du modèle global (MCO) sont fortement autocorrélés spatialement, traduisant ainsi un problème de dépendance spatiale du modèle. Bien qu'elle soit toujours significative, l'autocorrélation spatiale des résidus du modèle GWR est bien plus faible (0,275, $p < 0,001$). La cartographie des résidus des deux modèles à la figure 4.4 corrobore ces résultats.

```
library(spdep)
## Résidus des modèles global (MCO) et GWR
LyonIris$MCO.Residus <- Modele.Global$residuals
LyonIris$GWR.Residus <- Modele.GWR$SDF$pred - Modele.GWR$lm$y
## Matrice de contiguïté
Rook <- poly2nb(LyonIris, queen=TRUE)
W.Rook <- nb2listw(Rook, zero.policy=TRUE, style = "W")
# I de Moran sur les résidus du modèle global (MCO)
moran.test(LyonIris$MCO.Residus, W.Rook, randomisation = FALSE)
```

Moran I test under normality

data: LyonIris\$MCO.Residus
weights: W.Rook

Moran I statistic standard deviate = 21.275, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: greater
sample estimates:

Moran I statistic	Expectation	Variance
0.5775768402	-0.0019801980	0.0007420591

```
# I de Moran sur les résidus du modèle GWR (MCO)
moran.test(LyonIris$GWR.Residus, W.Rook, randomisation = FALSE)
```

Moran I test under normality

data: LyonIris\$GWR.Residus
weights: W.Rook

Moran I statistic standard deviate = 10.171, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: greater
sample estimates:

Moran I statistic	Expectation	Variance
0.2750946577	-0.0019801980	0.0007420591

```
## Cartographie des résidus du modèle MCO
tmap_mode("plot")
Carte1 <- tm_shape(LyonIris)+
  tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="MCO.Residus", n = 6, style = "pretty",
    legend.format = list(text.separator = "à",
      decimal.mark = ","),
    midpoint = 0,
    palette = "-RdBu",
    title = "MCO") +
  tm_layout(frame=FALSE)
## Cartographie des résidus du modèle GWR
Carte2 <- tm_shape(LyonIris)+
  tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.Residus", n = 6, style = "pretty",
    legend.format = list(text.separator = "à",
      decimal.mark = ","),
    midpoint = 0,
    palette = "-RdBu",
```

```

title = "GWR") +
tm_layout(frame=FALSE) +
tm_scale_bar(breaks = c(0,5))
tmap_arrange(Carte1, Carte2, nrow = 1)

```




Figure 4.4: Cartographie des résidus des modèles MCO et GWR

4.2.1.4 Cartographie des résultats du modèle GWR

Dans un premier temps, nous ajoutons les valeurs locales des R^2 , des coefficients de régression et des valeurs de t dans la couche `sf`. Notez que les résultats locaux de la GWR sont stockés dans l'objet `Modele.GWR$SDF`.

```

## Récupération du R carré local
LyonIris$GWR.R2 <- Modele.GWR$SDF$localR2
## Récupération des coefficients de régression et calcul des valeurs de t locales
names(Modele.GWR$SDF)

```

[1] "sum.w"	"(Intercept)"	"Pct0_14"
[4] "Pct_65"	"Pct_Img"	"Pct_brevet"
[7] "NivVieMed"	"(Intercept)_se"	"Pct0_14_se"
[10] "Pct_65_se"	"Pct_Img_se"	"Pct_brevet_se"
[13] "NivVieMed_se"	"gwr.e"	"pred"

```
[16] "pred.se"          "localR2"          "(Intercept)_se_EDF"
[19] "Pct0_14_se_EDF"   "Pct_65_se_EDF"    "Pct_Img_se_EDF"
[22] "Pct_brevet_se_EDF" "NivVieMed_se_EDF" "pred.se"
```

```
VarsIndep <- c("Pct0_14", "Pct_65", "Pct_Img", "Pct_brevet", "NivVieMed")
for(e in VarsIndep){
  # Nom des nouvelles variables
  var.coef <- paste0("GWR.", "B_", e)
  var.t     <- paste0("GWR.", "T_", e)
  # Récupération des coefficients pour les variables indépendantes
  LyonIris[[var.coef]] <- Modele.GWR$SDF[[e]]
  # Calcul des valeurs de t pour les variables indépendantes
  LyonIris[[var.t]]    <- Modele.GWR$SDF[[e]] / Modele.GWR$SDF[[paste0(e, "_se")]]
}
```

Cartographie et analyse des R^2 locaux

Les deux lignes de code ci-dessous permettent d'obtenir un résumé sommaire des statistiques descriptives (minimum, quartiles 1 à 3, moyenne et maximum) des valeurs locales de R^2 , mais aussi de constater qu'elles varient de 0,19 à 0,74 pour 95 % des 506 observations (IRIS).

```
summary(LyonIris$GWR.R2)
```

```
      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
0.0888  0.4205  0.5281  0.5081  0.6322  0.7774
```

```
round(quantile(LyonIris$GWR.R2, probs = c(0.025, 0.975)), 4)
```

```
      2.5% 97.5%
0.1876 0.7390
```

Le code ci-dessous permet ensuite de cartographier les R^2 locaux de la GWR (figure 4.5).

```
library(tmap)
# Paramètres pour la légende
legende.parametres <- list(text.separator = "à",
                           decimal.mark = ",")

tm_shape(LyonIris)+
  tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.R2",
          palette="YlOrBr",
          n=5, style="quantile",
          legend.format = legende.parametres,
```

```
    title = "R2 locaux")+  
tm_layout(frame=FALSE)+  
tm_scale_bar(breaks=c(0,5))
```




Figure 4.5: Cartographie des R carrés locaux de la GWR

Cartographie des coefficients de régression locaux

Le code ci-dessous permet ensuite de cartographier les coefficients locaux de la GWR (figure 4.6).

```
# Paramètres pour la légende
legende.parametres <- list(text.separator = "à",
                           decimal.mark = ",",
                           big.mark = " ")

Carte1 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.B_Pct0_14", palette="YlOrBr", n=4, style="pretty",
          legend.format = legende.parametres,
          title = "Moins de 15 ans (%)")+
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte2 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.B_Pct_65", palette="YlOrBr", n=4, style="pretty",
          legend.format = legende.parametres,
          title = "65 ans et plus (%)")+
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte3 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.B_Pct_Img", palette="YlOrBr", n=4, style="pretty",
          legend.format = legende.parametres,
          title = "Immigrants (%)")+
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte4 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.B_Pct_brevet", palette="YlOrBr", n=4, style="pretty",
          legend.format = legende.parametres,
          title = "Faible scolarité (%)")+
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte5 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.B_NivVieMed", palette="YlOrBr", n=4, style="pretty",
          legend.format = legende.parametres,
          title = "Niveau de vie (€1000)")+
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)+
  tm_scale_bar(breaks=c(0,5))

tmap_arrange(Carte1, Carte2, Carte3, Carte4, Carte5, ncol = 2, nrow=3)
```




Figure 4.6: Cartographie des coefficients de régression de la GWR

Cartographie des valeurs de t locales

Pour cartographier les valeurs de t , nous utilisons les seuils de $\pm 1,96$, $2,58$ et $3,29$, indiquant des seuils de signification à 5 %, 1 % et 0,1 % (figure 4.7).

```
# Paramètres pour la légende
legende.parametres <- list(text.separator = "à",
                           text.less.than = "Moins de",
                           text.or.more = "et plus",
                           decimal.mark = ",",
                           big.mark = " ")

classes.intervalles = c(-Inf, -3.29, -2.58, -1.96, 1.96, 2.58, 3.29, Inf)
Cartel <- tm_shape(LyonIris) + tm_borders(col="gray25", lwd=.5) +
  tm_fill(col="GWR.T_Pct0_14", palette="-RdBu",
          midpoint = NA,
```

```

        breaks = classes.intervalles,
        legend.format = legende.parametres,
        title = "Moins de 15 ans (%)")+
tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte2 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
tm_fill(col="GWR.T_Pct_65", palette="-RdBu",
        midpoint = NA,
        breaks = classes.intervalles,
        legend.format = legende.parametres,
        title = "65 ans et plus (%)")+
tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte3 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
tm_fill(col="GWR.T_Pct_Img", palette="-RdBu",
        midpoint = NA,
        breaks = classes.intervalles,
        legend.format = legende.parametres,
        title = "Immigrants (%)")+
tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte4 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
tm_fill(col="GWR.T_Pct_brevet", palette="-RdBu",
        midpoint = NA,
        breaks = classes.intervalles,
        legend.format = legende.parametres,
        title = "Faible scolarité (%)")+
tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte5 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
tm_fill(col="GWR.T_NivVieMed", palette="-RdBu",
        midpoint = NA,
        breaks = classes.intervalles,
        legend.format = legende.parametres,
        title = "Niveau de vie (€1000)")+
tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)+
tm_scale_bar(breaks=c(0,5))

tmap_arrange(Carte1, Carte2, Carte3, Carte4, Carte5, ncol = 2, nrow=3)

```




Figure 4.7: Cartographie des valeurs de t de la GWR

Cartographie du nombre de variables significatives

Nous pouvons aussi cartographier le nombre de variables localement significatives aux seuils de 5 % et 1 %.

```
## Identifier la variable plus significative avec les valeurs de t
VarsT <- paste0("GWR.T_", c("Pct0_14", "Pct_65", "Pct_Img", "Pct_brevet", "NivVieMed"))
Lyon.df <- st_drop_geometry(LyonIris)
Lyon.df <- abs(Lyon.df[,VarsT])
PlusSign <- VarsT[apply(Lyon.df[VarsT], 1, which.max)]
PlusSign <- substr(PlusSign, 7, nchar(PlusSign))
MaxAbsTvalue <- apply(Lyon.df[VarsT], 1, max)
PlusSign <- ifelse(MaxAbsTvalue < 1.96, "Aucune", PlusSign)
## Nombre de variables significatives au seuil de 5%, soit abs(t) = 1,96
LyonIris$NbSignif_1.96 <- as.factor(rowSums(Lyon.df > 1.96))
LyonIris$NbSignif_2.58 <- as.factor(rowSums(Lyon.df > 2.58))
LyonIris$PlusSign <- as.factor(PlusSign)
```

```
## Cartographie
Carte1 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="NbSignif_1.96", palette="Reds",
    title = "Sign. au seuil de 5%")+
  tm_layout(frame=FALSE)+ tm_scale_bar(breaks=c(0,5))
Carte2 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="NbSignif_2.58", palette="Reds",
    title = "Sign. au seuil de 1%")+
  tm_layout(frame=FALSE)
tmap_arrange(Carte1, Carte2, ncol=2, nrow=1)
```




Figure 4.8: Nombre de variables significatives aux seuils de 5% et 1%

Cartographie de la variable la plus significative avec la valeur de t

Finalement, le code ci-dessous permet de repérer la variable la plus significative au seuil de 5 %, c'est-à-dire avec la plus forte valeur absolue pour la valeur de t .

```
tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="PlusSign", palette="Set1",
    title = "Variable la plus significative")+
  tm_layout(frame=FALSE)+ tm_scale_bar(breaks=c(0,5))
```




Figure 4.9: Variable indépendante la plus significative au seuil de 5 %

4.2.2 GWR avec le package `GWmodel`

La construction d'une régression GWR est certainement plus simple (moins verbeuse) avec les fonctions `bw.gwr` et `gwr.basic` du package `GWmodel`.

4.2.2.1 Définition de la taille de la zone d'influence

La fonction `bw.gwr` permet de trouver la valeur de la zone d'influence (b).

```
library(GWmodel)
load("data/Lyon.Rdata")
# Construction de la matrice de distance
xy <- st_coordinates(st_centroid(LyonIris))
MatriceDistance <- gw.dist(dp.locat=xy, p = 2, longlat=FALSE)
## Optimisation du nombre de voisins avec le CV
bwCV.voisins <- bw.gwr(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                      data = LyonIris,
                      dMat = MatriceDistance,
                      approach="CV",
                      kernel="bisquare",
                      adaptive=TRUE,
                      longlat=FALSE)
```

```
Adaptive bandwidth: 320 CV score: 17072.1
Adaptive bandwidth: 206 CV score: 14142.57
Adaptive bandwidth: 134 CV score: 12329.97
Adaptive bandwidth: 91 CV score: 11919.32
Adaptive bandwidth: 63 CV score: 12156.26
Adaptive bandwidth: 107 CV score: 11981.63
Adaptive bandwidth: 79 CV score: 12001.41
Adaptive bandwidth: 96 CV score: 11900.81
Adaptive bandwidth: 101 CV score: 11912.07
Adaptive bandwidth: 94 CV score: 11919.6
Adaptive bandwidth: 98 CV score: 11911.68
Adaptive bandwidth: 95 CV score: 11911.87
Adaptive bandwidth: 97 CV score: 11899.93
Adaptive bandwidth: 97 CV score: 11899.93
```

```
## Optimisation du nombre de voisins avec l'AIC
bwAIC.voisins <- bw.gwr(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                      data = LyonIris,
                      dMat = MatriceDistance,
                      approach="AIC",
                      kernel="bisquare",
                      adaptive=TRUE,
                      longlat=FALSE)
```



```
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 320 AICc value: 3181.763
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 206 AICc value: 3072.458
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 134 AICc value: 2989.605
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 91 AICc value: 2943.187
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 63 AICc value: 2925.002
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 47 AICc value: 2927.612
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 74 AICc value: 2929.903
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 57 AICc value: 2922.621
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 52 AICc value: 2922.879
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 58 AICc value: 2923.89
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 54 AICc value: 2922.612
Adaptive bandwidth (number of nearest neighbours): 54 AICc value: 2922.612
```

```
## Optimisation de la distance avec le CV
bwnCV.dist <- bw.gwr(NO2 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
  data = LyonIris,
  dMat = MatriceDistance,
  approach="CV",
  kernel="gaussian",
  adaptive=FALSE,
  longlat=FALSE)
```

```
Fixed bandwidth: 22632.98 CV score: 23240.62
Fixed bandwidth: 13990.75 CV score: 22942.89
Fixed bandwidth: 8649.556 CV score: 21987.02
Fixed bandwidth: 5348.517 CV score: 19330.61
Fixed bandwidth: 3308.362 CV score: 15656.55
Fixed bandwidth: 2047.478 CV score: 13534
Fixed bandwidth: 1268.208 CV score: 12883.62
Fixed bandwidth: 786.5929 CV score: 69868.32
Fixed bandwidth: 1565.863 CV score: 13058.8
Fixed bandwidth: 1084.247 CV score: 13320.38
Fixed bandwidth: 1381.902 CV score: 12891.23
Fixed bandwidth: 1197.941 CV score: 12968.27
Fixed bandwidth: 1311.635 CV score: 12869.97
Fixed bandwidth: 1338.475 CV score: 12872.81
Fixed bandwidth: 1295.047 CV score: 12872.27
Fixed bandwidth: 1321.887 CV score: 12870.16
Fixed bandwidth: 1305.299 CV score: 12870.46
Fixed bandwidth: 1315.551 CV score: 12869.91
Fixed bandwidth: 1317.971 CV score: 12869.95
Fixed bandwidth: 1314.055 CV score: 12869.91
Fixed bandwidth: 1316.475 CV score: 12869.92
Fixed bandwidth: 1314.98 CV score: 12869.9
Fixed bandwidth: 1314.627 CV score: 12869.91
Fixed bandwidth: 1315.198 CV score: 12869.9
```



```
## Optimisation de la distance avec l'AIC
bwAIC.dist <- bw.gwr(NO2 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
  data = LyonIris,
  dMat = MatriceDistance,
  approach="AIC",
  kernel="gaussian",
  adaptive=FALSE,
  longlat=FALSE)
```

```
Fixed bandwidth: 22632.98 AICc value: 3362.597
Fixed bandwidth: 13990.75 AICc value: 3354.75
Fixed bandwidth: 8649.556 AICc value: 3328.284
Fixed bandwidth: 5348.517 AICc value: 3241.508
Fixed bandwidth: 3308.362 AICc value: 3114.667
Fixed bandwidth: 2047.478 AICc value: 3043.093
Fixed bandwidth: 1268.208 AICc value: 3050.841
Fixed bandwidth: 2529.093 AICc value: 3065.054
Fixed bandwidth: 1749.823 AICc value: 3036.6
Fixed bandwidth: 1565.863 AICc value: 3036.749
Fixed bandwidth: 1863.517 AICc value: 3038.25
Fixed bandwidth: 1679.556 AICc value: 3036.195
Fixed bandwidth: 1636.129 AICc value: 3036.214
Fixed bandwidth: 1706.396 AICc value: 3036.289
Fixed bandwidth: 1662.969 AICc value: 3036.176
Fixed bandwidth: 1652.717 AICc value: 3036.181
Fixed bandwidth: 1669.305 AICc value: 3036.18
Fixed bandwidth: 1659.053 AICc value: 3036.177
Fixed bandwidth: 1665.389 AICc value: 3036.177
Fixed bandwidth: 1661.473 AICc value: 3036.176
Fixed bandwidth: 1660.549 AICc value: 3036.176
```

```
## Affichage des résultats d'optimisation
cat("Sélection de la taille de la zone optimale (bandwidth)",
  "\n avec le nombre de plus proches voisins :",
  "\n CV =", round(bwCV.voisins,4), "nombre de voisins =", round(bwCV.voisins*nrow(LyonIris)),
  "\n AIC =", round(bwAIC.voisins,4), "nombre de voisins =", round(bwAIC.voisins*nrow(LyonIris)),
  "\nSélection de la taille de la zone optimale (bandwidth) avec la distance :",
  "\n CV =", round(bwnCV.dist, 0), "mètres",
  "\n AIC =", round(bwAIC.dist, 0), "mètres")
```

Sélection de la taille de la zone optimale (bandwidth)
 avec le nombre de plus proches voisins :
 CV = 97 nombre de voisins = 49082
 AIC = 54 nombre de voisins = 27324
 Sélection de la taille de la zone optimale (bandwidth) avec la distance :

CV = 1315 mètres
AIC = 1661 mètres

4.2.2.2 Réalisation de la GWR

Comparativement à la fonction `gwr` du *package* `spgwr`, `gwr.basic` du *package* `GWmodel` offre l'avantage de fournir l'ensemble des résultats :

- Ceux de la régression linéaire multiple (modèle global).
- Un sommaire statistique des coefficients de régression de la GWR.
- Les statistiques de la qualité d'ajustement du modèle (AIC, AICc, R^2 , R^2 ajusté).
- Les tests pour comparer les modèles global et GWR (tests F1, F2).
- Le test F3 pour vérifier si les coefficients de régression varient ou non spatialement de façon significative.

```
# Calcul de la GWR
Modele.GWR <- gwr.basic(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                        data = LyonIris,
                        dMat = MatriceDistance, # Matrice de distances
                        bw = bwCV.voisins,      # Zone d'influence
                        kernel = "bisquare",    # Gaussien ou bicarrée
                        adaptive=TRUE,         # Nombre de voisins (TRUE) ou distance (FALSE)
                        F123.test = TRUE,      # Tests F123
                        longlat=FALSE)

Modele.GWR
```

```
*****
*                               Package    GWmodel                               *
*****
Program starts at: 2025-02-04 23:26:22.315013
Call:
gwr.basic(formula = N02 ~ Pct0_14 + Pct_65 + Pct_Img + Pct_brevet +
  NivVieMed, data = LyonIris, bw = bwCV.voisins, kernel = "bisquare",
  adaptive = TRUE, longlat = FALSE, dMat = MatriceDistance,
  F123.test = TRUE)

Dependent (y) variable:  N02
Independent variables:  Pct0_14 Pct_65 Pct_Img Pct_brevet NivVieMed
Number of data points: 506
*****
*                               Results of Global Regression                               *
*****

Call:
lm(formula = formula, data = data)
```

```

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-27.733  -4.457  -0.499   3.507  29.160

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  49.43296    2.99550   16.502 < 2e-16 ***
Pct0_14      -0.53352    0.06305   -8.461 2.94e-16 ***
Pct_65       -0.15047    0.05627   -2.674 0.00774 **
Pct_Img       0.28287    0.05113    5.532 5.12e-08 ***
Pct_brevet   -0.24004    0.03721   -6.451 2.63e-10 ***
NivVieMed    -0.31625    0.10180   -3.107 0.00200 **

---Significance stars
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 6.685 on 500 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2832
Adjusted R-squared:  0.276
F-statistic: 39.5 on 5 and 500 DF,  p-value: < 2.2e-16
***Extra Diagnostic information
Residual sum of squares: 22346.02
Sigma(hat): 6.658629
AIC: 3366.626
AICc: 3366.851
BIC: 2933.798
*****
*           Results of Geographically Weighted Regression           *
*****

*****Model calibration information*****
Kernel function: bisquare
Adaptive bandwidth: 97 (number of nearest neighbours)
Regression points: the same locations as observations are used.
Distance metric: A distance matrix is specified for this model calibration.

*****Summary of GWR coefficient estimates:*****
            Min.   1st Qu.   Median   3rd Qu.   Max.
Intercept  13.249694 30.566393 38.903053 48.035033 59.6124
Pct0_14    -1.094930 -0.371546 -0.224906 -0.053956  0.3386
Pct_65     -0.711775 -0.157939 -0.033630  0.073991  0.4514
Pct_Img     -0.319353 -0.042105  0.078841  0.243274  0.6657
Pct_brevet -0.624419 -0.224105 -0.092008  0.041021  0.5844
NivVieMed  -1.108017 -0.555822 -0.213561  0.202347  1.2844
*****Diagnostic information*****
Number of data points: 506
Effective number of parameters (2trace(S) - trace(S'S)): 103.4065

```

```

Effective degrees of freedom (n-2trace(S) + trace(S'S)): 402.5935
AICc (GWR book, Fotheringham, et al. 2002, p. 61, eq 2.33): 2949.788
AIC (GWR book, Fotheringham, et al. 2002,GWR p. 96, eq. 4.22): 2839.039
BIC (GWR book, Fotheringham, et al. 2002,GWR p. 61, eq. 2.34): 2743.804
Residual sum of squares: 6933.276
R-square value: 0.7775915
Adjusted R-square value: 0.7203234
*****F test results of GWR calibration*****
---F1 test (Leung et al. 2000)
  F1 statistic Numerator DF Denominator DF      Pr(>)
      0.38534          Inf           500 < 2.2e-16 ***
---F2 test (Leung et al. 2000)
  F2 statistic Numerator DF Denominator DF Pr(>)
      3.5405      -31.0892           500   NaN
---F3 test (Leung et al. 2000)
      F3 statistic Numerator DF Denominator DF      Pr(>)
Intercept      2.3480      133.2095          Inf < 2.2e-16 ***
Pct0_14         2.8529      141.2525          Inf < 2.2e-16 ***
Pct_65          2.1479      168.6132          Inf 3.399e-16 ***
Pct_Img         1.9938      105.6136          Inf 5.756e-09 ***
Pct_brevet      2.4930      120.8152          Inf < 2.2e-16 ***
NivVieMed       3.8747      138.4279          Inf < 2.2e-16 ***
---F4 test (GWR book p92)
  F4 statistic Numerator DF Denominator DF      Pr(>)
      0.31027      402.59351           500 < 2.2e-16 ***

---Significance stars
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
*****
Program stops at: 2025-02-04 23:26:37.2276

```

4.2.2.3 Cartographie des résultats du modèle GWR

Une fois le modèle obtenu, nous disposons de l'ensemble des résultats locaux (coefficients, valeur prédite, résidus, valeurs de t et R^2) dans l'objet `Modele.GWR$SDF` qui sera une couche `sf` comme le jeu de données initial. Il est alors aisée de reproduire les cartes présentées à la section 4.2.1.4. En guise d'exemple, dans le code ci-dessous, nous cartographions les valeurs locales du R^2 et uniquement celles de t pour la variable relative au médiane du niveau de vie (figure 4.10).

```

GWR.Resultats <- Modele.GWR$SDF
names(GWR.Resultats)

```

```

[1] "Intercept"      "Pct0_14"        "Pct_65"         "Pct_Img"
[5] "Pct_brevet"     "NivVieMed"      "y"              "yhat"
[9] "residual"       "CV_Score"       "Stud_residual"  "Intercept_SE"
[13] "Pct0_14_SE"     "Pct_65_SE"      "Pct_Img_SE"     "Pct_brevet_SE"

```

```
[17] "NivVieMed_SE" "Intercept_TV" "Pct0_14_TV" "Pct_65_TV"
[21] "Pct_Img_TV" "Pct_brevet_TV" "NivVieMed_TV" "Local_R2"
[25] "geometry"
```

```
legende.parametres <- list(text.separator = "à",
                           text.less.than = "Moins de",
                           text.or.more = "et plus",
                           decimal.mark = ",",
                           big.mark = " ")

classes.intervalles = c(-Inf, -3.29, -2.58, -1.96, 1.96, 2.58, 3.29, Inf)

# Cartographie du R2
Carte1 <- tm_shape(GWR.Resultats)+
  tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="Local_R2",
          palette="YlOrBr",
          n=5, style="quantile",
          legend.format = legende.parametres,
          title = "R2 locaux")+
  tm_layout(frame=FALSE)+
  tm_scale_bar(breaks=c(0,5))

# Cartographie d'une valeur de t
Carte2 <- tm_shape(GWR.Resultats)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="NivVieMed_TV", palette="-RdBu",
          midpoint = NA,
          breaks = classes.intervalles,
          legend.format = legende.parametres,
          title = "Niveau de vie (€1000))+
  tm_layout(frame=FALSE)

tmap_arrange(Carte1, Carte2)
```




Figure 4.10: Exemple de cartographie avec les résultats de la GWR obtenus avec le *package GWmodel*

4.3 GWR classiques pour d'autres distributions

Aller plus loin

Modèles GWR avec d'autres distributions

Dans ce chapitre, nous avons décrit la GWR classique avec une distribution gaussienne qui est une extension de la régression linéaire multiple. Pour construire ce type de GWR classique, nous avons utilisé les fonctions des *packages* `spgwr` (`gwr.sel` et `gwr`) et `GWmodel` (`bw.gwr` et `gwr.basic`). De la même manière, il est possible de construire des modèles GWR qui sont des extensions des modèles linéaires généralisés (GLM), notamment pour des variables dépendantes qualitatives (modèle logistique binomial), de comptage (Poisson, quasi-poisson), continues (gaussien, inverse gaussienne, Gamma). Pour ce faire, il faut utiliser les fonctions `bw.ggwr` et `ggwr` du *package* `spgwr` et spécifier le type de distribution avec l'argument `family` dont la valeur par défaut est `gaussian()`. Cet argument permet de spécifier la famille de distribution et la fonction de lien en utilisant les familles de distribution disponibles dans la fonction de `glm` (*Generalized Linear Models* pour régressions linéaires généralisées) :

- `binomial(link = "logit")`
- `gaussian(link = "identity")`
- `Gamma(link = "inverse")`
- `inverse.gaussian(link = "1/mu^2")`
- `poisson(link = "log")`
- `quasi(link = "identity", variance = "constant")`
- `quasibinomial(link = "logit")`
- `quasipoisson(link = "log")`

Avec le *package* `GWmodel`, vous pourrez utiliser les fonctions `bw.ggwr` et `gwss` qui permettent de réaliser des régressions linéaires pondérées avec des distributions de Poisson et binomiale (avec l'argument `family = "poisson"` et `family = "binomial"`).

4.4 Limites et critiques des GWR

Bien que la GWR classique représente un outil d'exploration de données spatiales particulièrement intéressant pour évaluer l'importance de l'instabilité spatiale d'un modèle de régression (Apparicio, Séguin et Leloup 2007; Mennis et Jordan 2005; Calvo et Escolar 2003), elle comprend plusieurs limites :

- **Type de distance.** Dans le cadre de ce chapitre, nous avons calculé la GWR avec la distance euclidienne qui n'est pas adaptée à tous les phénomènes à l'étude. Par exemple, Lu, Charlton et Fotheringham (2011) utilisent des distances calculées sur un réseau de rues pour modéliser le prix de vente des maisons à Londres avec un modèle GWR. Pour ce faire, il est possible d'utiliser les fonctions `bw.gwr` et `gwr.basic` du *package* `GWmodel` dont l'argument `dmat` permet de spécifier une matrice de distance prédéfinie.
- **Choix du noyau (kernel) et la taille de la zone d'influence.** Ces deux paramètres de la GWR peuvent impacter grandement les résultats. En effet, la zone d'influence (défini avec une distance ou un nombre donné de plus proches voisins) peut entraîner localement un nombre insuffisant d'observations, compromettant ainsi la robustesse des équations de régression locales.

- **Prédicteurs locaux et globaux.** Nous avons vu que la fonction `LMZ.F3GWR.test` permet de déterminer si les coefficients de régression présentent des variations significatives dans l'espace. Or, certaines variables indépendantes peuvent être introduites globalement et non localement, comme nous le verrons dans le prochain chapitre (section 5.1).

La GWR fait face aussi à d'importantes critiques :

- **Validité des modèles locaux.** Pour une régression linéaire multiple, il est primordial de réaliser un diagnostic pour s'assurer du nombre suffisant d'observations, de l'absence de multicollinéarité excessive et de la normalité et l'homoscédasticité des résidus (lire par exemple la [section suivante](#) (Apparicio et Gelb 2022)). Or, ce diagnostic devrait être réalisé pour tous les modèles locaux obtenus pour les n observations du jeu de données. Par exemple, si le modèle global ne pose pas de problème de multicollinéarité excessive, rien ne garantit qu'elle ne soit pas présente dans plusieurs modèles locaux (Wheeler et Tiefelsdorf 2005).
- **Corrélation entre les coefficients locaux.** Dans un article intitulé *Multicollinearity and correlation among local regression coefficients in geographically weighted regression*, Wheeler et Tiefelsdorf (2005) signalent les coefficients de régression locaux peuvent être fortement corrélés entre eux, en raison d'un problème de multicollinéarité excessive des modèles locaux. En guise d'exemple, la figure 4.11 montre bien que certaines paires de coefficients locaux sont corrélées fortement.

```
library("GGally")
df <- data.frame(Modele.GWR$SDF)
df <- df[, 2:7]
names(df) <- c("Constante" , "Pct0_14", "Pct_65", "Pct_Img", "Pct_brevet", "NivVieMed")

# Graphique avec le package GGally
ggpairs(df, progress = FALSE)
# Il est aussi possible de réaliser un graphique avec le package corrplot
library("corrplot")
# p <- cor(df, method="pearson")
# couleurs <- colorRampPalette(c("#053061", "#2166AC" , "#4393C3", "#92C5DE",
#                               "#D1E5F0", "#FFFFFF", "#FDDBC7", "#F4A582",
#                               "#D6604D", "#B2182B", "#67001F"))
# corrplot.mixed(p, lower="number", lower.col = "black",
#               upper = "ellipse", upper.col=couleurs(100))
```





Figure 4.11: Corrélation de Pearson entre les coefficients de régression locaux de la GWR

4.5 Quiz de révision

4.6 Exercices de révision

Exercice

Exercice 1. Réalisation d'un GWR classique

```
library(sf)
library(spgwr)
load("data/Lyon.Rdata")
# Ajout des coordonnées x et y
xy <- à compléter
LyonIris$X <- à compléter
LyonIris$Y <- à compléter
# Optimisation du nombre de voisins avec le CV
formule <- "PM25 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed"
bwCV.voisins <- gwr.sel(à compléter)
# Réalisation de la GWR
Modele.GWR <- gwr(à compléter)
# Affichage des résultats
Modele.GWR
```

Correction à la section 8.4.1.

Exercice

Exercice 2. Comparaison des modèles MCO et GWR

```
library(sf)
library(spgwr)
# Modèle MCO
Modele.Global <- à compléter
# Comparaison des R2
R2.global <- à compléter
rss <- à compléter
tss <- à compléter
R2.GWRquasiglobal <- à compléter
cat("R2 global (LM) = ", round(R2.global, 3),
    "\nR2 quasi-global (GWR) : ", round(R2.GWRquasiglobal, 3))
# Comparaison des R2
à compléter
# Les coefficients du modèle GWR varient-ils significativement dans l'espace?
à compléter
```

Correction à la section 8.4.2.

 Exercice**Exercice 3.** Cartographie des R^2 et des valeurs de t

```
library(tmap)
# Récupération du R carré locaux et valeurs de t locales
à compléter

## Cartographie des R2 locaux
à compléter

# Cartographie des valeurs de t locales
## Paramètres pour la légende
legende.parametres <- list(text.separator = "à",
                           text.less.than = "Moins de",
                           text.or.more = "et plus",
                           decimal.mark = ",",
                           big.mark = " ")

## Cartographie
à compléter
```

Correction à la section 8.4.3.

5 Extensions de la régression géographiquement pondérée

Dans le chapitre 4, nous avons présenté les trois formes classiques de la régression géographiquement pondérée (GWR) qui permettent de modéliser des variables dépendantes continues (GWR gaussienne), dichotomiques (GWR logistique) ou des variables de comptage (GWR Poisson). Depuis la publication de l'ouvrage de référence de Steward Fotheringham, Chris Brunsdon et Martin Charlton (2003), plusieurs extensions ont vu le jour. Parmi celles-ci, nous abordons dans ce chapitre :

- la GWR mixte qui permet de spécifier des variables indépendantes variant spatialement et d'autres étant fixes (Fotheringham, Brunsdon et Charlton 2003).
- La régression géographiquement pondérée multiéchelle (*Multiscale Geographically Weighted Regression* – MGWR) (Fotheringham, Yang et Kang 2017).
- Les GWR mixtes intégrant des variables spatialement décalées (MGWR-SAR) (Geniaux et Martinetti 2018).

🎯 Objectif

Objectifs d'apprentissage visés dans ce chapitre

À la fin de ce chapitre, vous devriez être en mesure de :

- Comprendre pourquoi utiliser différentes extensions de la GWR (GWR-mixte, MGWR, GTWR et MGWR-SAR).
- Assimiler les principes fondamentaux de ces différentes extensions de la GWR.
- Appréhender les différentes extensions de la GWR (GWR-mixte, MGWR, GTWR et MGWR-SAR).
- Analyser les résultats produits par ces différentes extensions.
- Mettre en pratique ces extensions de la GWR dans R.

Package

Liste des *packages* utilisés dans ce chapitre

- Pour importer et manipuler des fichiers géographiques :
 - `sf` pour importer et manipuler des données vectorielles.
 - `dplyr` pour manipuler les données.
- Pour construire des cartes et des graphiques :
 - `tmap` pour les cartes.
 - `ggplot2` pour construire des graphiques.
- Pour construire différentes extensions de la GWR :
 - `Gwmodel` pour construire des GWR mixtes, des MGWR et des GTWR.
 - `mgwrsar` pour construire des GWR avec des variables spatialement décalées.

5.1 Régression géographiquement pondérée mixte

5.1.1 Principe de base de la GWR mixte

5.1.1.1 Pourquoi recourir à une GWR mixte

5.1.1.2 Formulation de la GWR mixte

5.1.2 Mise en oeuvre de la GWR mixte dans R

5.2 Régression géographiquement pondérée multiéchelle

5.2.1 Principe de base de la MGWR

5.2.1.1 Pourquoi recourir à une GWR mixte

5.2.1.2 Formulation de la GWR mixte

5.2.2 Mise en oeuvre de la MGWR dans R

5.3 Régression géographiquement pondérée mixte avec des variables spatialement décalée

5.3.1 Principe de base de la MGWR-SAR

5.3.1.1 Pourquoi recourir à une MGWR-SAR

5.3.1.2 Formulation de la MGWR-SAR

5.3.2 Mise en oeuvre de la MGWR-SAR dans R

5.4 Quiz de révision

5.5 Exercices de révision

Exercice

Exercice 1. Réalisation d'un GWR classique

```
library(sf)
library(spgwr)
```

Correction à la section [8.4.1](#).

Exercice

Exercice 2. Réalisation d'un GWR classique mixte

```
library(sf)
library(spgwr)
```

Correction à la section 8.4.2.

Exercice

Exercice 3. Réalisation d'un GWR classique multiéchelle

```
library(sf)
library(spgwr)
```

Correction à la section 8.4.3.

Partie 4. Autres approches de modélisations spatiales

6 Modèles généralisées additifs

Dans ce chapitre, nous abordons deux formes de modèles généralisées additifs (*Generalized additive model* en anglais – GAM) qui permettent d’introduire l’espace deux manières différentes : les modèles GAM avec une spline bivariée avec les coordonnées géographiques (x, y) pour capturer les variations continues dans l’espace; les modèles GAM avec un lissage par champ aléatoire de Markov (*random markov field* – RMF) pour modéliser la dépendance spatiale entre les unités spatiales voisines.

🎯 Objectif

Objectifs d’apprentissage visés dans ce chapitre

À la fin de ce chapitre, vous devriez être en mesure de :

- Comprendre pourquoi utiliser un modèle GAM avec un spline bivariée sur les coordonnées géographiques ou avec un lissage par champ aléatoire de Markov.
- Analyser les résultats produits par ces deux types de modèles GAM.
- Les mettre en pratique dans R.

📦 Package

Liste des *packages* utilisés dans ce chapitre

- Pour importer et manipuler des fichiers géographiques :
 - `sf` pour importer et manipuler des données vectorielles.
- Pour mesurer l’autocorrélation spatiale de nos variables :
 - `spdep` permettant de calculer une variété d’indicateurs d’autocorrélation spatiale et matrices de pondération spatiale.
- Pour construire des cartes et des graphiques :
 - `tmap` est certainement le meilleur *package* pour la cartographie.
 - `ggplot2` pour construire des graphiques.
- Pour construire des modèles GAM :
 - `mgcv` le *package* de référence pour ajuster des modèles GAM. De nombreux autres *packages* proposent des extensions pour ce type de modèle et se basent principalement sur les outils mis à disposition par `mgcv` pour créer des bases et leurs matrices de pénalisation (`gam4`, `brms`, `gamlss`, `qgam`, etc.).
 - `DHARMa` un *package* permettant d’effectuer des diagnostics sur des résidus de modèles GLM

6.1 Bref retour sur les GAM

Les modèles généralisés additifs (GAM) constituent une famille de modèles de régression très flexibles permettant notamment de modéliser des relations non paramétriques entre les variables indépendantes et la variable dépendante.

Dans un modèle de régression classique, nous partons du principe que les variables X (indépendantes) ont un impact linéaire sur la variable Y (dépendante). Cette hypothèse simplifie grandement les relations entre les variables observées et permet d'interpréter les résultats plus facilement (analyse des coefficients de régression). Or, cette hypothèse peut être fautive et les relations non linéaires ont plus tendance à être la norme que l'exception.

Dans un GAM, plutôt que modéliser une relation linéaire, nous partons du principe que la relation modélisée peut être non linéaire et suivre une fonction f . On parle alors de relations non paramétriques, car la forme de cette fonction s'ajuste aux données et ne suit pas une forme prédéterminée.

Ces fonctions f sont le plus souvent estimées avec des *splines*. Le fonctionnement de base est assez simple. Pour chaque variable X devant suivre une relation non linéaire, la variable est remplacée par k sous-variables ($x_1, x_2, \dots, x_k$). k représente le niveau de complexité attendu de la relation, plus k est grand, plus la fonction à ajuster pourra être complexe. Le modèle va estimer un coefficient pour chacune de ces sous-variables, et la somme des effets de ces sous-variables permet de reconstruire la relation non linéaire.

La figure 6.1 permet d'illustrer ce principe. Les lignes grises représentent les sous-variables, aussi appelées bases, qui sont ensuite multipliées par leur coefficient respectif pour obtenir leurs effets (en couleur), puis la ligne bleue représente leur somme. La ligne bleue capture très efficacement la relation entre la variable X et Y .




Figure 6.1: Exemple de spline

⚠ Attention**Modèles généralisés additifs**

Pour une explication détaillée du fonctionnement des *splines*, vous pouvez consulter le [chapitre sur les GAM](#) du livre *Méthodes quantitatives en sciences sociales : un grand bol d'R* (Apparicio et Gelb 2022).

6.2 Comment utiliser une spline pour ajouter l'espace dans un modèle GAM?

Nous avons vu qu'une spline permet de modéliser l'impact potentiellement non linéaire d'une variable indépendante sur une variable dépendante. Or, il est possible d'utiliser des splines pour intégrer un effet spatial dans un modèle, et ce, en utilisant un type de spline particulier : les splines bivariées qui capturent l'effet simultané de deux variables indépendantes sur une variable dépendante.

Dans un contexte spatial, une spline bivariée capture comment un changement dans les coordonnées X et Y impacte la variable dépendante. De plus, compte tenu de la forme des fonctions de base utilisées, les splines sont particulièrement adaptées pour capturer des relations spatiales avec une forte autocorrélation spatiale positive.

Prenons un exemple avec un jeu de données fictif représentant des mesures de pollution relevées à différentes localisations sur un territoire (figure 6.2).

Nous pourrions créer des bases d'une spline qui varient à la fois dans les coordonnées spatiales X et Y . L'animation à la figure 6.3 illustre des bases obtenues ($k = 25$) pour les données ci-dessus. La hauteur dans la figure est utilisée pour représenter la variation originale des bases qui sera ensuite ajustée aux données grâce aux coefficients du modèle de régression.

En ajustant un coefficient pour chaque base et en combinant leur effets, nous obtenons un effet spatial permettant de prédire la variable de pollution, cartographié à la figure 6.4. Nous constatons ainsi que le modèle a été capable de reproduire les tendances principales des niveaux de pollution en retrouvant les secteurs avec des valeurs fortes et faibles. Plus l'autocorrélation spatiale est élevée, plus ce type de modèle sera efficace pour capturer l'effet spatial.

D'un point de vue plus formel, un modèle GAM peut être décrit par l'équation suivante :

$$y \sim D(\mu, \theta)$$

$$g(\mu) = \beta_0 + \beta X + \sum_{j=1}^n (f_j(\zeta_j)) \quad (6.1)$$

avec :

- y , la variable dépendante.
- D , une distribution avec une espérance μ et ses autres paramètres θ .
- X , les variables indépendantes dont l'effet est supposé linéaire par le modèle.
- β , les coefficients des variables indépendantes.
- β_0 , la constante.
- ζ , les variables dont l'effet est supposé non linéaire par le modèle.
- f_j , une fonction modélisant l'impact de la variable ζ_j .




Figure 6.2: Exemple d'un jeu de données fictif avec une forte dépendance spatiale




Figure 6.3: Représentation des bases d'une spline bivariee




Figure 6.4: Captation de l'effet spatial par une spline bivariable

Pour un modèle incluant seulement une spline bivariée sur les coordonnées géographiques des observations, le modèle peut se résumer à l'équation suivante :

$$\begin{aligned} y &\sim D(\mu, \theta) \\ g(\mu) &= \beta_0 + \beta X + f(sp) \end{aligned} \tag{6.2}$$

avec sp une matrice comprenant de deux colonnes, soit les coordonnées cartésiennes des observations.

6.3 Pourquoi recourir à un modèle GAM?

Les modèles GAM sont très flexibles puisqu'ils sont une extension directe des modèles linéaires généralisés (GLM). Ils peuvent donc être appliqués à des variables dépendantes suivant de nombreuses distributions (normale, gamma, binomiale, poisson, tweedie, log-normal, etc.). Cependant, ils imposent une conceptualisation particulière de l'espace. En effet, un modèle GAM n'inclut pas directement la notion de dépendance spatiale dans sa formulation. L'hypothèse d'indépendance des observations est conservée (contrairement à un modèle des moindres carrés généralisés, GLS). Le modèle intègre simplement un terme flexible correspondant à l'ajout d'un ensemble de nouvelles variables X structurées afin de capturer un effet spatialement positivement autocorrélé.

Si nous reprenons notre exemple avec la pollution atmosphérique, le modèle est un simple GLM dans lequel on suppose que les niveau de pollution suivent une distribution normale et que les observations sont indépendantes. Cependant la moyenne de cette distribution peut être prédite avec une spline calculée à partir des coordonnées spatiales des observations. Le modèle ne part donc pas du principe que deux observations proches sont plus similaires, mais seulement qu'il existe un effet spatial permettant de prédire les niveaux moyens de pollution attendus. Un modèle GAM ne vise donc pas explicitement à corriger l'effet de la dépendance spatiale, mais plutôt à capturer un effet spatialement structuré et non capturé par les variables indépendantes X . Sans l'ajout de la spline, cet effet se serait retrouvé dans les résidus du modèle.

La cartographie de l'effet spatial dans un modèle GAM permet de visualiser les secteurs de l'espace d'étude dans lesquels, **toutes choses étant égales par ailleurs**, la variable dépendante est plus forte ou plus faible que la moyenne régionale. Il peut être vu comme un ajustement local de la prédiction. Une forme de malus ou de bonus que le modèle ajoute à sa prédiction pour tenir compte de la variation spatiale de la variable dépendante qui n'a pas été expliquée par les variables indépendantes.

Puisqu'un modèle GAM ne prend pas directement en compte l'autocorrélation spatiale, il est tout à fait possible qu'il échoue à réduire suffisamment la dépendance spatiale des résidus d'un modèle global (non spatial). Il faudra alors privilégier d'autres formes de modèles. De même, si notre cadre théorique nous amène à penser que nos observations s'influencent mutuellement dans l'espace, il sera beaucoup plus cohérent d'utiliser un modèle économétrique (Chapitre 2).

Prenons un exemple concret pour lequel l'utilisation d'un modèle GAM serait particulièrement pertinente. Dans une étude récente (Gelb et Apparicio 2022), les auteurs cherchent à modéliser les niveaux d'expositions de cyclistes aux pollutions atmosphériques et sonores. Les données utilisées ont été collectées par des cyclistes qui parcouraient différents environnements urbains équipés de capteurs de bruit et de pollution. Plus spécifiquement, l'objectif de l'étude était de déterminer quelles caractéristiques de l'environnement urbain réduisent ou augmentent significativement les niveaux d'exposition des cyclistes. Dans leur cadre théorique (figure 6.5), les auteurs distinguent :

1. les effets du micro-environnement, causés par les caractéristiques locales comme le type de rue utilisé, la densité bâtie, la présence de végétation, etc.
2. la pollution d'arrière-plan, causée par des phénomènes géographiques régionaux comme la localisation des industries, des autoroutes, la topographie, etc.




Figure 6.5: Cadre théorique de l'exposition des cyclistes

L'exposition mesurée pour un cycliste à un endroit t dépend donc des caractéristiques propres de cet endroit, mais aussi de la pollution d'arrière-plan. Par exemple, si nous prenons une rue A, en tous points identique à une rue B, nous pouvons nous attendre à mesurer des niveaux de pollution plus élevée pour B si celle-ci est située dans un secteur plus industrialisé de la ville. Cette différence ne s'explique pas par des caractéristiques propres à A ou B, puisqu'elles sont identiques, mais bien par un effet d'arrière-plan produit par différents phénomènes géographiques et donc spatialement autocorrélé. Par conséquent, dans cet exemple, l'intégration de la pollution d'arrière-plan avec une spline spatiale est particulièrement pertinente, car l'interprétation de l'effet produit par cette spline s'intègre directement dans le cadre théorique.

6.4 Random Markov Field (RFM) ou spline bivariée?

Nous avons vu jusqu'ici qu'il est possible d'incorporer un effet spatial dans un modèle GAM en intégrant une spline bivariée sur les coordonnées spatiales des observations. Cette approche est cependant moins pertinente quand les observations sont des polygones de tailles variées. En effet, intégrer les centroides des polygones dans le modèle revient à nettement déformer l'espace de nos données puisque des polygones voisins peuvent avoir des centroides très éloignés.

Lorsque les données ont une géométrie irrégulière et que le voisinage est plus important que la proximité (distance), il est recommandé d'utiliser un autre type de fonction appelée un champ de Markov aléatoire (*random Markov field* - RMF en anglais).

Aller plus loin

Modèle CAR versus GAM avec MRF

Mathématiquement parlant, un modèle de type CAR (*conditional autoregressive model*) est très proche d'un modèle GAM intégrant un MRF puisque la structure spatiale intégrée par un modèle CAR est un MRF : la valeur de la variable dépendante d'une entité est **conditionnée** par la valeur de ses voisins.

Dans l'équation 6.3, le terme η représente l'effet spatial. Il est le plus souvent modélisé comme un effet provenant d'une distribution normale multivariée, centrée sur zéro et dont la matrice de covariance est calculée grâce à un terme λ et une matrice de pondération spatiale W . Ce type de modèle est communément appelé un modèle à effet mixte, car il combine des effets fixes (les coefficients β) et des effets **aléatoires** (λ). Les effets aléatoires ne sont pas estimés de la même façon que les effets fixes : ils sont en effet pénalisés. Pour une introduction sur les modèles à effets mixtes, vous pouvez consulter [ce chapitre sur les GLMM](#) du livre *Méthodes quantitatives en sciences sociales : un grand bol d'R* (Apparicio et Gelb 2022).

$$\begin{aligned} y &\sim D(\mu, \theta) \\ g(\mu) &= \beta_0 + \beta X + \eta \\ \eta &\sim \text{Normal}(0, (I - \lambda W)\sigma^2) \end{aligned} \tag{6.3}$$

Il existe un lien direct entre les modèles à effets mixtes et les GAM. En effet, il est possible de reformuler un GLMM comme un GAM et vice-versa, ce qui signifie qu'une spline pénalisée peut être utilisée pour représenter un effet aléatoire (Wood 2017).

Dans R, avec le package `mgcv`, il est possible d'utiliser une spline pénalisée par une matrice de pondération spatiale W pour approximer l'effet aléatoire que nous aurions modélisé avec un modèle de type CAR. L'intérêt d'utiliser un GAM plutôt qu'un CAR est que nous pouvons contrôler directement le degré de lissage (autocorrélation spatiale) du terme spatial dans le modèle grâce au nombre de degrés de liberté (k) de la spline. En utilisant un nombre de degrés de liberté maximal ($k = n - 1$), soit une base par observation, alors on obtient un *full rank MRF*, autorisant de facto la plus grande variance possible du terme spatial. En réduisant k , nous obtenons des modèles d'ordre inférieur (*lower rank MRF*) dont le terme spatial est plus lisse et moins complexe.

$$\begin{aligned} y_i &\sim D(\mu_i, \theta) \\ g(\mu_i) &= \beta_0 + \beta X_i + f(W_i) \end{aligned} \tag{6.4}$$

6.5 Mise en oeuvre et analyse dans R

Pour illustrer la réalisation des différents modèles GAM (non spatiale, avec une spline bivariée sur les coordonnées géographiques et avec une spline spatiale de type RMF), nous utilisons le jeu de données sur les parts modales dans la région métropolitaine de Montréal (section 1.1.2). Ce jeu de données comprend trois variables mesurant respectivement la proportion des individus utilisant la voiture, le transport collectif ou un mode actif (marche ou vélo) comme mode de transport principal pour ses déplacements domicile-travail en 2021 pour les secteurs de recensement (figure 1.2).

Lorsqu'un ensemble de variables sont des proportions d'un total (leur somme donne 1 ou 100), alors on désigne l'ensemble de ces variables comme des données compositionnelles. Ces données doivent être analysées avec des méthodes spécifiques, car elles ont un comportement particulier. La diminution de l'une d'entre elle provoque nécessairement

l'augmentation d'une autre. Elles ne sont donc pas indépendantes et certaines catégories ont même tendance à exister simultanément ou au contraire se repousser.

L'analyse de données compositionnelles est un domaine en soit et sort du matériel que nous souhaitons couvrir dans ce livre. Il existe d'excellentes ressources et packages R sur le sujet (Van den Boogaart et Tolosana-Delgado 2013; van den Boogaart, Tolosana-Delgado et Bren 2024; Tsagris et Athineou 2025).

Nous utilisons ici l'approche du log des ratios (*alr*). Il s'agit d'une transformation que l'on peut appliquer aux données compositionnelles pour pouvoir les analyser avec des méthodes classiques de statistiques. On lui préfère généralement une autre méthode de transformation, soit celle isométrique des log ratios (*ilr*), mais cette dernière produit des résultats plus difficiles à interpréter (Greenacre, Martinez-Alvaro et Blasco 2021). Nous utiliserons donc l'approche *alr* dans cet exemple. La transformation *alr* est décrite par la formule suivante :

$$\text{alr}(x) = \left[\log \frac{x_1}{x_D}, \dots, \log \frac{x_{D-1}}{x_D} \right] \quad (6.5)$$

Pour une variable compositionnelle x comprenant D dimensions (*catégories*), la transformation *alr* consiste à calculer $D-1$ log de ratio entre les différentes dimensions D et une référence parmi D . Ainsi, le nombre de dimensions de la version transformée de x est toujours de $D-1$.

Dans cet exemple, nous utilisons le ratio entre utilisateurs du transport collectif (TC) et de l'automobile. Puisque la transformation *alr* implique une division, puis un log, il est important que ni le numérateur ni le dénominateur ne soit égale à 0. Or, nous avons quelques secteurs de recensement (SR) avec des parts modales TC à 0. Puisqu'il semble peu probable qu'aucune personne dans un SR n'utilise le transport collectif, nous remplaçons les 0 par le plus faible pourcentage trouvé dans les SR avec la valeur supérieure à 0.

```
library(sf, quietly = TRUE)
library(ggplot2, quietly = TRUE)
library(tmap, quietly = TRUE)
library(dplyr, quietly = TRUE)
library(ggpubr, quietly = TRUE)

# Chargement des données
load("data/Mtl.Rdata")

# Nous préparons ici les données en calculant les ratios
# remplaçant les 0 et calculant la transformation alr
data_mtl <- data_mtl %>%
  mutate(
    prt_tc = ifelse(prt_tc == 0, min(prt_tc[prt_tc>0]), prt_tc)
  ) %>%
  mutate(
    ratio = (prt_tc / prt_auto),
    alr_val = log(prt_tc / prt_auto)
  )

plot1 <- ggplot(data_mtl) +
  geom_histogram(aes(x = ratio), fill = 'grey', color = 'black', bins = 30) +
```

```

theme_bw() +
  labs(x = 'part modale TC / part modale auto',
       y = 'effectif'
  )
plot2 <- ggplot(data_mtl) +
  geom_histogram(aes(x = alr_val), fill = 'grey', color = 'black', bins = 30) +
  theme_bw() +
  labs(x = 'log(part modale TC / part modale auto)',
       y = 'effectif'
  )
ggarrange(plot1, plot2, nrow = 2)

```




Figure 6.6: Distributions du ratio et du log ratio entre les parts modales TC et automobile

La figure 6.6 illustre la distribution de la variable que nous souhaitons modéliser. Le simple ratio a des valeurs comprises entre 0 et 2,5. Si sa valeur est de 0, cela signifie que personne dans le secteur de recensement n'utilise le transport collectif comme mode principal pour ses déplacements pendulaires. Une valeur de 1 indique que cette proportion est égale à celle des personnes utilisant la voiture. Une valeur plus grande que 1 indique une dominance du mode TC plutôt qu'automobile. Sans surprise, pour la majorité des secteurs de recensement, la valeur est inférieure à 1. Le log du ratio suit une distribution moins asymétrique qui sera probablement plus facile à modéliser.

```

library(spdep, quietly = TRUE)
library(dplyr, quietly = TRUE)
# Matrice de de contiguïté selon le partage d'un nœud
queen_nb <- poly2nb(data_mtl, queen = TRUE)
queen_w <- nb2listw(queen_nb, style = 'W', zero.policy = TRUE)

```

```
# Calcul du I de moran de la variable ratio
moran_i <- moran.mc(data_mtl$alr_val,
                    listw = queen_w,
                    zero.policy = TRUE, nsim = 999)
moran_text <- format(as.numeric(round(moran_i$statistic,3)) , decimal.mark = ",")
# Cartographie de la variable
tm_shape(data_mtl) +
  tm_fill(col="alr_val", n = 7,
          style = "jenks",
          midpoint = log(1),
          legend.format = list(text.separator = "à",
                               decimal.mark = ",",
                               big.mark = " ",
                               digits = 2),
          palette = "-RdBu", title = 'part modale TC / part modale auto') +
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE) +
  tm_scale_bar(breaks = c(0,10)) +
  tm_xlab(paste0('I de Moran = ', moran_text,
                 " (matrice de contiguïté selon le partage d'un nœud)."))
```




Figure 6.7: Distribution géographique de la variable dépendante

Sans surprise, notre variable dépendante est fortement spatialement autocorrélée. Plus on s'éloigne du centre-ville, plus le transport collectif est délaissé au profit de la voiture. Les secteurs dans lesquels la part modale du TC est supérieure à celle de l'automobile sont situés au centre de l'île de Montréal, à proximité des lignes de métro.

6.5.1 Modèles GAM sans intégration de l'espace

Pour modéliser cette variable, nous utilisons deux ensembles de variables indépendantes extraites du recensement de 2021 de Statistique Canada pour les secteurs de recensement de la région métropolitaine de Montréal :

1. Des variables sociodémographiques :
 - Pourcentage de personnes issues des minorités visibles (`prt_minorite_vis`).
 - Pourcentage de ménages monoparentaux (`prt_monoparental`).
 - Taux de chômage (`prt_chomage`).
 - Revenu médian (`revenu_median`).
 - Pourcentage de personnes à faible revenu (`prt_personnes_faibles_revenu`).
2. Des variables mesurant les niveaux d'accessibilité :
 - Niveau d'accessibilité aux emplois en heure de pointe en transport collectif (`acs_idx_emp_tc_peak`).
 - Niveau d'accessibilité aux emplois à pied : (`acs_idx_emp_pieton`).

Les indicateurs d'accessibilité sont exprimés comme un score variant de 0 (pire accessibilité au Canada) à 1 (meilleure accessibilité au Canada). Ils servent à capturer dans quelle mesure le transport collectif ou la marche permet d'atteindre des emplois (lieux d'activités et de consommation). Dans ce modèle relativement simple, nous nous attendons à ce que des secteurs avec des populations plus vulnérables (variables sociodémographiques) présentent une part modale du transport collectif plus élevée que celle de l'automobile (dépendance au TC). Nous souhaitons cependant vérifier si cette relation tient toujours une fois que l'on tient compte de la performance du transport collectif et de la possibilité d'atteindre des activités à pied.

```
library(mgcv)
library(car)
# Vérification de la multicollinéarité avant d'ajuster un premier modèle
vif(lm(alr_val ~ prt_minorite_vis + prt_monoparental +
      prt_chomage + revenu_median + prt_personnes_faibles_revenu +
      acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton,
      data = data_mtl
    ))
```

<code>prt_minorite_vis</code>	<code>prt_monoparental</code>
1.892323	1.750261
<code>prt_chomage</code>	<code>revenu_median</code>
3.007752	2.227562
<code>prt_personnes_faibles_revenu</code>	<code>acs_idx_emp_tc_peak</code>
5.343381	2.977366
<code>acs_idx_emp_pieton</code>	
2.760775	

Les valeurs du facteur d'inflation de la variance (VIF) sont relativement faibles, excepté celle du pourcentage de personne à faible revenu qui dépasse 5. Par conséquent, nous décidons de la retirer du modèle.

Nous commençons par ajuster un simple GLM (non spatial), assumant une distribution normale de la variable dépendante, une fois que sont contrôlées les variables indépendantes (`family = gaussian`). Pour valider les résidus de ce modèle, nous utiliserons la méthode des résidus simulés.

Aller plus loin

Les résidus simulés

Pour une description des résidus simulés, vous pourrez consulter [ce chapitre sur les GLM du livre](#) du livre *Méthodes quantitatives en sciences sociales : un grand bol d'R* (Apparicio et Gelb 2022).

```
library(DHARMA)
library(mgcViz)
# Modèle GLM avec une distribution normale
glm_base <- gam(alr_val ~ prt_minorite_vis + prt_monoparental + revenu_median +
               acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton,
               data = data_mtl, family = gaussian)
# Validation des résidus
res <- simulateResiduals(glm_base, plot = FALSE)
plot(res)
```

DHARMA residual




Figure 6.8: Résidus du simple GLM avec une distribution normale

La figure 6.8 indique que les résidus simulés ne suivent pas vraiment une distribution uniforme et sont marqués par des valeurs extrêmes. Pour améliorer ce premier modèle, nous utilisons une distribution de Student (`family = scat`). Cette dernière ressemble beaucoup à la distribution normale, mais admet davantage de valeurs extrêmes. Autrement dit, elle permet donc de réduire l'impact des valeurs extrêmes dans le modèle.

```
# Modèle GLM avec une distribution normale de Student
glm_base <- gam(alr_val ~ prt_minorite_vis + prt_monoparental + revenu_median +
               acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton,
               data = data_mtl, family = scat)
# Validation des résidus
res <- simulateResiduals(glm_base, plot = FALSE)
plot(res)
```

DHARMA residual




Figure 6.9: Résidus du GLM avec une distribution de Student

Une nette amélioration est observable à la figure 6.9, bien que les quantiles des résidus tendent encore à dévier des valeurs attendues. Plusieurs raisons pourraient expliquer cette situation, mais il est fort probable qu'elle soit provoquée par l'autocorrélation spatiale dans les résidus.

```
# I de Moran des résidus des deux modèles (gaussien et Student)
moran.mc(residuals(glm_base, type = 'pearson'),
         listw = queen_w, nsim = 999,
         zero.policy = TRUE)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: residuals(glm_base, type = "pearson")
weights: queen_w
```

```
number of simulations + 1: 1000
```

```
statistic = 0.52098, observed rank = 1000, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater
```

```
moran_i <- moran.mc(residuals(res), listw = queen_w, nsim = 999,
  zero.policy = TRUE)
print(moran_i)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: residuals(res)
weights: queen_w
number of simulations + 1: 1000
```

```
statistic = 0.54085, observed rank = 1000, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater
```

```
moran_text <- format(as.numeric(round(moran_i$statistic,3)),
  decimal.mark = ",")
data_mtl$base_residual <- residuals(glm_base, type = 'response')
```

```
# Cartographie
tm_shape(data_mtl) +
  tm_fill(col="base_residual", n = 7,
    style = "jenks",
    midpoint = 0,
    legend.format = list(text.separator = "à",
      decimal.mark = ",",
      big.mark = " ",
      digits = 2),
    palette = "-RdBu", title = 'résidus simulés') +
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE) +
  tm_scale_bar(breaks = c(0,10))+
  tm_xlab(paste0('I de Moran = ', moran_text,
    " (matrice de contiguïté selon le partage d'un nœud)."))
```





Figure 6.10: Cartographie des résidus du modèle GLM

En effet, la figure 6.10 démontre clairement que la distribution des résidus du modèle GLM (avec une distribution de Student) n'est pas aléatoire spatialement. Les valeurs négatives indiquent des secteurs dans lesquels le modèle tend à prédire un log ratio trop favorable au transport collectif et inversement dans les secteurs avec des valeurs positives.

6.5.2 GAM avec spline spatiale bivariée sur les coordonnées géographiques

Nous ajustons ici un modèle GAM intégrant une spline bivariée sur les coordonnées des centroïdes des secteurs de recensement. Le rôle de cette spline est de capturer une tendance spatiale à l'utilisation plus ou moins prononcée du transport collectif. Cet effet correspond à l'agrégat d'un ensemble de variables que nous n'avons pas pu mesurer comme par l'exemple la revendication écologique, la difficulté de stationner une voiture, la présence d'autres modes de déplacement durables connecté au transport en commun, la démographie, etc. Notons ici que nous utilisons une spline de type processus gaussien (`bs = 'gp'`, `m = 3`) avec une structure de covariance Matérn qui est communément utilisée en géostatistique pour le krigeage.

```
XY <- st_coordinates(st_centroid(data_mtl))
data_mtl$X <- XY[,1]
data_mtl$Y <- XY[,2]
# Modèle GAM avec une spline bivariée sur les coordonnées géographiques
gam1 <- gam(alr_val ~ prt_minorite_vis + prt_monoparental + revenu_median +
            acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton +
            s(X,Y, bs = 'gp', m = 3),
            data = data_mtl, family = scat)
# Résidus du modèle
res <- simulateResiduals(gam1, plot = FALSE)
plot(res)
```

DHARMA residual




Figure 6.11: Résidus du modèle GAM avec une spline bivariable sur les coordonnées géographiques

Les résidus simulés de ce nouveau modèle se comportent bien mieux que les résidus que nous avons obtenus pour les deux modèles GLM n'intégrant pas l'espace (figure 6.11). Nous pouvons maintenant nous pencher sur l'autocorrélation spatiale des résidus simulés qui devraient suivre une distribution uniforme et aléatoire spatialement.

```
data_mtl$sim_residual <- residuals(res)
test <- moran.mc(data_mtl$sim_residual, listw = queen_w, nsim = 999,
                 zero.policy = TRUE)
print(test)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: data_mtl$sim_residual
weights: queen_w
number of simulations + 1: 1000
```

```
statistic = 0.30525, observed rank = 1000, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater
```

```
moran_text <- format(as.numeric(round(test$statistic,3)),
                    decimal.mark = ",")
tm_shape(data_mtl) +
```

```

tm_fill(col="sim_residual", n = 7,
        style = "jenks",
        midpoint = 0.5,
        legend.format = list(text.separator = "à",
                             decimal.mark = ",",
                             big.mark = " ",
                             digits = 2),
        palette = "-RdBu",
        title = 'résidus simulés') +
tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE) +
tm_scale_bar(breaks = c(0,10))+
tm_xlab(paste0('I de Moran = ', moran_text,
               " (matrice de contiguïté selon le partage d'un nœud)."))

```




Figure 6.12: Cartographie des résidus du modèle GAM avec une spline bivariée sur les coordonnées géographiques

La valeur du I de Moran ($I = 0,305$), calculé à partir de la matrice de contiguïté selon le partage d'un nœud (*Queen*), indique toujours une autocorrélation spatiale non négligeable des résidus (figure 6.12).

Toutefois, le modèle GAM n'a pas basé sur les relations de voisinage entre les observations (contiguïté), mais sur la localisation de leurs centroïdes (proximité) pour estimer le terme spatial. Dans ce contexte, il serait plus judicieux d'évaluer l'autocorrélation des résidus du modèle en utilisant une matrice de pondération spatiale basée sur l'inverse des distances.

```

dists <- 1/as.matrix(dist(XY))
diag(dists) <- 0
dist_w <- mat2listw(dists)
moran.mc(data_mtl$sim_residual, listw = dist_w, nsim = 999)

```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: data_mtl$sim_residual
weights: dist_w
number of simulations + 1: 1000
```

```
statistic = 0.025581, observed rank = 1000, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater
```

Nous constatons alors que le modèle est parvenu à retirer l'autocorrélation spatiale des résidus (I de Moran de 0,026), si elle est évaluée avec la façon dont l'espace est prise en compte dans le modèle. Interprétons maintenant les résultats du modèle avec la fonction `summary`.

```
results <- summary(gaml)
print(results)
```

```
Family: Scaled t(4.458,0.307)
Link function: identity
```

Formula:

```
alr_val ~ prt_minorite_vis + prt_monoparental + revenu_median +
  acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton + s(X, Y, bs = "gp",
  m = 3)
```

Parametric coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.646739	0.121130	-21.850	< 2e-16 ***
prt_minorite_vis	0.876472	0.100188	8.748	< 2e-16 ***
prt_monoparental	1.398126	0.277368	5.041	4.64e-07 ***
revenu_median	-0.010175	0.001691	-6.017	1.78e-09 ***
acs_idx_emp_tc_peak	3.936414	0.187545	20.989	< 2e-16 ***
acs_idx_emp_pieton	-1.548512	0.177466	-8.726	< 2e-16 ***

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Approximate significance of smooth terms:

	edf	Ref.df	Chi.sq	p-value
s(X,Y)	26.81	28.9	941.5	<2e-16 ***

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
R-sq.(adj) = 0.902   Deviance explained = 81.4%
-REML = 543.3   Scale est. = 1           n = 986
```

Le R^2 ajusté est très élevé (0,902), indiquant que le modèle est capable d'expliquer une part significative de la déviance de nos données. Chacune des variables explicatives a un impact significatif sur le ratio entre les parts modales de TC et de l'automobile. Pour interpréter leurs effets, nous devons tenir compte de l'impact de la transformation *alr*. Pour rappel, notre modèle prédit la moyenne de notre log du ratio entre la part TC et la part automobile. Il est possible de passer de l'échelle log à l'échelle naturelle en utilisant la fonction exponentielle (*exp*). Si nous transformons les coefficients obtenus avec la fonction *exp*, alors ils expriment l'impact **multiplicatif** des variables indépendantes sur le ratio entre la part TC et la part automobile. Si ce ratio augmente, c'est que l'automobile est moins utilisée et/ou que le TC est plus utilisé et inversement.

Tableau 6.1: Résultats du modèle GLM avec une spline bivariée sur les coordonnées géographiques

Variable	Coefficient	exp(coefficient)	Valeur de p
Constante	-2,647	0,071	0
prt_minorite_vis	0,876	2,402	0
prt_monoparental	1,398	4,048	0
revenu_median	-0,010	0,990	0
acs_idx_emp_tc_peak	3,936	51,235	0
acs_idx_emp_pieton	-1,549	0,213	0

R^2 ajusté = 0,9021.

Voici une interprétation des effets obtenus (tableau 6.1) :

- Comparativement à un SR avec 0 % de personnes issues des minorités visible, un SR avec 25 % de ce groupe de la population verrait augmenter la moyenne du log du ratio de $0,876 \times 0,25 = 0,219$, ce qui correspond à une multiplication par 1,245 du ratio, ou encore, une augmentation de 24,5 % du ratio. Il semblerait donc que toutes choses étant égales par ailleurs, la concentration des minorités visibles soit associée avec une plus grande proportion d'utilisation du TC et inversement, à une plus faible utilisation de la voiture.
- Comparativement à un SR avec 0 % de ménages monoparentaux, un SR avec 25 % de ce groupe de la population verrait augmenter la moyenne du log du ratio de $1,398 \times 0,25 = 0,3495$, ce qui correspond à une multiplication par 1,418 du ratio, ou encore, une augmentation de 41,8 % du ratio. Il semblerait donc que toutes choses étant égales par ailleurs, la concentration des ménages monoparentaux soit associée avec une plus grande proportion d'utilisation du TC et inversement, à une plus faible utilisation de la voiture.
- Lorsque le revenu médian dans un SR augmente de 1000 dollars, on observe une réduction de la moyenne du log du ratio de -0,01, soit une multiplication du ratio par 0,99. En d'autres termes, le ratio diminue de 1 % à chaque millier de dollars supplémentaire. Il semblerait donc que dans les SR les plus nantis, l'utilisation du TC soit plus délaissée au profit de la voiture.
- Lorsque que l'accessibilité aux emplois en transport collectif est plus élevée, la moyenne du log du ratio augmente. Dans un SR avec le pire niveau d'accessibilité possible, augmenter l'accessibilité au niveau du premier quartile (au moins mieux que 25% des SR) serait associé avec une augmentation de la moyenne du log du ratio de $3,936 \times 0,25 = 0.984$, ce qui correspond à une multiplication par 2,675 du ratio.
- Cependant, lorsque l'accessibilité à pied augmente, nous pouvons observer une réduction de la moyenne du log du ratio. Dans un SR avec le pire niveau d'accessibilité possible, augmenter l'accessibilité au niveau du premier quartile (au moins mieux que 25% des SR) serait associé avec une augmentation de la moyenne du log du ratio de $-1,549 \times 0.25 = -0,387$, ce qui correspond à une multiplication par 0,679 du ratio, ou encore une réduction

de 32,1%. Ce résultat s'explique vraisemblablement par l'utilisation des modes de transport actifs plutôt qu'une utilisation accrue de la voiture.

Dans le résumé du modèle, nous pouvons observer que la spline utilisée pour capturer l'effet spatial a un impact significativement différent de 0 et comporte environ 27 degrés de libertés. Afin d'observer l'effet de cette spline, nous utilisons l'approche des effets marginaux. Cette approche consiste à effectuer une prédiction avec le modèle de la valeur attendue de la variable dépendante en conservant identiques toutes les variables indépendantes, sauf la localisation dans l'espace. En d'autres termes, nous essayons de voir comment le modèle s'ajuste quand on lui demande de prédire la valeur Y pour une observation spécifique, mais que celle-ci est déplacée dans l'espace. Ainsi, la variation de la prédiction est affectée uniquement par l'espace.

Pour obtenir l'effet uniquement spatial, nous pouvons mettre arbitrairement toutes les valeurs à 0 des différentes variables indépendantes du modèle. Ainsi, même multipliées par leurs coefficients, leur contribution dans la prédiction restera 0. Il suffit ensuite de retirer la constante pour ne bien conserver que l'effet de la spline.

```
#' Nous commençons par construire un dataframe de prédictions. Toutes les
#' variables indépendantes sont fixées à 0 et nous allons
#' prédire les valeurs tous les 500m

bbox <- st_bbox(data_mtl)
df_pred <- expand.grid(
  prt_minorite_vis = 0,
  prt_monoparental = 0,
  revenu_median = 0,
  acs_idx_emp_tc_peak = 0,
  acs_idx_emp_pieton = 0,
  X = seq(bbox[[1]], bbox[[3]], 500),
  Y = seq(bbox[[2]], bbox[[4]], 500)
)

# Nous effectuons ensuite la prédiction sur le prédicteur linéaire
df_pred$pred_log <- predict.gam(gam1, newdata = df_pred, type = 'link')

# Nous retirons ensuite la constante pour ne garder que l'effet spatial
df_pred$pred_log_cent <- df_pred$pred_log - gam1$coefficients[[1]]

# Nous pouvons ensuite utiliser la fonction exp pour faciliter l'interprétation
# puisque le ratio sera plus facile à lire que le log ratio
df_pred$pred_exp <- exp(df_pred$pred_log_cent)

# Il ne reste ensuite qu'à cartographier notre effet spatial
sf_pred <- df_pred %>%
  st_as_sf(coords = c('X', 'Y'), crs = st_crs(data_mtl)) %>%
  subset(lengths(st_intersects(., data_mtl)) > 0)

map_spline <- tm_shape(sf_pred) +
  tm_dots(col="pred_exp", n = 7,
```

```

style = "fisher",
midpoint = 1,
legend.format = list(text.separator = "à",
                      decimal.mark = ",",
                      big.mark = " ",
                      digits = 2),

palette = "-RdBu",
title = paste0('effet de la spline bivariable\n(edf = ',
               round(results$edf), '))' +
tm_shape(data_mtl) +
tm_borders('darkgrey', lwd = 0.01) +
tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE) +
tm_scale_bar(breaks = c(0,10))

map_spline

```




Figure 6.13: Représentation de l'impact de la spline spatiale bivariable

La figure 6.13 permet de visualiser l'effet multiplicatif de la spline spatiale sur le ratio prédit par le modèle. Ainsi, toute chose étant égale par ailleurs, le ratio de part modale TC/auto est entre 30 % et 70 % plus fort dans les quartiers centraux de Montréal, allant de Lachine à Anjou. L'extrémité Ouest de Longueuil fait aussi partie de cette zone avec le bonus spatial le plus important. Aussi, on constate que l'effet spatial diminue avec la distance au Centre-Ville. Pour la majeure partie de Laval, le ratio est réduit de près de 50 %.

6.5.3 GAM avec spline spatiale de type RMF

Puisque nos observations sont des polygones, utiliser leurs centroïdes pour représenter l'espace est une approximation maladroite. Nous allons donc opter pour un *markov random field* afin de modéliser les variations spatiales en fonction du voisinage.

L'enjeu avec ce type de modèle est de sélectionner son rang (k). Pour cela, nous testons plusieurs valeurs allant de 10 à 250 autorisant une complexité grandissante du terme spatial. Notons d'emblée que notre spline bivariée précédente avait nécessité seulement 25 degrés de liberté supplémentaires. La sélection de k (le nombre de degré de liberté accordé au MRF) reposera sur deux critères : l'autocorrélation spatiale encore présente dans les résidus (I de Moran calculé sur les résidus de Pearson) et l'AIC (pénalisant la complexité des modèles).

Pour accélérer le calcul, nous réalisons cette opération en traitement parallèle (*multiprocessing*). Quatre cœurs indépendants s'occuperont d'ajuster les différents modèles.

```
library(future)
library(future.apply)

# nous préparons les informations de voisinage pour le terme MRF
nb <- poly2nb(data_mtl)
names(nb) <- as.integer(attr(nb, "region.id"))
data_mtl$ID_LOC <- as.integer(attr(nb, "region.id"))

ks <- seq(10, 250, 20)

# nous allons itérer sur les valeurs de ks et ajuster nos modèles
# nous récupérerons à chaque fois les informations pertinentes dans nos
# résidus

S0 <- sum(sapply(queen_w$weights, sum))

future::plan(future::multisession(workers = 4))

resultats <- future_sapply(ks, function(k){

  model <- gam(alr_val ~ prt_minorite_vis + prt_monoparental + revenu_median +
               acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton +
               s(ID_LOC, bs = 'mrf', xt = list(nb = nb), k = k),
               data = data_mtl, family = scat)

  resid <- residuals.gam(model, type = 'scaled.pearson')
  I <- moran(resid, queen_w, n = length(resid), S0 = S0, zero.policy = TRUE)
  aic_score <- AIC(model)
  return(c(I[[1]], aic_score, k))
})

df_plot <- data.frame(t(resultats))
names(df_plot) <- c('moranI', 'aic', 'k')
```



```

plot1 <- ggplot(df_plot) +
  geom_line(aes(x = k, y = moranI), color = 'black') +
  geom_point(aes(x = k, y = moranI), color = 'red') +
  labs(x = 'k', y = 'I de Moran') +
  theme_bw()
plot2 <- ggplot(df_plot) +
  geom_line(aes(x = k, y = aic), color = 'black') +
  geom_point(aes(x = k, y = aic), color = 'red') +
  labs(x = 'k', y = 'AIC') +
  theme_bw()
ggarrange(plot1, plot2)

```




Figure 6.14: Critères de sélection de k


La figure 6.14 permet de constater que le AIC et le I de Moran diminuent à mesure que k augmente. Pour le I de Moran, nous constatons qu'au delà de $k = 100$, nous passons à des valeurs inférieures à 0,05. Aussi le AIC semble se stabiliser lorsque $k = 150$. Nous pourrions donc ajuster un modèle avec $k = 150$ pour avoir un bon compromis entre AIC et réduction du I de Moran des résidus.

```

gam2 <- gam(alr_val ~ prt_minorite_vis + prt_monoparental + revenu_median +
  acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton +
  s(ID_LOC, bs = 'mrf', xt = list(nb = nb), k = 150),
  data = data_mtl, family = scat)
res <- simulateResiduals(gam2, plot = FALSE)
plot(res)

```

DHARMA residual



```
summary(gam2)
```

Family: Scaled t(3.245,0.22)

Link function: identity

Formula:

```
alr_val ~ prt_minorite_vis + prt_monoparental + revenu_median +
  acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton + s(ID_LOC, bs = "mrfr",
  xt = list(nb = nb), k = 150)
```

Parametric coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.555219	0.108923	-23.459	< 2e-16 ***
prt_minorite_vis	1.303376	0.106976	12.184	< 2e-16 ***
prt_monoparental	0.907048	0.239301	3.790	0.000150 ***
revenu_median	-0.008566	0.001473	-5.816	6.04e-09 ***
acs_idx_emp_tc_peak	3.118112	0.199688	15.615	< 2e-16 ***
acs_idx_emp_pieton	-1.102568	0.288893	-3.817	0.000135 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Approximate significance of smooth terms:

	edf	Ref.df	Chi.sq	p-value
s(ID_LOC)	126.7	144.4	2219	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

R-sq.(adj) = 0.925 Deviance explained = 83.7%

-REML = 417.26 Scale est. = 1 n = 986

Tableau 6.2: Résultats du modèle GLM avec spatiale de type RMK

Variable	Coefficient	exp(coefficient)	Valeur de p
Constante	-2,555	0,078	0
prt_minorite_vis	1,303	3,682	0
prt_monoparental	0,907	2,477	0
revenu_median	-0,009	0,991	0
acs_idx_emp_tc_peak	3,118	22,604	0
acs_idx_emp_pieton	-1,103	0,332	0

R2 ajusté = 0,9255.

Il apparaît que les résidus simulés de ce modèle suivent une distribution assez proche d'une distribution uniforme. Nous constatons aussi que toutes les variables indépendantes sont encore significatives et impactent notre variable dépendante dans la même direction (tableau 6.2).

```
moran.mc(residuals(res), listw = queen_w, nsim = 999, zero.policy = TRUE)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: residuals(res)
weights: queen_w
number of simulations + 1: 1000

statistic = -0.022059, observed rank = 145, p-value = 0.855
alternative hypothesis: greater
```

Nous avons bien résolu le problème de l'autocorrélation spatiale de résidus. Nous pouvons donc à présent visualiser l'effet spatial de notre *Markov Random Field*. Pour cela, nous allons une fois encore appliquer la méthode des effets marginaux.

```
# on extrait toutes les observations de notre jeu de données
pred_df <- data_mtl[c('prt_minorite_vis', 'prt_monoparental', 'revenu_median',
                     'acs_idx_emp_tc_peak', 'acs_idx_emp_pieton', 'ID_LOC')]

# on met toutes les valeurs à 0 sauf l'identifiant des SR
pred_df[c(1:5)] <- 0
# On effectue la prédiction
pred_df$log_ratio <- predict.gam(gam2, newdata = pred_df, type = 'link')
# On retire l'effet de la constante
pred_df$log_ratio <- pred_df$log_ratio - gam2$coefficients[[1]]
```

```
# On bascule en exponentiel pour avoir l'effet sur le ratio
pred_df$effet_sp <- exp(pred_df$log_ratio)
results_mrf <- summary(gam2)
# on peut maintenant cartographier cet effet
map_mrf <- tm_shape(pred_df) +
  tm_fill(col="effet_sp", n = 7,
    style = "jenks",
    midpoint = exp(0),
    legend.format = list(text.separator = "à",
      decimal.mark = ",",
      big.mark = " ", digits = 2),
    palette = "-RdBu", title = paste0('effet du MRF\n(edf = ', round(results_mrf$edf), ')')) +
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE) +
  tm_scale_bar(breaks = c(0,10))
tmap_arrange(map_spline, map_mrf, nrow = 2)
```




Figure 6.15: Comparaison de la spline bivariée et du MRF

Ce terme spatial ressemble beaucoup à celui que nous avons obtenu avec la spline bivariée construite avec les coordonnées des centroïdes. Cependant, nous lui avons accordé un plus grand nombre de degrés de liberté et il s'ajuste mieux à la géographie de nos secteurs de recensement (polygones). Il aurait été possible de donner plus de flexibilité à la spline bivariée en utilisant également le paramètre k , elle serait cependant restée moins adaptée que le MRF. Par contre, l'avantage intéressant de l'approche par spline bivariée est qu'elle permet de prédire des valeurs à de nouvelles localisations, ce que ne permet pas le MRF.

6.6 Quiz de révision

Questions

- **Quelle est l'hypothèse clé des modèles de régression linéaire classique qui est assouplie dans les GAM?**
 - Les résidus doivent suivre une distribution normale.
 - Les relations entre les variables indépendantes et dépendantes doivent être linéaires.
 - Les variables indépendantes ne doivent pas être corrélées entre-elles.

Relisez au besoin la section 6.3.

- **Dans un GAM, que représente la fonction f ?**
 - Une fonction linéaire fixe.
 - Une fonction non paramétrique ajustée aux données.
 - Une fonction quadratique définie par l'utilisateur.
 - La somme d'un ensemble de bases non linéaires multipliées par leurs coefficients.

Relisez au besoin le début de la section 6.3.

- **Comment un modèle GAM peut-il être utilisé pour intégrer l'espace?**
 - Une spline spécialisée est utilisée pour capturer une tendance spatiale d'arrière-plan dans les données
 - Le modèle intègre directement l'autocorrélation spatiale dans son hypothèse quant à la distribution de ses résidus
 - Le modèle intègre une version spatialement décalée de la variable Y
 - Le modèle intègre une version spatialement décalée des variables X

Relisez au besoin la section 6.3.

- **Dans quel cas préfère-t-on utiliser un MRF plutôt qu'une spline bivariée sur les coordonnées géographiques?**
 - Lorsque les données sont représentées dans l'espace comme des points.
 - Lorsque l'espace est représenté plus adéquatement par une relation de voisinage entre les observations.
 - Lorsque le terme spatial que l'on espère ajusté doit être moins spatialement autocorrélé

Relisez au besoin la section 6.4.

- **Pour analyser l'effet spatial modélisé avec une spline, on peut :**
 - Regarder le nombre de degrés de liberté (edf) de la spline.
 - Interpréter les coefficients de chacune des bases de la spline.
 - Cartographier les résidus du modèle.
 - Cartographier l'effet de la spline grâce à la méthode des effets marginaux

Relisez au besoin la section 6.5.1.

Réponses

- **Quelle est l'hypothèse clé des modèles de régression linéaire classique qui est assouplie dans les GAM?**

- Les relations entre les variables indépendantes et dépendantes doivent être linéaires.
- Dans un GAM, que représente la fonction f ?
 - Une fonction non paramétrique ajustée aux données.
 - La somme d'un ensemble de bases non linéaires multipliées par leurs coefficients.
- Comment un modèle GAM peut-il être utilisé pour intégrer l'espace ?
 - Une spline spécialisée est utilisée pour capturer une tendance spatiale d'arrière-plan dans les données
- Dans quel cas préfère-t-on utiliser un MRF plutôt qu'une spline bivariée sur les coordonnées géographiques ?
 - Lorsque l'espace est représenté plus adéquatement par une relation de voisinage entre les observations.
- Pour analyser l'effet spatial modélisé avec une spline, on peut :
 - Regarder le nombre de degrés de liberté (edf) de la spline.
 - Cartographier l'effet de la spline grâce à la méthode des effets marginaux

6.7 Exercices de révision

Exercice

Exercice 1. Réalisation d'un modèle GAM spatiale

```
library(sf)
library(mgcv)
library(car)
library(DHARMA)
library(mgcViz)
# Chargement du jeu de données sur l'agglomération Lyonnaise
load("data/Lyon.Rdata")

# Vérification de la multicollinéarité (VIF)
vif(lm(NO2 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed, data = LyonIris))

# Construction du modèle GLM gaussien
Modele.GAM1 <- gam(à compléter)
# Résidus simulés du modèle gaussien
GAM1.res <- à compléter
plot(GAM1.res)

# Construction du modèle GLM avec une distribution de Student
Modele.GAM2 <- gam(à compléter)
# Résidus simulés avec une distribution de Student
GAM2.res <- à compléter
plot(GAM2.res)

# Comparaison des deux modèles
AIC(Modele.GAM1, Modele.GAM2)

# Résultats du modèle gaussien
summary(à compléter)

# Matrice de contiguïté selon le partage d'un nœud
queen_nb <- à compléter
queen_w <- à compléter

# I de Moran sur les résidus gaussiens
moran.mc(residuals(à compléter))

# I de Moran sur les résidus simulés
moran.mc(à compléter)
```

Correction à la section 8.5.1.

 Exercice**Exercice 2.** Réalisation d'un modèle GAM avec une spline bivariable sur les coordonnées géographiques

```
# Chargement du jeu de données sur l'agglomération Lyonnaise
load("data/Lyon.Rdata")
# Ajout des coordonnées x et y
XY <- st_coordinates(st_centroid(LyonIris))
LyonIris$X <- XY[,1]
LyonIris$Y <- XY[,2]
# Ajout des coordonnées x et y
Modele.GAMSpline <- gam(N02 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed+
                        s(X,Y, bs = 'gp', m = 3),
                        data = LyonIris, family = scat)
summary(Modele.GAMSpline)
```

Correction à la section 8.5.2.

 Exercice**Exercice 3.** Réalisation d'un modèle GAM avec une spline de type RMF

Correction à la section 8.5.3.

7 Filtrage spatial

Une autre technique utilisée pour ajouter l'espace dans un modèle a été proposée par Daniel Griffith (2019) et est connue sous le nom du filtrage spatial (*spatial filtering*). Cette technique est très flexible, car elle s'applique à n'importe quel type de modèle GLM, GLMM et GAM. L'approche est relativement simple : elle consiste à ajouter dans le modèle un ensemble de variables supplémentaires dont le rôle est de capturer des tendances spatiales qui autrement seraient présentes dans les résidus. Ces variables supplémentaires sont appelées des vecteurs propres spatiaux (*spatial eigenvectors* en anglais, SEV) et sont obtenus à partir de la matrice de pondération spatiale décrivant l'espace de nos données. Plus exactement, les SEV sont obtenus en décomposant la matrice spatiale de la même manière que nous décomposons la variance d'un jeu de données lorsque nous réalisons une analyse en composantes principales (ACP). Pour un rappel sur l'ACP, vous pouvez vous référer au [chapitre sur les analyses factorielles](#) (Apparicio et Gelb 2022). Ces vecteurs propres sont aussi appelés *Moran eigenvectors* (MEM).

🎯 Objectif

Objectifs d'apprentissage visés dans ce chapitre

À la fin de ce chapitre, vous devriez être en mesure de :

- Préparer des vecteurs propres de Moran à partir d'une matrice de pondération spatiale.
- Utiliser ces vecteurs propres pour appliquer la méthode du filtrage spatial.
- Analyser les résultats produits par un modèle de type SEVM (*Spatial Eigenvector Model*).

📦 Package

Liste des *packages* utilisés dans ce chapitre

- Pour calculer des vecteurs propres de Moran :
 - `adespatial` dédié l'analyse spatiale multidimensionnelle.
- Pour ajuster des modèles SEVM :
 - `spmoran` et `spatialreg` dédiés aux régressions spatiales.
 - `mgcv` et `gamlss` pour modéliser des GLM avec une grande flexibilité.
- Pour analyser les résidus des modèles :
 - `'DHARMA'` pour valider la distribution de modèle GLM complexes.
 - `'spdep'` pour calculer le $*I*$ de Moran et créer des matrices de pondération spatiale.
- Pour construire des cartes et des graphiques :
 - `tmap` est certainement le meilleur *package* pour la cartographie.
 - `ggplot2` pour construire des graphiques.

7.1 Les vecteurs propres de Moran

À partir d'une matrice spatiale W de taille $n \times n$, il est possible de calculer $n-1$ vecteurs propres de Moran qui représentent chacun un agencement spatial possible. Ces vecteurs propres sont obtenus en décomposant la variance de la matrice spatiale de façon analogue à une analyse en composante principale (ACP).

Aller plus loin

Analyse en composantes principales (ACP)

Pour un rappel sur l'ACP, nous vous invitons à lire la [section suivante](#) du livre *Méthodes quantitatives en sciences sociales : un grand bol d'R* (Apparicio et Gelb 2022).

Brièvement, une ACP est une méthode de réduction des données qui permet de résumer la variance d'un jeu de données ayant k colonnes avec un ensemble de l vecteurs propres avec $k > l$. Les vecteurs propres sont des nouvelles variables obtenues avec une combinaison linéaire des colonnes originales k . Le premier vecteur propre correspond à la tendance principale du jeu de données, formées par les plus importantes corrélations entre les variables originales. Ces vecteurs propres sont orthogonaux, ce qui signifie qu'ils ne sont pas corrélés entre eux.

Appliquer l'ACP à une matrice spatiale revient à extraire des variables capables de résumer l'organisation spatiale présente dans la matrice de pondération spatiale W . Le premier vecteur propre issu de l'ACP appliquée à W représente alors l'agencement spatial avec la plus forte autocorrélation spatiale positive possible. À l'inverse, le dernier vecteur propre représente l'agencement spatial avec la plus forte autocorrélation spatiale négative possible. Comme pour l'ACP, ces vecteurs propres spatiaux sont non corrélés entre eux. Ils sont aussi appelés les vecteurs propres de Moran du fait du lien entre leur formulation et celle de l'indicateur du I de Moran.

Prenons un exemple concret avec les données de secteurs de recensement de Montréal ci-dessous.





Figure 7.1: Autocorrélation des vecteurs propres issus d'une matrice de contiguïté (Queen) sur les secteurs de recensement de la RMR de Montréal


La figure 7.1 permet de visualiser la valeur du I de Moran associée avec chacun des vecteurs propres. On constate ainsi que le premier vecteur propre à une valeur de I de Moran proche de 1 et que l'autocorrélation spatiale reste positive jusqu'au vecteur 375 environ. Au-delà de ce seuil, l'autocorrélation spatiale des vecteurs devient négative.

Nous pouvons visualiser la géographie propre de chacun de ces vecteurs. À la figure 7.2, nous illustrons quatre de ces vecteurs présentant respectivement une autocorrélation spatiale positive, une distribution spatiale aléatoire et finalement une autocorrélation spatiale négative.


Vecteur propre 10 (I de Moran = 1,04)



Vecteur propre 100 (I de Moran = 0,72)



Vecteur propre 375 (I de Moran = 0,03)



Vecteur propre 970 (I de Moran = -0,54)




Figure 7.2: Représentation de quatre vecteurs propres issue d'une matrice spatiale (Queen) sur les secteurs de recensement de la RMR de Montréal

Rappelons ici que ces vecteurs sont obtenus par décomposition de la matrice de pondération spatiale. Il ne s'agit pas de données qui ont été collectées sur le territoire d'étude. Ils représentent des géographies possibles qui peuvent émerger de notre matrice de pondérations spatiales W .

7.2 Filtrage spatial

Dans un modèle utilisant l'approche de *spatial filtering*, l'idée est d'ajouter dans l'équation une sélection de vecteurs spatiaux permettant de réduire l'autocorrélation spatiale dans les résidus. Pour chaque vecteur spatial ajouté au modèle, un coefficient est ajusté. La somme des vecteurs spatiaux multipliés par leur coefficient respectif est donc un terme dans

le modèle tentant de capturer des tendances spatiales plus ou moins complexes qui autrement auraient fait partie des résidus.

$$\begin{aligned} y &\sim D(\mu, \theta) \\ g(\mu) &= \beta_0 + \beta X + \zeta \\ \zeta &= \alpha Z \end{aligned} \tag{7.1}$$

avec :

- y , la variable dépendante.
- D , une distribution avec une espérance μ et ses autres paramètres θ .
- β_0 , la constante.
- X , les variables indépendantes dont l'effet est supposé linéaire.
- β , les coefficients des variables indépendantes.
- ζ , le terme spatial utilisé pour le filtrage spatial.
- α , les coefficients des vecteurs propres spatiaux.
- Z , les vecteurs propres spatiaux ajoutés au modèle.

Note

Filtrage spatial et GAM

Il existe une forte similarité dans la formulation d'un modèle GAM et d'un modèle utilisant du filtrage spatial. Pour rappel, un modèle GAM introduit l'espace avec une spline. Or, Une spline est une combinaison d'un ensemble de fonctions de base (obtenues sur les coordonnées spatiales ou la matrice de contiguïté) multipliées par des coefficients. Dans un modèle avec filtrage spatial, la logique est similaire, mais les fonctions de base sont cette fois-ci les vecteurs propres spatiaux.

L'enjeu principal avec la méthode du filtrage spatial est de sélectionner adéquatement les vecteurs propres à intégrer dans le modèle. En effet, il n'est pas possible de tous les sélectionner, car nous aurions alors plus de coefficients à estimer que d'observations dans les données. Le choix des vecteurs propres doit valider les critères suivants :

1. Réduire l'autocorrélation spatiale des résidus (**correction de la dépendance spatiale**).
2. Améliorer l'ajustement du modèle (**contribution à la prédiction**).
3. Ne pas complexifier indûment le modèle (**principe de parcimonie**).

Il existe actuellement trois approches permettant de sélectionner les vecteurs propres spatiaux à intégrer dans un modèle. Ces trois approches partent de postulats différents et ont chacune leurs avantages et inconvénients.

7.2.1 Sélection itérative

La première approche proposée (Daniel A. Griffith 2003) consiste à appliquer une procédure itérative de sélection des vecteurs propres spatiaux, à la manière d'une régression pas à pas (*stepwise regression*). Elle ajoute un vecteur propre spatial au modèle s'il vérifie les trois critères suivants :

1. Il permet d'augmenter le R^2 du modèle.
2. Il permet de réduire l'autocorrélation spatiale des résidus.

3. Il existe une corrélation significative entre le vecteur propre et la variable dépendante.

Puisque les vecteurs propres sont non corrélés, leur ordre d'ajout dans le modèle n'a pas d'importance. Il est donc conseillé d'ordonner les vecteurs propres en fonction de leur corrélation avec la variable dépendante pour effectuer leur sélection.

Il est assez simple d'étendre cette approche à des GLM ou même des GLMM. Pour ces modèles, l'objectif ne sera pas de maximiser le R^2 , mais plutôt d'obtenir une réduction significative de la déviance (*likelihood ratio test*). Notons que pour ce type de modèle, il est important de vérifier l'autocorrélation spatiale des résidus standardisés ou simulés, car de nombreux GLM assument une hétéroscédasticité des résidus. Pour un rappel sur le *likelihood ratio test*, vous pouvez vous référer à [cette section du livre Méthodes quantitatives en sciences sociales : un grand bol d'R](#) (Apparicio et Gelb 2022).

L'approche par sélection itérative est très intuitive et relativement facile à mettre en œuvre. Cependant, elle comporte plusieurs défauts. Lorsque le jeu de donnée est grand, elle devient extrêmement coûteuse en temps de calcul, car le modèle doit être ajusté un grand nombre de fois. Aussi, bien l'ordre d'ajout des vecteurs propres n'est pas important, leur ajout séquentiel peut poser un problème. En effet, des combinaisons de vecteurs propres peuvent être particulièrement efficaces pour effectuer le filtrage spatial, ce qui n'est pas permis par la procédure pas à pas (*stepwise*). Notons ici que des approches alternatives utilisant par exemple des algorithmes génétiques ont été proposées (Helbich et Griffith 2016), bien qu'elles ne soient pas communément utilisées.

7.2.2 Effet aléatoire

Murakami et Griffith (2015) ont proposé une approche par effets aléatoires pour effectuer le filtrage spatial. Dans cette approche, les coefficients des vecteurs propres ne sont pas estimés comme des effets fixes (simples coefficients), mais comme des effets aléatoires provenant d'une distribution normale. La formulation du modèle devient alors :

$$\begin{aligned} y &\sim D(\mu, \theta) \\ g(\mu) &= \beta_0 + \beta X + \alpha Z \\ \alpha &\sim N(0, \sigma) \end{aligned} \tag{7.2}$$

avec :

- σ , un terme de variance estimé par le modèle contrôlant la variation des coefficients des vecteurs propres spatiaux α à s'écarter de 0.

L'estimation des coefficients comme des effets aléatoires entraîne une pénalisation de leur estimation. Ainsi, le modèle devient capable de retirer de lui-même les vecteurs propres non pertinents. Habituellement, les vecteurs propres inclus dans ce modèle sont les vecteurs propres ayant une autocorrélation spatiale positive, car dans la vaste majorité des cas, les résidus sont positivement spatialement autocorrélés.

Fait intéressant, cette approche pénalisée par effets aléatoires revient à imposer une pénalité de type *ridge* (l_2) aux coefficients des vecteurs spatiaux. L'objectif des régressions pénalisées est de faire tendre vers zéro les coefficients les moins importants d'un modèle afin de le rendre plus parcimonieux. Dans une formulation utilisant la pénalisation *ridge*, un paramètre d'intensité de la pénalisation doit être sélectionné, λ . Ce paramètre joue le même rôle que σ qui contrôle la dispersion des coefficients dans la formulation par effet aléatoire. λ et σ sont conceptuellement équivalents.

Notez que cette approche exclut les vecteurs propres présentant une autocorrélation spatiale négative. De plus, contrairement à l'approche par sélection itérative, elle n'a pas pour objectif de retirer l'autocorrélation spatiale des résidus,

bien qu'elle y parvienne souvent. Aussi, la pénalisation des coefficients par la méthode des effets aléatoires ne constitue pas une technique de sélection de variables. Elle permet de réduire le nombre de degrés de liberté effectifs du modèle (un effet aléatoire ne représentant pas exactement un effet fixe), sans pour autant retirer réellement les vecteurs propres les moins pertinents.

7.2.3 Sélection par LASSO

Les régressions de type *lasso* intègrent une pénalité de type l_1 lors de l'estimation des coefficients du modèle afin de forcer ceux ayant le moins d'impact lors de l'ajustement du modèle à avoir une valeur de zéro. Contrairement à la pénalisation de type l_2 (*ridge*) mentionnée plus haut, la méthode *lasso* peut plus directement contraindre un coefficient à avoir une valeur nulle.

La méthode par *lasso* a été proposée comme alternative à la sélection pas à pas (*step-wise*), notamment pour réduire le temps de calcul (Seya et al. 2015). Contrairement à l'approche pas à pas, l'approche *lasso* permet d'ajuster une seule fois le modèle, tout en sélectionnant directement les vecteurs propres pertinents. Notez que la pénalisation par *lasso* n'est appliquée qu'aux coefficients des vecteurs propres spatiaux.

7.3 Mise en œuvre et analyse dans R

Pour illustrer l'utilisation des modèles SEVM, nous utilisons le même exemple que pour les modèles GAM (section 6.5). Nous avons mentionné un peu plus haut que ces deux types de modèles se ressemblaient beaucoup dans leur façon d'intégrer l'espace dans leur formulation.

Nous modélisons donc une fois encore le log du ratio entre les parts modales du transport collectif et de la voiture pour les déplacements pendulaires pour les secteurs de recensement de la région métropolitaine de Montréal en 2021.

Afin d'éviter les répétitions, nous présentons directement les différents modèles SEVM sans reprendre le modèle GLM non spatial.

7.3.1 Modèle SEVM par sélection itérative

La première approche pour développer un SEVM consiste à sélectionner les vecteurs propres spatiaux à l'aide de la méthode décrite à la @#sec-0721. L'approche est notamment implémentée dans le *package* `spatialreg`.

```
library(sf, quietly = TRUE)
library(ggplot2, quietly = TRUE)
library(tmap, quietly = TRUE)
library(dplyr, quietly = TRUE)
library(ggpubr, quietly = TRUE)
library(spdep, quietly = TRUE)
library(spatialreg, quietly = TRUE)
library(DHARMA, quietly = TRUE)
library(adespatial, quietly = TRUE)
library(mgcv, quietly = TRUE)
library(gamlss, quietly = TRUE)
```

```
# Chargement des données
```

```
data_mtl <- st_read('data/chap06/data_sr_access.gpkg')
```

```
Reading layer 'data_sr_access' from data source
```

```
'C:\Users\appariciop\OneDrive - USherbrooke\Articles Publies ne pas supprimer\_Livres\BoLR_RegressionsSpatiales'
```

```
using driver 'GPKG'
```

```
Simple feature collection with 1004 features and 19 fields
```

```
Geometry type: MULTIPOLYGON
```

```
Dimension: XY
```

```
Bounding box: xmin: 7565320 ymin: 1197638 xmax: 7669348 ymax: 1299914
```

```
Projected CRS: NAD83 / Statistics Canada Lambert
```

```
# les variables d'accessibilités sont multipliées par 100 pour s'exprimer
```

```
# sur l'échelle 0-100 plutôt que 0-1
```

```
data_mtl$acs_idx_emp_pieton <- data_mtl$acs_idx_emp_pieton * 100
```

```
data_mtl$acs_idx_emp_tc_peak <- data_mtl$acs_idx_emp_tc_peak * 100
```

```
# Nous préparons ici les données en calculant les ratios
```

```
# remplaçant les 0 et calculant la transformation alr
```

```
data_mtl <- data_mtl %>%
```

```
  mutate(
```

```
    prt_tc = mode_tc / total_commuters,
```

```
    prt_auto = mode_auto / total_commuters,
```

```
  ) %>%
```

```
  filter(!is.na(prt_tc)) %>%
```

```
  mutate(
```

```
    prt_tc = ifelse(prt_tc == 0, min(prt_tc[prt_tc>0]), prt_tc)
```

```
  ) %>%
```

```
  mutate(
```

```
    ratio = (prt_tc / prt_auto),
```

```
    alr_val = log(prt_tc / prt_auto)
```

```
  ) %>%
```

```
  st_transform(32188)
```

La première étape consiste à créer notre matrice de contiguïté standardisée en ligne. Nous pouvons ensuite utiliser la fonction `ME` qui implémente un algorithme de sélection similaire à celui originalement proposé (Daniel A. Griffith et Peres-Neto 2006). Notez que la fonction `ME` n'ajuste pas le modèle final, mais fait seulement la sélection des vecteurs propres.

```
# Construction de la matrice de contiguïté
```

```
nbs <- poly2nb(data_mtl, queen = TRUE)
```

```
listw <- nb2listw(nbs, style = 'W', zero.policy = TRUE)
```

```
# Sélection des vecteurs propres de Moran
moran_ev_sel <- ME(alr_val ~ prt_minorite_vis + prt_monoparental + revenu_median +
  acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton,
  data = data_mtl,
  family = gaussian,
  listw = listw,
  alpha = 0.05,
  zero.policy=TRUE)
ncol(moran_ev_sel$vectors)
```

La fonction ME a sélectionné 46 vecteurs propres que nous pouvons utiliser pour ajuster le modèle complet.

```
model_sel <- glm(alr_val ~ prt_minorite_vis + prt_monoparental + revenu_median +
  acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton +
  fitted(moran_ev_sel),
  data = data_mtl,
  family = gaussian)

# Validation des résidus
res <- simulateResiduals(model_sel, plot = FALSE)
moran.mc(residuals(res), listw = listw, nsim = 999)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: residuals(res)
weights: listw
number of simulations + 1: 1000

statistic = 0.084006, observed rank = 1000, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater
```

```
plot(res)
```


DHARMA residual




Figure 7.3: Résidus simulés du modèle SEVM par sélection

La figure 7.3 montre que les résidus simulés ne suivent pas une distribution uniforme. Nous avons rencontré un enjeu similaire lorsque nous avons ajusté les modèles GAM dans la section 6.5. Nous avons notamment déterminé qu'une distribution de Student était plus adaptée qu'une simple distribution normale pour notre GLM. La fonction ME permet de sélectionner les vecteurs propres spatiaux pour un nombre limité de GLM. Pour pouvoir appliquer l'approche de sélection à d'autres types de modèles, il est nécessaire de l'implémenter manuellement. Nous répliquons ici l'approche décrite à la ?@sec-0621.

```
# Précalcul des vecteurs propres
moran_ev <- mem(listw, MEM.autocor = 'all')

# Ajout des vecteurs propres dans les données originales
data_mtl2 <- cbind(data_mtl, moran_ev)

# Calcul de la corrélation entre Y et les vecteurs propres pour les intégrer
# selon l'ordre de leur corrélation avec Y
corr_vals <- sapply(names(moran_ev), function(x){
  cor(
    x = data_mtl2$alr_val,
    y = data_mtl2[[x]])
})
corr_vals <- abs(corr_vals)

vector_names <- names(moran_ev)
```

```

vector_names <- vector_names[order(corr_vals, decreasing = TRUE)]

# Préparation de l'équation de base de notre modèle

base_formula <- "alr_val ~ prt_minorite_vis +
                prt_monoparental + revenu_median +
                acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton"

# Nous ajustons aussi un modèle de base de référence
# qui sera comparé aux différentes propositions
base_model <- gam(alr_val ~ prt_minorite_vis +
                  prt_monoparental + revenu_median +
                  acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton,
                  family = scat,
                  data = data_mtl2)

# Calcul du I de Moran du modèle de référence
resid <- residuals(base_model, type = "pearson")
S0 <- sum(apply(listw$weights, sum))
moran_ref <- moran(resid, listw,
                   n = length(resid), S0 = S0, zero.policy = TRUE)$I

# préparation d'une liste vide dans laquelle nous stockerons les
# noms des vecteurs propres à ajouter
vecteurs_retenus <- list()

# Lancement des itérations sur chacun des vecteurs
for(vec in vector_names){
  # pour chaque itération, nous devons proposer une version
  # modifiée de la formule
  candidate_formula <- as.formula(paste0(base_formula, '+', vec))
  # avec cette formule, nous pouvons ajuster notre modèle GLM
  model <- gam(candidate_formula,
               family = scat,
               data = data_mtl2)

  # Nous regardons en premier si le fit du modèle est meilleur avec
  # un test de rapport de vraisemblance
  test1 <- anova(model, base_model, test = 'Chisq')
  p_val <- test1$`Pr(>Chi)`[[2]]

  if(is.na(p_val)){
    p_val <- 1
  }

  # si le test est significatif, nous pouvons ensuite tester
  # l'autocorrélation spatiale des résidus

```

```

if(p_val < 0.01){

  resid <- residuals(model, type = "pearson")
  moran_value <- moran(resid,
                        listw = listw,
                        n = length(resid),
                        S0 = S0,
                        zero.policy = TRUE)$I
  diff <- moran_ref - moran_value

  # si le I de Moran est réduit d'au moins 0.0005, alors on garde le vecteur
  # propre dans le modèle.
  if(diff > 0.0005){
    # on doit alors mettre à jour notre formule de base
    base_formula <- paste0(base_formula, '+',vec)

    # on met à jour notre modèle de base
    base_model <- model

    # on met à jour notre valeur de I de Moran de référence
    moran_ref <- moran_value

    # on va aussi stocker quelques informations sur les vecteurs ajoutés
    vecteurs_retenus[[length(vecteurs_retenus) + 1]] <- list(
      'vecteur' = vec,
      'new_moran' = moran_value,
      'new_aic' = model$aic
    )
  }
}
}
retenu <- data.frame(do.call(rbind, vecteurs_retenus))

```

Tableau 7.1: Vecteurs propres retenus

Vecteur propre	I de Moran	AIC
MEM4	0,50	1 392,86
MEM3	0,47	1 350,14
MEM8	0,47	1 344,17
MEM5	0,44	1 298,24
MEM1	0,42	1 278,19
MEM9	0,42	1 265,54
MEM17	0,41	1 241,89
MEM15	0,39	1 196,29
MEM16	0,38	1 189,13

Tableau 7.1: Vecteurs propres retenus

Vecteur propre	I de Moran	AIC
MEM43	0,35	1 160,88
MEM19	0,34	1 143,41
MEM121	0,33	1 136,94
MEM20	0,32	1 124,48
MEM6	0,32	1 119,16
MEM115	0,31	1 100,44
MEM22	0,29	1 053,37
MEM106	0,29	1 042,85
MEM39	0,28	1 034,37
MEM107	0,28	1 024,68
MEM95	0,27	1 012,36
MEM28	0,27	1 007,68
MEM50	0,25	981,69
MEM38	0,24	957,51
MEM14	0,23	949,84
MEM53	0,22	943,90
MEM172	0,22	935,87
MEM13	0,21	925,88
MEM24	0,21	916,87
MEM54	0,20	906,48
MEM73	0,19	897,24
MEM37	0,19	892,23
MEM27	0,18	886,52
MEM31	0,17	874,96
MEM40	0,14	829,67
MEM101	0,14	824,92
MEM44	0,13	810,20
MEM210	0,13	804,94
MEM48	0,12	783,58
MEM248	0,12	777,71
MEM111	0,10	752,07
MEM94	0,10	740,48
MEM25	0,09	720,77
MEM45	0,09	713,39
MEM186	0,09	704,67
MEM135	0,08	697,60

La procédure que nous avons appliquée a retenu 45 vecteurs propres (tableau 7.1) et est parvenue à réduire très significativement le I de Moran des résidus ($I = 0,158$).

```
# Validation brève des résidus
res <- simulateResiduals(base_model, plot = FALSE)
```

```
plot(res)
# I de Moran sur les résidus du modèle
moran.mc(residuals(res), listw = listw, nsim = 999)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: residuals(res)
weights: listw
number of simulations + 1: 1000
```

```
statistic = 0.082123, observed rank = 1000, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater
```

DHARMA residual




Figure 7.4: Résidus simulé du modèle SEVM avec distribution de Student par sélection pas à pas

Nous notons une nette amélioration dans la distribution des résidus (figure 7.4). Nous effectuerons l'interprétation des résultats de ce modèle en comparaison avec ceux obtenus par les deux autres versions (?@sec-0634).

7.3.2 Modèle SEVM avec effet aléatoire

Pour rappel, le modèle SEVM par effet aléatoire consiste à ne retenir que les vecteurs propres avec de l'autocorrélation positive et à pénaliser les coefficients des vecteurs propres en les modélisant comme un effet aléatoire provenant d'une

distribution normale centrée sur 0. Cette approche est plus difficile à appliquer dans R, notamment parce qu'elle relève intrinsèquement d'une conception bayésienne du modèle. Le *package* `spmoran` offre une implémentation, mais elle se limite principalement sur le modèle linéaire classique (distribution gaussienne des résidus). Toutefois, `spmoran` peut être utilisé pour modéliser d'autres types de distribution, mais il utilise pour cela des fonctions de lien complexe transformant la variable dépendante pour garantir qu'elle suit une distribution normale. Cette approche rend l'interprétation des effets des variables indépendantes très difficile.

Cependant, comme nous l'avons mentionné plus haut (?@sec-0622), la pénalisation des coefficients d'un modèle induite par leur introduction comme un effet aléatoire est équivalente à leur pénalisation par la méthode *ridge* (*l1 regularization*). Il existe plusieurs *packages* dans R permettant d'implémenter ce type de pénalisation dans des GLM dont `glmnet`, `ridge`, et `gamlss`. Le *package* `mgcv` que nous avons présenté dans la section sur les modèles GAM est également capable d'inclure une pénalité de type *ridge* sur les coefficients des termes linéaires. Il faut pour cela utiliser un paramètre méconnu appelé `paraPen`. Considérant que la distribution de Student a donné des bons résultats jusqu'ici avec la fonction `gam` et le paramètre `family = scat`, nous allons continuer à les utiliser. De plus, le *package* `mgcv` est capable de déterminer automatiquement le paramètre λ calibrant la force de la pénalisation.

```
# Nous devons commencer par sélectionner tous les vecteurs
# avec un I de Moran positif
# Précalcul des vecteurs propres
moran_ev <- mem(listw, MEM.autocor = 'all')
# pour rappel, cette méthode limite les vecteurs propres à ceux ayant une
# autocorrélation spatiale positive, nous allons donc retenir ici les
# 100 premiers vecteurs
ok_vectors <- as.matrix(moran_ev[,1:100])
```

Nous calculons ensuite le modèle avec la fonction `gam` du *package* `mgcv`.

```
model_ridge <- gam(alr_val ~ prt_minorite_vis +
  prt_monoparental + revenu_median +
  acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton +
  ok_vectors,
  family = scat,
  paraPen = list('ok_vectors' = list(diag(ncol(ok_vectors)))),
  method = "ML",
  data = data_mtl)
```

```
# Validation brève des résidus
res <- simulateResiduals(model_ridge, plot = FALSE)
plot(res)
# I de Moran sur des résidus
moran.mc(residuals(res), listw = listw, nsim = 999)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: residuals(res)
```

```
weights: listw
number of simulations + 1: 1000
```

```
statistic = 0.054179, observed rank = 999, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater
```

DHARMA residual




Figure 7.5: Résidus du modèle RE-SEVM

Les résidus du modèle SEVM (figure 7.5) avec effets aléatoires sont assez proches d'une distribution uniforme et n'ont plus d'autocorrélation spatiale ($I = 0,054$).

7.3.3 Modèle SEVM avec pénalisation par Lasso

Le *package* de prédilection pour créer des modèles avec des pénalisations est *glmnet*, car il permet notamment d'intégrer des pénalisations de type *lasso*, *ridge*, et *elastic-net*. Cependant, les distributions supportées par *glmnet* sont assez limitées. Il est aussi possible d'utiliser le *package* *gamlss* qui est beaucoup plus flexible et il peut utiliser les fonctions de *glmnet* pour introduire des pénalités. L'approche ici est similaire à celle présentée dans la section précédente. Nous commençons par précalculer les vecteurs propres et retenir uniquement les vecteurs avec une autocorrélation spatiale positive. Nous introduisons ensuite ces vecteurs avec une pénalisation sur leurs coefficients dans le modèle. Dans le *package* *gamlss*, la famille TF est comparable à la famille *scat* de *mgcv*. Aussi, *gamlss* est capable de choisir le meilleur degré de pénalisation selon un critère (ML pour maximum de vraisemblance et GAIC pour AIC généralisé) sélectionné par la personne utilisatrice. Notez que la fonction *ri* utilisée ici permet aussi d'ajuster une pénalisation de type *ridge* avec le paramètre $L_p = 2$.

```

# Nous devons commencer par sélectionner tous les vecteurs
# avec un I de Moran positif
# Précalcul des vecteurs propres
moran_ev <- mem(listw, MEM.autocor = 'all')
# Pour rappel, cette méthode limite les vecteurs propres à ceux ayant une
# autocorrélation spatiale positive, nous allons donc retenir ici les
# 100 premiers vecteurs
ok_vectors <- as.matrix(moran_ev[,1:100])
data_mtl2 <- cbind(data_mtl, ok_vectors)
mem_vars <- colnames(ok_vectors)
model_lasso <- gamlss(alr_val ~ prt_minorite_vis +
  prt_monoparental + revenu_median +
  acs_idx_emp_tc_peak + acs_idx_emp_pieton +
  ri(x.vars = mem_vars,
    method = 'GAIC',
    Lp = 1),
  family = TF,
  control = gamlss.control(n.cyc = 50),
  data = data_mtl2)

# pour utiliser le package DHARMA et visualiser les résidus simulés d'un modèle
# GAMLSS, il faut extraire manuellement des simulations du modèle.
# Nous allons extraire ici 1000 simulations

# extraction des paramètres prédits par le modèle
# l'espérance
pred_mu <- predict(model_lasso, what = 'mu', type = 'response')
# la variance
pred_sigma <- predict(model_lasso, what = 'sigma', type = 'response')
# le nombre de degrés de libertés
pred_nu <- predict(model_lasso, what = 'nu', type = 'response')
# réalisation de 1000 simulations
nsim <- 1000
sims <- t(apply(1:length(pred_mu), function(i){
  sim <- rTF(nsim, mu = pred_mu[[i]],
    sigma = pred_sigma[[i]],
    nu = pred_nu[[i]])
  return(sim)
}))

res <- createDHARMA(simulatedResponse = sims,
  observedResponse = data_mtl2$alr_val,
  fittedPredictedResponse = pred_mu
)

plot(res)
# validation brève des résidus

```



```
moran.mc(residuals(res), listw = listw, nsim = 999)
```

Monte-Carlo simulation of Moran I

```
data: residuals(res)
weights: listw
number of simulations + 1: 1000
```

```
statistic = 0.038247, observed rank = 968, p-value = 0.032
alternative hypothesis: greater
```

DHARMA residual




Figure 7.6: Résidus du modèle LASSO-SEVM

Le modèle semble également avoir des résidus correctement ajustés et ne présentant plus de dépendance spatiale ($I = 0,040$).

7.3.4 Comparaison des trois modèles SEVM

Nous avons ajusté trois modèles implémentant l'approche de *spatial filtering* et comparons ici leurs résultats. Nous regardons d'abord les coefficients des variables indépendantes estimés par les modèles, puis nous comparons les termes spatiaux.

Tableau 7.2: Comparaison des trois modèles SEV

	Sélection itérative		Effet aléatoire		Lasso	
	coef.	p	coef.	p	coef.	p
Constante	-3,104	***	-2,970	***	-2,809	***
Minorités visibles (%)	0,914	***	1,476	***	1,347	***
Ménages monoparentaux (%)	1,393	***	0,999	***	1,012	***
Revenu médian (1000 \$)	-0,007	***	-0,007	***	-0,008	***
Accessibilité aux emplois en TC (%)	0,051	***	0,041	***	0,037	***
Accessibilité aux emplois à pied (%)	-0,008	***	-0,004		-0,004	*

I de Moran sur les résidus : sélection pas à pas (0,082), effet aléatoire (0,054), Lasso (0,039).

Il est intéressant de noter que les trois modèles ne produisent pas exactement les mêmes résultats. Bien qu'ils renvoient des effets sensiblement de mêmes ordres de grandeur et directions, nous observons en particulier que :

- Le modèle utilisant la méthode des effets aléatoires indique que l'accessibilité aux emplois à pied n'a pas d'effet significatif. Le modèle utilisant la pénalisation par lasso indique une faible significativité ($<0,05$) et un coefficient deux fois plus petit que le modèle par sélection itérative.
- Le modèle par sélection itérative indique un effet du pourcentage de minorités visibles beaucoup plus faible que les deux autres modèles. Une augmentation de 10 points de pourcentage des minorités visibles est associée avec une multiplication par 1,096 du ratio entre les parts modales du transport en commun et de l'automobile. Pour le modèle lasso, la multiplication serait de 1,144.
- Les trois modèles s'accordent globalement sur l'impact du revenu médian. Une augmentation de 1000 \$ de ce dernier dans un secteur de recensement (SR) est associé avec une réduction de 0,73 % du ratio les parts modales du transport en commun et de l'automobile pour le premier modèle et 0,72 % et 0,78 % pour les deux autres modèles.
- Sans surprise, l'accessibilité aux emplois en transport collectif a un impact important et significatif dans les trois modèles. Une augmentation de 10 points de cet indicateurs (allant de 0 à 100) est associée avec une augmentation de la moyenne du ratio entre part modale TC et automobile de 65,9 %, 50,7 % et 44,8 % respectivement.

Une partie des différences dans les résultats obtenus s'expliquent par une prise en compte différente de l'espace par les trois modèles. Nous pouvons représenter les trois termes spatiaux en utilisant la méthode des effets marginaux. Afin de comparer facilement les trois effets, nous représentons les trois cartes avec la même légende.

```
#save(base_model, model_ridge, model_lasso,model_sel,retenu,moran_ev_sel, data_mtl2, file = 'data/chap07/models.
#-----
# Extraction du terme spatial du modèle par sélection
# Préparation du jeu de données avec tous les prédicteurs à 0
# sauf les vecteurs propres spatiaux
pred_df <- cbind(data_mtl, moran_ev)
pred_df$prt_minorite_vis <- 0
pred_df$prt_monoparental <- 0
pred_df$revenu_median <- 0
```

```

pred_df$acs_idx_emp_tc_peak <- 0
pred_df$acs_idx_emp_pieton <- 0
# Réalisation de la prédiction et retrait de la constante
pred_sel <- predict(base_model, newdata = pred_df)
pred_sel <- pred_sel - base_model$coefficients[[1]]
# Transformation avec la fonction exp pour passer du log ratio au simple ratio
pred_sel <- exp(pred_sel)

#-----
# Extraction du terme spatial du modèle par effet aléatoire
# préparation du jeu de données avec tous les prédicteurs à 0
# sauf les vecteurs propres spatiaux
pred_df <- data_mtl
pred_df$prt_minorite_vis <- 0
pred_df$prt_monoparental <- 0
pred_df$revenu_median <- 0
pred_df$acs_idx_emp_tc_peak <- 0
pred_df$acs_idx_emp_pieton <- 0
pred_df$ok_vectors <- as.matrix(moran_ev[,1:100])
# Réalisation de la prédiction et retrait de constante
pred_ridge <- predict(model_ridge, newdata = pred_df)
pred_ridge <- pred_ridge - model_ridge$coefficients[[1]]
# Transformation avec la fonction exp pour passer du log ratio au simple ratio
pred_ridge <- exp(pred_ridge)

#-----
# Extraction du terme spatial du modèle par lasso
# Préparation du jeu de données avec tous les prédicteurs à 0
# sauf les vecteurs propres spatiaux
pred_df <- cbind(data_mtl, moran_ev)
pred_df$prt_minorite_vis <- 0
pred_df$prt_monoparental <- 0
pred_df$revenu_median <- 0
pred_df$acs_idx_emp_tc_peak <- 0
pred_df$acs_idx_emp_pieton <- 0
# pred_df$ok_vectors <- as.matrix(moran_ev[,1:100])
mem_vars <- colnames(ok_vectors)
# Réalisation de la prédiction et retrait de la constante
pred_lasso <- predict(model_lasso, newdata = pred_df, what = 'mu')
pred_lasso <- pred_lasso - model_lasso$mu.coefficients[[1]]
# Transformation avec la fonction exp pour passer du log ratio au simple ratio
pred_lasso <- exp(pred_lasso)

data_mtl$effet_sel <- pred_sel
data_mtl$effet_ridge <- pred_ridge
data_mtl$effet_lasso <- pred_lasso

```

```

# Détermination d'une palette de couleurs pour la légende
library(classInt)
breaks <- classIntervals(c(pred_sel,
                           pred_ridge,
                           pred_lasso),
                         style = "fisher",
                         n = 7)

legende.parametres <- list(text.separator = "à",
                          decimal.mark = ",",
                          digits = 2)

map1 <- tm_shape(data_mtl) +
  tm_fill(col="effet_sel",
         breaks = breaks$brks,
         midpoint = 1,
         legend.format = legende.parametres,
         palette = "-RdBu", title = ) +
  tm_layout(frame=FALSE, legend.show = FALSE, title = 'SEL-SEVM')

map2 <- tm_shape(data_mtl) +
  tm_fill(col="effet_ridge",
         breaks = breaks$brks,
         midpoint = 1,
         legend.format = legende.parametres,
         palette = "-RdBu") +
  tm_layout(frame=FALSE, legend.show = FALSE, title = 'RE-SEVM')

map3 <- tm_shape(data_mtl) +
  tm_fill(col="effet_lasso",
         breaks = breaks$brks,
         midpoint = 1,
         legend.format = legende.parametres,
         palette = "-RdBu") +
  tm_layout(frame=FALSE, legend.show = FALSE, title = 'LASSO-SEVM')

# Cette carte est ajoutée pour ne pas apparaître mais afficher la légende
# commune dans le 4ème panneau
map4 <- tm_shape(data_mtl) +
  tm_fill(col="effet_lasso",
         breaks = breaks$brks,
         midpoint = 1,
         legend.format = legende.parametres,
         palette = "-RdBu", title = 'effet spatial') +
  tm_layout(legend.only = TRUE, scale=1.5, asp=0)

```

```
tmap_arrange(map1, map2, map3, map4, nrow = 2, ncol = 2)
```




Figure 7.7: Comparaison des termes spatiaux des trois modèles SEVM

Les effets spatiaux capturés par les trois modèles sont très similaires (figure 7.7). La corrélation est cependant beaucoup plus élevée entre le terme spatial du modèle RE-SEVM et LASSO-SEVM (0,98) qu'avec le modèle SEL-SEVM (0,8). Une différence notable s'observe pour l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal : les modèles RE-SEVM et LASSO-SEVM ont des termes spatiaux avec des valeurs bien plus élevées pour ce secteur dans lequel la part modale active (marche + vélo) est très élevée. Ceci explique probablement la réduction de l'effet de la variance indépendante d'accessibilité à pied aux emplois dans ces modèles.

Les conclusions que nous pouvons tirer des trois modèles sont donc similaires, mais avec tout de même des différences non négligeables. Ces différences s'expliquent par la façon dont les vecteurs propres spatiaux ont été intégrés dans le modèle. Notons que les approches par effets aléatoires et pénalisation lasso ont tendance à être plus rapide à estimer et repose sur un fondement théorique plus défendable. En effet, leurs pénalisations respectives peuvent être interprétées comme des à priori bayésiens utilisés pour réguler le modèle. La méthode par sélection correspond plus à une démarche ad hoc, mais qui a été utilisée à de nombreuses reprises et est relativement facile à implémenter avec n'importe quel type de modèle puisque les vecteurs propres spatiaux sont introduits comme de simples effets fixes.

7.4 Quiz de révision

Questions

- **Comment un modèle SEVM intègre-t-il les effets spatiaux?**

- En ajustant la distribution conditionnelle supposée de la variable dépendante pour intégrer la dépendance spatiale.
- En ajoutant au modèle des variables spatialement décalées.
- En ajoutant au modèle des vecteurs propres spatiaux.

Relisez au besoin la section 7.2.

- **Qu'est-ce qu'un vecteur propre spatial?**

- Une variable quantitative continue
- Une variable construite à partir d'une matrice de pondération spatiale
- Une variable avec une autocorrélation spatiale positive

Relisez au besoin la section 7.1.

- **L'approche classique de construction d'un modèle SEVM consiste à :**

- Appliquer un processus itératif de sélection des vecteurs propres à ajouter dans le modèle
- Sélectionner uniquement les vecteurs propres améliorant le R^2 du modèle
- Sélectionner uniquement les vecteurs propres avec une autocorrélation spatiale positive

Relisez au besoin la section 7.2.1.

- **L'approche LASSO et l'approche par effet aléatoire ont un point commun:**

- Elles sont plus lentes à calculer que la méthode par sélection
- Elles retiennent les vecteurs propres pertinents en incluant une pénalisation
- Elles sont moins efficaces pour capturer la corrélation spatiale dans les résidus

Relisez au besoin la section 7.2.2 et la section section 7.2.3.

- **Comment peut-on interpréter les effets spatiaux dans un modèle SEVM?**

- En analysant les coefficients des vecteurs spatiaux intégrés au modèle
- En analyse le degré de pénalisation sélectionné par la méthode GAIC
- En cartographiant les effets spatiaux par la méthode des effets marginaux

Relisez au besoin la section 7.3.4.

Réponses

- Comment un modèle SEVM intègre-t-il les effets spatiaux?
 - En ajoutant au modèle des vecteurs propres spatiaux.
- Qu'est-ce qu'un vecteur propre spatial?

- Une variable quantitative continue
 - Une variable construite à partir d’une matrice de pondération spatiale
- L’approche classique de construction d’un modèle SEVM consiste à :
 - Appliquer un processus itératif de sélection des vecteurs propres à ajouter dans le modèle
- L’approche LASSO et l’approche par effet aléatoire ont un point commun:
 - Elles retiennent les vecteurs propres pertinents en incluant une pénalisation
- Comment peut-on interpréter les effets spatiaux dans un modèle SEVM?
 - En cartographiant les effets spatiaux par la méthode des effets marginaux

Partie 7. Exercices et bibliographie

8 Correction des exercices

8.1 Exercices du chapitre 1

8.1.1 Exercice 1

8.1.2 Exercice 2

8.1.3 Exercice 3

8.2 Exercices du chapitre 2

8.2.1 Exercice 1

```
library(sf)
library(spatialreg)
# Matrice de contiguïté selon le partage d'un segment (Rook)
load("data/Lyon.Rdata")
Rook <- poly2nb(LyonIris, queen=FALSE)
W.Rook <- nb2listw(Rook, zero.policy=TRUE, style = "W")
# Modèles
formule <- "PM25 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed"
# Modèles MOC, SLX, SDM, SDEM, SAR, SEM, Manski
MCO <- lm(formule, data = LyonIris)
SLX <- lmSLX(formule, listw = W.Rook, data = LyonIris)
Manski <- sacsarlml(formule, listw=W.Rook, data = LyonIris, type="sacmixed")
SDM <- lagsarlml(formule, listw = W.Rook, data = LyonIris, type = "mixed")
SDEM <- errorsarlml(formule, listw=W.Rook, data = LyonIris, etype = 'emixed')
SAR <- lagsarlml(formule, listw=W.Rook, data = LyonIris, type = 'lag')
SEM <- errorsarlml(formule, listw=W.Rook, data = LyonIris)
```

8.2.2 Exercice 2

```
summary(lm.LMtests(model = MCO,
                    listw = W.Rook,
                    test = c("LMlag", "LMerr", "RLMlag", "RLMerr")))
```

8.2.3 Exercice 3

```
## Valeurs d'AIC et de BIC
AICs <- AIC(MCO, SLX, SDM, SDEM, SAR, SEM)
BICs <- BIC(MCO, SLX, SDM, SDEM, SAR, SEM)
## Autocorrélation spatiale des résidus
IMoran.MCO <- moran.mc(resid(MCO), W.Rook, nsim=999)
IMoran.SLX <- moran.mc(resid(SLX), W.Rook, nsim=999)
IMoran.SAR <- moran.mc(resid(SAR), W.Rook, nsim=999)
IMoran.SEM <- moran.mc(resid(SEM), W.Rook, nsim=999)
IMoran.SDM <- moran.mc(resid(SDM), W.Rook, nsim=999)
IMoran.SDEM <- moran.mc(resid(SDEM), W.Rook, nsim=999)

MoranI.s <- c(IMoran.MCO$statistic, IMoran.SLX$statistic,
              IMoran.SAR$statistic, IMoran.SEM$statistic,
              IMoran.SDM$statistic, IMoran.SDEM$statistic)

MoranI.p <- c(IMoran.MCO$p.value, IMoran.SLX$p.value,
              IMoran.SAR$p.value, IMoran.SEM$p.value,
              IMoran.SDM$p.value, IMoran.SDEM$p.value)

## Tableau
Comparaison <- data.frame(Modele = c("MCO", "SLX", "SAR", "SEM", "SDM", "SDEM"),
                          AIC = round(AICs$AIC, 2),
                          BIC = round(BICs$BIC, 2),
                          dl = AICs$df,
                          MoranI = round(MoranI.s, 3),
                          MoranIp = round(MoranI.p, 3))

Comparaison
```

8.3 Exercices du chapitre 3

8.3.1 Exercice 1

8.3.2 Exercice 2

8.3.3 Exercice 3

8.4 Exercices du chapitre 4

8.4.1 Exercice 1

```

library(sf)
library(spgwr)
load("data/Lyon.Rdata")
# Ajout des coordonnées x et y
xy <- st_coordinates(st_centroid(LyonIris))
LyonIris$X <- xy[,1]
LyonIris$Y <- xy[,2]
# Optimisation du nombre de voisins avec le CV
formule <- "PM25 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed"
bwaCV.voisins <- gwr.sel(formule,
                        data = LyonIris,
                        method = "cv",
                        gweight=gwr.bisquare,
                        adapt=TRUE,
                        verbose = FALSE,
                        RMSE = TRUE,
                        longlat = FALSE,
                        coords=cbind(LyonIris$X,LyonIris$Y))
# Optimisation du nombre de voisins avec l'AIC
formule <- "PM25 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed"
bwaCV.voisins <- gwr.sel(formule,
                        data = LyonIris,
                        method = "CV",
                        gweight=gwr.bisquare,
                        adapt=TRUE,
                        verbose = FALSE,
                        RMSE = TRUE,
                        longlat = FALSE,
                        coords=cbind(LyonIris$X,LyonIris$Y))
# Réalisation de la GWR
Modele.GWR <- gwr(formule,
                  data = LyonIris,
                  adapt=bwaCV.voisins,
                  gweight=gwr.bisquare,
                  hatmatrix=TRUE,
                  se.fit=TRUE,
                  coords=cbind(LyonIris$X,LyonIris$Y),
                  longlat=FALSE)
# Affichage des résultats
Modele.GWR

```

8.4.2 Exercice 2

```

# Modèle MCO
Modele.Global <- lm(formule, data = LyonIris)
# Comparaison des R2
R2.global <- summary(Modele.Global)$r.squared
rss <- sum((Modele.GWR$lm$y - Modele.GWR$SDF$pred)^2)
tss <- sum((Modele.GWR$lm$y - mean(Modele.GWR$SDF$pred))^2)
R2.GWRquasiglobal <- 1 - (rss / tss)
cat("R2 global (LM) = ", round(R2.global, 3),
    "\nR2 quasi-global (GWR) : ", round(R2.GWRquasiglobal, 3))
# Comparaison des R2
anova(Modele.GWR)
LMZ.F1GWR.test(Modele.GWR)
LMZ.F2GWR.test(Modele.GWR)
# Les coefficients du modèle GWR varient-ils significativement dans l'espace?
LMZ.F3GWR.test(Modele.GWR)

```

8.4.3 Exercice 3

```

library(tmap)
# Récupération du R carré locaux et valeurs de t locales
LyonIris$GWR.R2 <- Modele.GWR$SDF$localR2
VarsIndep <- c("Pct0_14", "Pct_65", "Pct_Img", "Pct_brevet", "NivVieMed")
for(e in VarsIndep){
  # Nom des nouvelles variables
  var.coef <- paste0("GWR.", "B_", e)
  var.t <- paste0("GWR.", "T_", e)
  # Récupération des coefficients pour les variables indépendantes
  LyonIris[[var.coef]] <- Modele.GWR$SDF[[e]]
  # Calcul des valeurs de t pour les variables indépendantes
  LyonIris[[var.t]] <- Modele.GWR$SDF[[e]] / Modele.GWR$SDF[[paste0(e, "_se")]]
}

# Cartographie des R2 locaux
legendes.parametres <- list(text.separator = "à",
                             decimal.mark = ",",
                             big.mark = " ")
tm_shape(LyonIris)+
  tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.R2",
          palette="YlOrBr",
          n=5, style="quantile",
          legend.format = legendes.parametres,
          title = "R2 locaux")+
  tm_layout(frame=FALSE)+

```

```

tm_scale_bar(breaks=c(0,5))

# Cartographie des valeurs de t locales
## Paramètres pour la légende
legende.parametres <- list(text.separator = "à",
                           text.less.than = "Moins de",
                           text.or.more = "et plus",
                           decimal.mark = ",",
                           big.mark = " ")

## Cartographie
classes.intervalles = c(-Inf, -3.29, -2.58, -1.96, 1.96, 2.58, 3.29, Inf)
Carte1 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.T_Pct0_14", palette="-RdBu",
          midpoint = NA,
          breaks = classes.intervalles,
          legend.format = legende.parametres,
          title = "Moins de 15 ans (%)")+
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte2 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.T_Pct_65", palette="-RdBu",
          midpoint = NA,
          breaks = classes.intervalles,
          legend.format = legende.parametres,
          title = "65 ans et plus (%)")+
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte3 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.T_Pct_Img", palette="-RdBu",
          midpoint = NA,
          breaks = classes.intervalles,
          legend.format = legende.parametres,
          title = "Immigrants (%)")+
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte4 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.B_Pct_brevet", palette="-RdBu",
          midpoint = NA,
          breaks = classes.intervalles,
          legend.format = legende.parametres,
          title = "Faible scolarité (%)")+
  tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)

Carte5 <- tm_shape(LyonIris)+ tm_borders(col="gray25", lwd=.5)+
  tm_fill(col="GWR.T_NivVieMed", palette="-RdBu",

```

```

        midpoint = NA,
        breaks = classes.intervalles,
        legend.format = legende.parametres,
        title = "Niveau de vie (€1000)"+
tm_layout(frame=FALSE, legend.outside = TRUE)+
tm_scale_bar(breaks=c(0,5))

tmap_arrange(Carte1, Carte2, Carte3, Carte4, Carte5, ncol = 2, nrow=3)

```

8.5 Exercices du chapitre 5

8.5.1 Exercice 1

```

library(sf)
library(mgcv)
library(car)
library(DHARMA)
library(mgcViz)
# Chargement du jeu de données sur l'agglomération Lyonnaise
load("data/Lyon.Rdata")

# Vérification de la multicollinéarité (VIF)
vif(lm(PM25 ~ Lden+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed, data = LyonIris))

# Construction du modèle GLM gaussien
Modele.GAM1 <- gam(PM25 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                  family = gaussian, data = LyonIris)
# Résidus simulés du modèle gaussien
GAM1.res <- simulateResiduals(Modele.GAM, plot = FALSE)
plot(GAM1.res)

# Construction du modèle GLM avec une distribution de Student
Modele.GAM2 <- gam(PM25 ~ Pct0_14+Pct_65+Pct_Img+Pct_brevet+NivVieMed,
                  family = scat, data = LyonIris)
# Résidus simulés avec une distribution de Student
GAM2.res <- simulateResiduals(Modele.GAM, plot = FALSE)
plot(GAM2.res)

# Comparaison des deux modèles
AIC(Modele.GAM1, Modele.GAM2)

# Résultats du modèle gaussien
summary(Modele.GAM2)

```

```
# Matrice de contiguïté selon le partage d'un nœud
queen_nb <- poly2nb(LyonIris, queen = TRUE)
queen_w <- nb2listw(queen_nb, style = 'W', zero.policy = TRUE)

# I de Moran sur les résidus gaussiens
moran.mc(residuals(Modele.GAM2,
                  type = 'pearson'),
          listw = queen_w, nsim = 999,
          zero.policy = TRUE)

# I de Moran sur les résidus simulés
moran.mc(residuals(GAM2.res,
                  type = 'pearson'),
          listw = queen_w, nsim = 999,
          zero.policy = TRUE)
```

8.5.2 Exercice 2

8.5.3 Exercice 3

8.6 Exercices du chapitre 6

8.6.1 Exercice 1

8.6.2 Exercice 2

8.6.3 Exercice 3

8.7 Exercices du chapitre 7

8.7.1 Exercice 1

8.7.2 Exercice 2

8.7.3 Exercice 3

Bibliographie

- Anselin, Luc. 1988. *Spatial econometrics: methods and models*. Kluwer Academic Publishers.
- . 2010. « Thirty years of spatial econometrics. » *Papers in regional science* 89 (1): 3-26. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2010.00279.x>.
- Anselin, Luc et AK Bera. 1998. « Spatial dependence in linear regression models with an introduction to spatial econometrics, A. Ullah and DEA Giles (eds.), Handbook of Applied Economics Statistics. » In *Spatial Dependence in linear Regression Models with an Introduction to Spatial Econometrics*, sous la dir. de Aman Ullah, 237-289. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781482269901-36>.
- Anselin, Luc, Anil K Bera, Raymond Florax et Mann J Yoon. 1996. « Simple diagnostic tests for spatial dependence. » *Regional science and urban economics* 26 (1): 77-104. [https://doi.org/10.1016/0166-0462\(95\)02111-6](https://doi.org/10.1016/0166-0462(95)02111-6).
- Anselin, Luc et Raymond JGM Florax. 1995. *New directions in spatial econometrics*. Springer.
- Anselin, Luc, Raymond Florax et Sergio J Rey. 2013. *Advances in spatial econometrics: methodology, tools and applications*. Springer Science.
- Anselin, Luc et Sergio J Rey. 2014. *Modern spatial econometrics in practice: A guide to GeoDa, GeoDaSpace and PySAL*. GeoDa Press LLC.
- Apparicio, Philippe et Jérémy Gelb. 2022. *Méthodes quantitatives en sciences sociales : un grand bol d'R*. FabriqueREL, Licence CC BY-SA. <https://serieboldr.github.io/MethodesQuantitatives/>.
- . 2024. *Méthodes d'analyse spatiales : un grand bol d'R*. FabriqueREL, Licence CC BY-SA. <https://serieboldr.github.io/MethodesAnalyseSpatiale/>.
- Apparicio, Philippe, Jérémy Gelb, Anne-Sophie Dubé, Simon Kingham, Lise Gauvin et Éric Robitaille. 2017. « The approaches to measuring the potential spatial access to urban health services revisited: distance types and aggregation-error issues. » *International journal of health geographics* 16 (1): 32. <https://doi.org/10.1186/s12942-017-0105-9>.
- Apparicio, Philippe, Anne-Marie Séguin et Xavier Leloup. 2007. « Modélisation spatiale de la pauvreté à Montréal: apport méthodologique de la régression géographiquement pondérée. » *The Canadian Geographer/Le Géographe canadien* 51 (4): 412-427. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.2007.00189.x>.
- Binbin Lu, Paul Harris, Martin Charlton et Christopher Brunsdon. 2014. « The GWmodel R package: further topics for exploring spatial heterogeneity using geographically weighted models. » *Geo-spatial Information Science* 17 (2): 85-101. [10.1080/10095020.2014.917453](https://doi.org/10.1080/10095020.2014.917453).
- Bivand, Roger, Giovanni Millo et Gianfranco Piras. 2021. « A review of software for spatial econometrics in R. » *Mathematics* 9 (11): 1276. <https://doi.org/10.3390/math911276>.
- Bivand, Roger, Edzer J Pebesma, Virgilio Gómez-Rubio et Edzer Jan Pebesma. 2008. *Applied spatial data analysis with R*. Vol. 747248717. Springer.
- Bivand, Roger et Danlin Yu. 2023. *spgwr: Geographically Weighted Regression*. s.n. <https://CRAN.R-project.org/package=spgwr>.
- Brunsdon, Chris, A Stewart Fotheringham et Martin Charlton. 1998. « Spatial nonstationarity and autoregressive models. » *Environment and Planning A* 30 (6). SAGE Publications Sage UK: London, England: 957-973.
- Brunsdon, Chris, A Stewart Fotheringham et Martin E Charlton. 1996. « Geographically weighted regression: a method for exploring spatial nonstationarity. » *Geographical analysis* 28 (4). Wiley Online Library: 281-298.
- Calvo, Ernesto et Marcelo Escolar. 2003. « The local voter: A geographically weighted approach to ecological inference. » *American Journal of Political Science* 47 (1): 189-204. <https://doi.org/10.1111/1540-5907.00013>.

- Chi, Guangqing et Jun Zhu. 2019. *Spatial regression models for the social sciences*. SAGE publications.
- Dubé, Jean, Julie Le Gallo, François Des Rosiers, Diège Legros et Marie-Pier Champagne. 2024. « An integrated causal framework to evaluate uplift value with an example on change in public transport supply. » *Transportation research part E: logistics and transportation review* 185. Elsevier: 103500.
- Dubé, Jean et Diège Legros. 2014. *Econométrie spatiale appliquée des microdonnées*. ISTE Group.
- Dubé, Jean, Diège Legros, Marius Thériault et François Des Rosiers. 2017. « Measuring and interpreting urban externalities in real-estate data: A spatio-temporal difference-in-differences (stdid) estimator. » *Buildings* 7 (2): 51. <https://doi.org/10.3390/buildings7020051>.
- Elhorst, JP. 2014. *Spatial econometrics: from cross-sectional data to spatial panels*. springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-40340-8>.
- Fotheringham, A Stewart, Chris Brunsdon et Martin Charlton. 2003. *Geographically weighted regression: the analysis of spatially varying relationships*. John Wiley & Sons.
- Fotheringham, A Stewart, Martin Charlton et Chris Brunsdon. 1996. « The geography of parameter space: an investigation of spatial non-stationarity. » *International journal of geographical information systems* 10 (5). Taylor & Francis: 605-627.
- Fotheringham, A Stewart, Wenbai Yang et Wei Kang. 2017. « Multiscale geographically weighted regression (MGWR). » *Annals of the American Association of Geographers* 107 (6). Taylor & Francis: 1247-1265. <https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1352480>.
- Geary, Robert C. 1954. « The contiguity ratio and statistical mapping. » *The incorporated statistician* 5 (3): 115-146. <https://doi.org/10.2307/2986645>.
- Gelb, Jérémy et Philippe Apparicio. 2022. « Cyclists' exposure to air and noise pollution, comparative approach in seven cities. » *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives* 14. Elsevier: 100619.
- Geniaux, Ghislain et Davide Martinetti. 2018. « A new method for dealing simultaneously with spatial autocorrelation and spatial heterogeneity in regression models. » *Regional Science and Urban Economics* 72: 74-85. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2017.04.001>.
- Greenacre, Michael, Marina Martinez-Alvaro et Agustin Blasco. 2021. « Compositional data analysis of microbiome and any-omics datasets: a validation of the additive logratio transformation. » *Frontiers in microbiology* 12. Frontiers Media SA: 727398.
- Griffith, Daniel A. 2003. *Spatial filtering*. Springer.
- Griffith, Daniel A. 1988. *Advanced Spatial Statistics: Special Topics in the Exploration of Quantitative Spatial Data Series*. Kluwer Academic Publishers.
- Griffith, Daniel A., Yongwan Chun et Bin Li. 2019. *Spatial regression analysis using eigenvector spatial filtering*. Academic Press.
- Griffith, Daniel A et Pedro R Peres-Neto. 2006. « Spatial modeling in ecology: the flexibility of eigenfunction spatial analyses. » *Ecology* 87 (10): 2603-2613. [https://doi.org/10.1890/0012-9658\(2006\)87%5B2603:SMIETF%5D2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/0012-9658(2006)87%5B2603:SMIETF%5D2.0.CO;2).
- Helbich, Marco et Daniel A Griffith. 2016. « Spatially varying coefficient models in real estate: Eigenvector spatial filtering and alternative approaches. » *Computers, Environment and Urban Systems* 57. Elsevier: 1-11.
- Isabella Gollini, Binbin Lu, Martin Charlton, Christopher Brunsdon et Paul Harris. 2015. « GWmodel: An R Package for Exploring Spatial Heterogeneity Using Geographically Weighted Models. » *Journal of Statistical Software* 63 (17): 1-50. [10.18637/jss.v063.i17](https://doi.org/10.18637/jss.v063.i17).
- Kelejian, Harry H et Ingmar R Prucha. 1998. « A generalized spatial two-stage least squares procedure for estimating a spatial autoregressive model with autoregressive disturbances. » *The journal of real estate finance and economics* 17. Springer: 99-121. <https://doi.org/10.1023/A:1007707430416>.
- Kim, Chong Won, Tim T Phipps et Luc Anselin. 2003. « Measuring the benefits of air quality improvement: a spatial hedonic approach. » *Journal of environmental economics and management* 45 (1): 24-39. [https://doi.org/10.1016/S0095-0696\(02\)00013-X](https://doi.org/10.1016/S0095-0696(02)00013-X).
- Le Gallo, Julie. 2002. « Econométrie spatiale : l'autocorrélation spatiale dans les modèles de régression linéaire. » *Eco-*

- nomie prevision 155 (4): 139-157.
- LeSage, James P et R. Kelly Pace. 2009. *An introduction to spatial econometrics*. 123. CRC Press.
- Lu, Binbin, Martin Charlton et A Stewart Fotheringham. 2011. « Geographically weighted regression using a non-Euclidean distance metric with a study on London house price data. » *Procedia Environmental Sciences* 7: 92-97. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2011.07.017>.
- Mantel, Nathan. 1967. « The detection of disease clustering and a generalized regression approach. » *Cancer research* 27 (2_Part_1): 209-220.
- Mennis, Jeremy L et Lisa Jordan. 2005. « The distribution of environmental equity: Exploring spatial nonstationarity in multivariate models of air toxic releases. » *Annals of the Association of American Geographers* 95 (2): 249-268. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2005.00459.x>.
- Moran, Patrick. 1948. « The interpretation of statistical maps. » *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)* 10 (2): 243-251. <https://www.jstor.org/stable/2983777>.
- . 1950. « A test for the serial independence of residuals. » *Biometrika* 37 (1/2): 178-181. <https://doi.org/10.2307/2332162>.
- Murakami, Daisuke et Daniel A Griffith. 2015. « Random effects specifications in eigenvector spatial filtering: a simulation study. » *Journal of Geographical Systems* 17. Springer: 311-331.
- Pace, R Kelley et James P LeSage. 2008. « A spatial Hausman test. » *Economics Letters* 101 (3): 282-284. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2008.09.003>.
- Paelinck, Jean. 1978. « Spatial econometrics. » *Economics Letters* 1 (1): 59-63. [https://doi.org/10.1016/0165-1765\(78\)90097-6](https://doi.org/10.1016/0165-1765(78)90097-6).
- Seya, Hajime, Daisuke Murakami, Morito Tsutsumi et Yoshiki Yamagata. 2015. « Application of LASSO to the eigenvector selection problem in eigenvector-based spatial filtering. » *Geographical analysis* 47 (3). Wiley Online Library: 284-299.
- Steinmetz, Seiji SC. 2010. « Spatial multipliers in hedonic analysis: a comment on “spatial hedonic models of airport noise, proximity, and housing prices”. » *Journal of Regional Science* 50 (5): 995-998. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2010.00679.x>.
- Tobler, Waldo R. 1970. « A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. » *Economic geography* 46 (sup1): 234-240. <https://doi.org/10.2307/143141>.
- Tsagris, Michail et Giorgos Athineou. 2025. *Compositional: Compositional Data Analysis*. s.n. doi:10.32614/CRAN.package.Compositional. <https://CRAN.R-project.org/package=Compositional>.
- Van den Boogaart, K Gerald et Raimon Tolosana-Delgado. 2013. *Analyzing compositional data with R*. Vol. 122. Springer.
- van den Boogaart, K. Gerald, Raimon Tolosana-Delgado et Matevz Bren. 2024. *compositions: Compositional Data Analysis*. s.n. doi:10.32614/CRAN.package.compositions. <https://CRAN.R-project.org/package=compositions>.
- Wheeler, David et Michael Tiefelsdorf. 2005. « Multicollinearity and correlation among local regression coefficients in geographically weighted regression. » *Journal of Geographical Systems* 7 (2): 161-187. <https://doi.org/10.1007/s10109-005-0155-6>.
- Wood, Simon N. 2017. *Generalized additive models: an introduction with R*. chapman; hall/CRC.