

1. Calcule os limites

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - n^2}{1 + n + n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n^2}{n^2} = -1.$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} n - \sqrt{n + n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n - \sqrt{n + n^2})(n + \sqrt{n + n^2})}{n + \sqrt{n + n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - (n + n^2)}{n + \sqrt{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n}{2n} = -\frac{1}{2}.$$

2. Estude a natureza das séries.

$$a) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 + n + n^2}{\sqrt{n^7 + n^5 + 1}}$$

Esta é uma série de termos positivos.

Como a diferença de graus (baixo – cima) é $7/2 - 2 = 3/2$, vou comparar com a série de Dirichlet $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1 + n + n^2}{\sqrt{n^7 + n^5 + 1}}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{3/2} n^2}{\sqrt{n^7}} = 1 > 0 \text{ e finito.}$$

Assim por comparação as séries $\sum \frac{1+n+n^2}{\sqrt{n^7+n^5+1}}$ e $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ têm a mesma natureza. Como a segunda é uma série de Dirichlet com $\alpha = 3/2$, logo convergente, a série em causa também é **convergente**.

$$b) \sum_{n=1}^{+\infty} n e^{-2n}$$

Esta é uma série de termos positivos. Vou utilizar o critério D'Alembert.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)e^{-2(n+1)}}{n e^{-2n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)e^{-2n} e^{-1}}{n e^{-2n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)e^{-1}}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n e^{-1}}{n} = \frac{1}{e} < 1$$

Como o limite é menor que um, pelo critério D'Alembert, a série **converge**.

3. Calcule a soma da série.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-2n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(e^2)^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{-1}{e^2}\right)^n$$

\therefore É uma série geométrica de razão $\frac{-1}{e^2}$. Como a razão verifica $-1 < \frac{-1}{e^2} < 1$, a série é **CONVERGENTE**.

$$\text{A soma é } S = \frac{1^{\text{º termo}}}{1 - \text{razão}} = \frac{(-1)^0 e^{-2.0}}{1 - \frac{-1}{e^2}} = \frac{1}{\frac{e^2 + 1}{e^2}} = \frac{e^2}{e^2 + 1}.$$

4. Indique o domínio da função $f(x) = \frac{x+1}{x^3-x}$

$$D = \{x \in \mathbb{R} : x^3 - x \neq 0\}$$

$$x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1)$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^3-x} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x(x-1)} = \frac{1}{2}.$$

5. Estudar a continuidade no ponto $x = 0$ da função

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi x)}{x}, & x < 0 \\ \frac{x + \pi}{x + 1}, & x \geq 0 \end{cases}$$

A função será contínua se os limites laterais forem iguais.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(\pi x)}{x} = \pi \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \pi \times 1 = \pi;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + \pi}{x + 1} = \pi.$$

Assim a função é contínua em $x = 0$.