

2 SUCESSÕES

2.1. Indique quais são majoradas, minoradas e limitadas, de entre as sucessões cujos termos de ordem n são:

$$a) \frac{1}{\sqrt{n}+1}; \quad b) (-1)^n n^3; \quad c) \frac{2+2(-1)^n}{2n}; \quad d) n^{(-1)^n}; \quad e) \frac{(-1)^n n}{3n+1}.$$

2.2. Prove, usando a definição, que:

$$\begin{array}{lll} a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-3}{n} = 0; & b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1; & c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0; \\ d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+10}{2n-1} = \frac{1}{2}; & e) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2+(-1)^n}{n} = 0; & f) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n\alpha)}{n} = 0; \\ g) \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty; & h) \lim_{n \rightarrow +\infty} (5-2n) = -\infty; & i) \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n n = \infty. \end{array}$$

2.3. Prove que toda a sucessão convergente é limitada.

2.4. Prove que se $(x_n)_n$ converge para a e $(y_n)_n$ converge para b , então:

$$\begin{array}{l} a) x_n + y_n \rightarrow a + b, \text{ quando } n \rightarrow +\infty; \\ b) x_n y_n \rightarrow ab, \text{ quando } n \rightarrow +\infty; \\ c) \frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{a}{b}, \text{ quando } n \rightarrow +\infty, \text{ se } b \neq 0 \text{ e } y_n \text{ não se anula.} \end{array}$$

2.5. Prove que :

- Se $(x_n)_n$ tende para $+\infty$, $(-\infty)$ e (y_n) é limitada, então $(x_n + y_n)_n$ tende para $+\infty$, $(-\infty)$, respectivamente);
- Se $(x_n)_n$ e $(y_n)_n$ tendem ambas para $+\infty$ ($-\infty$), então $(x_n + y_n)_n$ tende para $+\infty$ ($-\infty$ respectivamente);

c) Se $(x_n)_n$ tende para ∞ , então $\left(\frac{1}{x_n}\right)_n$, que está definida para n suficientemente elevado, tende para 0;

d) Se $(x_n)_n$ tende para 0 e $x_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$, então $\left(\frac{1}{x_n}\right)_n$ tende para ∞ .

2.6. Estude o comportamento, quando $n \rightarrow +\infty$, das seguintes sucessões:

$$a) x_n = \frac{3 - 5n^3 + 2n}{7n^3 - 1};$$

$$b) x_n = \frac{3n^4 - 5n^2 - 7}{n^3 + n^2 - 1};$$

$$c) x_n = \frac{2n - 5n^2}{7 - 2n^3};$$

$$d) x_n = 10 + \frac{(-1)^n}{n};$$

$$e) x_n = \frac{10}{n} + (-1)^n;$$

$$f) x_n = 10 + (-1)^n n;$$

$$g) x_n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n}};$$

$$h) x_n = \frac{4^n + 8^n}{5^n + 1};$$

$$i) x_n = \frac{2^{n+1} + 3^n}{2^n + 3^{n+1}};$$

$$j) x_n = \cos^2 n \operatorname{sen} \frac{1}{n};$$

$$k) x_n = \sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n};$$

$$l) x_n = \sqrt{n(n+1)} - 2n;$$

$$m) x_n = \cos \frac{\pi}{n} \operatorname{sen} \frac{\pi}{n};$$

$$n) x_n = \frac{1 + 2 + 3 + \cdots + n}{n^2};$$

$$o) x_n = \left(\frac{4n-3}{4n+1}\right)^n.$$

2.7. Determine $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n, \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n}, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n}$, sendo:

$$a) x_n = \frac{1}{n^2} \text{ e } y_n = \frac{1}{n};$$

$$b) x_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \text{ e } y_n = \frac{1}{n}.$$

2.8. Considere a sucessão definida por

$$x_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+n)^2}.$$

a) Calcule os termos x_1, x_2 e x_3 ;

b) Mostre que $x_n \rightarrow 0$. (Sugestão: use o teorema das sucessões enquadradas.)

2.9. Prove que se $(x_n)_n$ tende para 0 e $|y_n| < |x_n|$ depois de alguma ordem, então também $(y_n)_n$ tende para 0.

2.10. Prove que a sucessão $(x_n)_n$ converge para a se e só se $(x_n - a)_n$ tende para 0.

2.11. Considere a sucessão $u_n = 1 + (-1)^n$. Verifique que a propriedade recíproca de “Toda a sucessão convergente é limitada” não é verdadeira.

2.12. Considere a sucessão de termo geral $w_n = u_n v_n$, onde $(u_n)_n$ é uma sucessão limitada e $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$. Prove que $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$.

2.13. Diga, justificando a resposta, se a sucessão de termo geral $u_n = \frac{n}{n^2 + 1} \operatorname{senn}$ é convergente.

2.14. Considerem-se as sucessões de termo geral

$$x_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^{2n} \quad \text{e} \quad y_n = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}, \quad \text{com } n \in \mathbb{N}.$$

a) Calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$;

b) Sabendo que $y_n < 3 - \frac{1}{n!}$, para todo o $n \in \mathbb{N}$, justifique que $(x_n + y_n)$ é convergente.

2.15. Utilize o teorema das sucessões enquadradas para calcular o limite das seguintes sucessões, cujo termo de ordem n é dado por:

a) $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$;

b) $y_n = \frac{n!}{n^n}$.

2.16. Prove que:

a) Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = b$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} = b$ (isto é, se uma sucessão converge para b , então a média aritmética dos seus n primeiros termos converge também para b);

b) Se $x_n > 0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = b$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} = b$ (isto é, se uma sucessão converge para b , então a média geométrica dos seus n primeiros termos converge também para b);

c) Se $x_n > 0$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = b$, então $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = b$.

2.17. Estude o comportamento, quando $n \rightarrow +\infty$, das sucessões seguintes:

$$\begin{array}{lll} a) x_n = \left(\frac{n-3}{n+1}\right)^n; & b) x_n = \left(\frac{4n-3}{4n+1}\right)^n + \left(\frac{3}{5}\right)^n; & c) x_n = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{-2n}; \\ d) x_n = \left(\frac{3n-2}{2n+5}\right)^{n-1}; & e) x_n = \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \cdots + \frac{2}{3^{n+1}}; & f) x_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k; \\ g) x_n = \sqrt[n]{\frac{n^3-1}{4n^3+2}}; & h) x_n = \sqrt[n]{(n+1)! - n!}; & i) x_n = \sqrt[n]{\ln n}. \end{array}$$

2.18. Estude a monotonia das sucessões cujo termo geral se indica a seguir.

$$\begin{array}{lll} a) x_n = \frac{1}{\sqrt{n}+1}; & b) x_n = 1 - \frac{n+1}{2n}; & c) x_n = n^{(-1)^n}; \\ d) x_n = \frac{2^n}{n!}; & e) x_n = \frac{2+2(-1)^n}{2n}; & f) x_1 = 0, \quad x_{n+1} = \frac{2x_n+1}{3}. \end{array}$$

2.19. Estude a natureza das seguintes sucessões e diga se são ou não limitadas. Calcule, caso existam, o limite superior e inferior.

$$\begin{array}{l} a) x_n = \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{\pi n}{2}\right); \\ b) x_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n} + \frac{(-1)^n n}{2n+1}; \\ c) x_n = 10 + (-1)^n n; \\ d) x_n = n^{(-1)^n}. \end{array}$$

2.20. Dê exemplos de sucessões cujo conjunto dos sublimites seja o conjunto:

$$a) \{x : x \in \mathbb{Z} \wedge x < 0\}; \quad b) \{2, 3\}.$$

2.21. Considere a seguinte sucessão definida por recorrência

$$\begin{cases} x_1 = 1, \\ x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{2}. \end{cases}$$

- a) Mostre, por indução, que $x_n \leq 2$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$.
- b) Mostre que $(x_n)_n$ é uma sucessão crescente.
- c) Mostre que $(x_n)_n$ é convergente e calcule o seu limite.

2.22. Considere a seguinte sucessão definida por recorrência

$$\begin{cases} x_1 = 1, \\ x_{n+1} = \frac{x_n}{n+1}. \end{cases}$$

- a) Encontre um minorante para o conjunto dos termos.
- b) Mostre que $(x_n)_n$ é decrescente.
- c) Mostre que $(x_n)_n$ é convergente.
- d) Calcule o limite da sucessão $(x_n)_n$

2.23. Considere a sucessão cujos termos são $\sqrt{3}, \sqrt{3 + \sqrt{3}}, \sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{3}}}, \dots$

- a) Mostre que é crescente.
- b) Mostre que é limitada superiormente.
- c) Mostre que é convergente e determine o limite.

2.24. Diga, justificando, se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas:

- a) A sucessão $(u_n)_n$, cujo termo geral é definido por:

$$u_n = \begin{cases} \frac{2n}{n+1} & \text{se } n \leq 10, \\ 3 & \text{se } n > 10, \end{cases} \quad \text{é divergente.}$$

b) A sucessão $(v_n)_n$, cujo termo geral é definido por:

$$v_n = \begin{cases} \frac{n}{n-1} & \text{se } n \text{ é par,} \\ 2 & \text{se } n \text{ é ímpar,} \end{cases} \quad \text{é divergente.}$$

c) Se $(x_n)_n$ é uma sucessão decrescente de termos positivos, então $(x_n)_n$ é convergente.

d) Uma sucessão decrescente de termos positivos tende para zero.