[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법
[일반원칙] 당뇨병용제	인슐린 비의존성 당뇨병(제2형 당뇨병) 환자에게 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 허가사항 범위이지만 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담함. ※ 단, 개별고시가 있는 당뇨병용제는 개별고시를 따른다 - 아 래 - 가. 경구용 당뇨병치료제 1) 단독요법 다음의 하나에 해당하는 경우 Metformin 단독투여를 인정하고, Metformin 투여 금기 환자 또는 부작용으로 Metformin을 투여할 수 없는 경우에는 Sulfonylurea계 약제의 단독 투여를 인정하며, 이 경우 투여소견을 첨부하여야 함. - 다 음 - 가) 헤모글로빈A1C(HbA1C) ≥6.5% 나) 공복혈장혈당 ≥ 126mg/dl 다) 당뇨의 전형적인 증상과 임의혈장혈당 ≥ 200mg/dl 라) 75g 경구당부하검사 후 2시간 혈장혈당 ≥ 200mg/dl 2) 병용요법 가) 2제요법 (1) 단독요법으로 2-4개월 이상 투약해도 다음의 하나에 해당하는 경우 다른 기전의 당뇨병 치료제 1종을 추가한 병용요법을 인정함. - 다 음 - (가) HbA1C ≥7.0% (나) 공복혈당 ≥130mg/dl (다) 식후혈당 ≥180mg/dl (2) HbA1C ≥7.5% 경우에는 Metformin을 포함한 2제 요법을 처음부터 인정함. ○ Metformin 투여 금기 환자 또는 부작용으로 Metformin

구 분	세부인정기준 및 방법

을 투여할 수 없는 경우에는 Sulfonylurea계 약제를 포함한 2제 요법을 처음부터 인정하며, 이 경우 투여소견을 첨부하여야 함.

(3) 인정 가능 2제 요법

구 분		Metformin	Sulfonylurea	Meglitinide	α-glucosidase inhibitor	Thiazoli-dinedione	DPP-IV inhibitor	SGLT-2 inhibitor				
								dapagliflozin	ipragliflozin	empagliflozin	ertugliflozin	enavogliflozin
Metformin			인정	인정	인정	인정	인정	인정	인정	인정	인정	인정
Sulfonylurea		인정			인정	인정	인정	인정	인정	인정	인정	
Meglitinide		인정			인정	인정						
α-glucosidase inhibitor		인정	인정	인정								
Thiazoli-dinedione		인정	인정	인정			인정					
DPP-IV inhibitor		인정	인정			인정						
SGLT-2 inhibitor	dapagliflozin	인정	인정									
	ipragliflozin	인정	인정									
	empagliflozin	인정	인정									
	ertugliflozin	인정	인정									
	enavogliflozin	인정										

(4) 2제요법 투여대상으로 2제요법 인정 가능 성분 중 1종만 투여한 경우도 인정함.

나) 3제요법

○ 2제 요법을 2-4개월 이상 투여해도 HbA1C가 7% 이상인 경우에는 다른 기전의 당뇨병 치료제 1종을 추가한 병용요법을 인정함. 단, 2제 요법에서 인정되지 않는 약제의 조합이 포함되어서는 아니되나, 다음의 3제요법은 인정함.

구 분	세부인정기준 및 방법
	- 다 음 - (1) metformin + SGLT-2 inhibitor + DPP-Ⅳ inhibitor (2) metformin + SGLT-2 inhibitor(ertugliflozin, enavogliflozin 제외) + Thiazolidinedione 나. Insulin 요법 1) 단독요법 가) 초기 HbA1C가 9% 이상인 경우, 성인의 지연형 자가면역당뇨병(LADA), 제1형 당뇨병과 감별이 어려운 경우, 고혈당과 관련된 급성합병증, 신장・간손상, 심근경색증, 뇌졸중, 급성질환 발병 시, 수술 및 임신한 경우 등에는 Insulin 주사제 투여를 인정함. 나) 경구용 당뇨병 치료제 병용투여에도 HbA1C가 7% 이상인 경우 Insulin요법을 인정함. 2) 경구제와 병용요법 Insulin 단독요법 또는 경구용 당뇨병치료제 투여에도 HbA1C가 7% 이상인 경우 Insulin과 경구용 당뇨병치료제의 병용요법을 인정함. 가) Insulin과 경구용 당뇨병치료제 2종까지 병용요법을 인정함. 단, 경구용 당뇨병 치료제 2제 요법에서 인정되지 않는 약제의 조합이 포함되어서는 아니 됨. 나) Enavogliflozin은 Insulin 주사제와 병용 시 인정하지 아니함. 다. GLP-1수용체작용제 1) 경구제와 병용요법 가) 투여대상 Metformin+ Sulfonylurea계 약제 병용투여로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 환자 중 (1) 체질량지수(BMI: Body mass index)≥25kg/㎡ 또는 (2) Insulin 요법을 할 수 없는 환자 나) 투여방법 (1) 3종 병용요법(Metformin + Sulfonylurea+ GLP-1수용체작용제)을 인정

구 분	세부인정기준 및 방법
	(2) 3종 병용요법으로 현저한 혈당개선이 이루어진 경우 2종 병용요법(Metformin+GLP-1 수용체작용제)을 인정 2) Insulin과 병용요법(단일제) 가) 투여대상 (1) 기저 Insulin(Insulin 단독 또는 Metformin 병용) 투여에도 HbA1C가 7% 이상인 경우 (2) GLP-1수용체작용제 (단일제)와 Metformin (+Sulfonylurea) 투여에도 HbA1c가 7% 이상인 경우 나) 투여방법 기저 Insulin+GLP-1수용체작용제(+Metformin)을 인정 3) Insulin과 병용요법(복합제) 가) 투여대상 (1) 기저 Insulin(Insulin 단독 또는 Metformin 병용) 투여에도 HbA1C가 7% 이상인 경우 (다만, Insulin degludec +Liraglutide의 경우에는 기저 Insulin과 Metformin 병용 시만 인정) (2) GLP-1수용체작용제 (단일제)와 Metformin (+Sulfonylurea) 투여에도 HbA1c가 7% 이상인 경우 나) 투여방법 (1) Insulin glargine + Lixisenatide: 단독 또는 Metformin 병용 시 인정 (단, 투여대상(2)는 Metformin과 병용 시 인정) (2) Insulin degludec + Liraglutide: Metformin과 병용 시 인정 라. 각 단계에서 명시한 기간에 해당하지 않더라도 신속한 변경을 요하는 경우에는 투여소견 첨부 시 사례별로 인정함. 마. 복합제는 복합된 성분수의 약제를 투여한 것으로 인정함. 바. 급여 인정용량 각 약제별 용법·용량 범위 내에서 급여하며, 다음의 인정용량을 초과한 경우에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.

구 분	세부인정기준 및 방법

- 다 음 -

1) Repaglinide 경구제(복합제 포함): 1일 최대 6mg
2) Pioglitazone 경구제(복합제 포함): 1일 최대 30mg
3) Metformin 성분이 포함된 복합제에 Metformin 단일제 추가 투여 시(복합제 용량 포함)
   가) 일반형: 1일 최대 2,550mg
   나) 서방형: 1일 최대 2,000mg
   다) 일반형과 서방형 병용: 1일 최대 2,550mg까지 인정하나, 서방형을 2,000mg까지 투여 시에는 추가투여 할 수 없음
4) Glimepiride 성분이 포함된 복합제에 Glimepiride 단일제 추가투여 시: 복합제 내 함량을 포함하여 1일 최대 8mg

※ 대상약제

[경구제 중 단일제]

성분군	성분명
Biguanide계	Metformin HCl
Sulfonylurea계	Glibenclamide, Gliclazide, Glimepiride, Glipizide
Meglitinide계	Mitiglinide calcium hydrate, Nateglinide, Repaglinide
α-glucosidase inhibitor계	Acarbose, Miglitol, Voglibose
Thiazolidinedione계	Lobeglitazone sulfate, Pioglitazone HCl
DPP-IV inhibitor계	Alogliptin, Anagliptin, Evogliptin, Gemigliptin, Linagliptin, Linagliptin besylate, Saxagliptin, Sitagliptin phosphate, Sitagliptin HCl, Teneligliptin HBr, Teneligliptin HCl, Teneligliptin ditosylate, Vildagliptin, Vildagliptin HCl, Vildagliptin nitrate

구 분	세부인정기준 및 방법

SGLT-2 inhibitor계	Dapagliflozin, Empagliflozin, Ertugliflozin, Ipragliflozin, Enavogliflozin

[경구제 중 2제 복합제]

성분군	성분명
Sulfonylurea계 + Biguanide계	Glibenclamide+ Metformin HCl, Gliclazide+ Metformin HCl, Glimepiride+ Metformin HCl
Meglitinide계 + Biguanide계	Mitiglinide calcium hydrate+ Metformin HCl, Nateglinide+ Metformin HCl, Repaglinide+ Metformin HCl
α-glucosidase inhibitor계 + Biguanide계	Voglibose+ Metformin HCl
Thiazolidinedione계 + Biguanide계	Lobeglitazone sulfate + Metformin HCl, Pioglitazone HCl + Metformin HCl
Thiazolidinedione계 + Sulfonylurea계	Pioglitazone HCl+ Glimepiride, Rosiglitazone maleate+ Glimepiride
Thiazolidinedione계+ DPP-Ⅳ inhibitor계	Pioglitazone HCl+ Alogliptin, Lobeglitazone sulfate+ Sitagliptin phosphate, Pioglitazone HCl + Sitagliptin phosphate

구 분	세부인정기준 및 방법	
	DPP-Ⅳ inhibitor계 + Biguanide계	Alogliptin+ Metformin HCl, Anagliptin+ Metformin HCl, Evogliptin+ Metformin HCl, Gemigliptin+ Metformin HCl, Linagliptin+ Metformin HCl, Linagliptin besylate + Metformin HCl, Saxagliptin+ Metformin HCl, Sitagliptin phosphate + Metformin HCl, Sitagliptin HCl+ Metformin HCl, Teneligliptin HBr+ Metformin HCl, Teneligliptin HCl+ Metformin HCl, Teneligliptin ditosylate + Metformin HCl, Vildagliptin+ Metformin HCl, Vildagliptin HCl+ Metformin HCl, Vildagliptin nitrate+ Metformin HCl
	SGLT-2 inhibitor계 + Biguanide계	Dapagliflozin+ Metformin HCl, Empagliflozin+ Metformin HCl, Enavogliflozin+ Metformin HCl
	SGLT-2 inhibitor계+ Sulfonylurea계	Dapagliflozin+ Glimepiride
	SGLT-2 inhibitor계+ DPP-Ⅳ inhibitor계 (단, Metformin HCl 병용시에만 요양급여인정)	Dapagliflozin+ Gemigliptin, Dapagliflozin+ Sitagliptin phosphate, Dapagliflozin+ Sitagliptin HCl, Dapagliflozin+ Saxagliptin, Dapagliflozin+ Evogliptin, Dapagliflozin+ Linagliptin, Empagliflozin+ Linagliptin, Empagliflozin+ Sitagliptin phosphate, Ertugliflozin+ Sitagliptin phosphate
	SGLT-2 inhibitor계+ Thiazolidinedione계 (단, Metformin HCl 병용시에만 요양급여인정)	Dapagliflozin+ Pioglitazone HCl

<table>
<tr><th>구 분</th><th>세부인정기준 및 방법</th></tr>
<tr><td></td><td>
[경구제 중 3제 복합제]
<table>
<tr><th>성분군</th><th>성분명</th></tr>
<tr><td>Thiazolidinedione계+ DPP-IV inhibitor계 + Biguanide계</td><td>Lobeglitazone sulfate+ Sitagliptin phosphate+ Metformin HCl</td></tr>
<tr><td>SGLT-2 inhibitor계 + DPP-IV inhibitor계 + Biguanide계</td><td>Dapagliflozin+ Sitagliptin phosphate+ Metformin HCl
Dapagliflozin + Sitagliptin HCl + Metformin HCl
Evogliptin+ Dapagliflozin+ Metformin HCl
Empagliflozin+ Sitagliptin phosphate+ Metformin HCl
Empagliflozin+ Linagliptin+ Metformin HCl</td></tr>
</table>
[주사제]
· Insulin 주사제
· GLP-1수용체작용제(단일제): Dulaglutide, Exenatide, Semaglutide
· Insulin + GLP-1수용체작용제(복합제): Insulin glargine + Lixisenatide, Insulin degludec + Liraglutide
</td></tr>
</table>