

Introductory Statistics

Sungchan Yi

January 2019

Contents

| | | |
|---|-----------|----|
| 1 | 자료의 생성 | 2 |
| 2 | 대표값과 산포도 | 5 |
| 3 | 순열과 조합 | 8 |
| 4 | 확률의 뜻과 활용 | 11 |
| 5 | 조건부확률 | 14 |
| 6 | 이산확률변수 | 19 |
| 7 | 이항분포 | 23 |

1 자료의 생성

통계학(statistics)이란, 주어진 문제에 대하여 합리적인 답을 줄 수 있도록 숫자로 표시되는 정보를 수집하고 정리하며, 이를 해석하고 **신뢰성 있는 결론**을 이끌어 내는 방법을 연구하는 과학의 한 분야이다.

그러면 두 가지 질문이 생긴다.

1. **수집**: 어떻게 수집해야 전체를 잘 대표할 수 있는가?
2. **신뢰성 있는 결론**: 어떻게 신뢰성을 측정하여 결론을 내릴 것인가?

정의 1.1.

- **추출단위**(sampling unit): 전체를 구성하는 각 개체
- **특성값**(characteristic): 각 추출단위의 특성을 나타내는 값
- **모집단**(population): 관심의 대상이 되는 모든 추출단위의 특성값을 모아 놓은 것
추출단위의 개수가 유한하면 **유한모집단**, 무한하면 **무한모집단**이라 한다.
- **표본**(sample): 실제로 관측한 추출단위의 특성값의 모임

정의 1.2. (자료의 종류)

1. **범주형 자료**(categorical data), **질적 자료**(qualitative data)는 관측 결과가 몇 개의 범주 또는 항목의 형태로 나타나는 자료이다.
 - **명목자료**(nominal data): 순위의 개념이 없다. 예) 혈액형, 성별
 - **순서자료**(ordinal data): 순위의 개념을 갖는다. 예) A ~ F 학점, 9등급제
2. **수치형 자료**(numerical data), **양적 자료**(quantitative data)는 자료 자체가 숫자로 표현되며 숫자 자체가 자료의 속성을 반영한다.
 - **이산형 자료**(discrete data) 예) 교통사고 건수
 - **연속형 자료**(continuous data) 예) 키, 몸무게

정의 1.3. (통계학의 분류)

- **기술통계학**(descriptive statistics)은 표나 그림 또는 대표값 등을 통하여 수집된 자료의 특성을 쉽게 파악할 수 있도록 자료를 정리·요약 하는 방법을 다루는 분야이다.
- **추측통계학**(inferential statistics)은 표본에 내포된 정보를 분석하여 모집단의 여러가지 특성에 대하여 과학적으로 추론하는 방법을 다루는 분야이다.

정의 1.4. N 개의 추출단위로 구성된 유한모집단에서 n 개의 추출단위를 비복원추출할 때, ${}_NC_n$ 개의 모든 가능한 표본들이 동일한 확률로 추출되는 방법을 **단순랜덤추출법**(simple random sampling)이라 하고, 이 방법을 위해서는 난수표(random number table)나 난수생성기(random number generator) 등을 이용한다. 그리고 단순랜덤추출로 얻은 표본을 **단순랜덤표본**(simple random sample)이라 한다.

정의 1.5. (통계적 실험)

- 실험이 행해지는 개체를 **실험단위**(experimental unit/subject)라 하고, 각각의 실험단위에 특정한 실험환경 또는 실험조건을 가하는 것을 **처리**(treatment)라 한다.
- 처리를 받는 집단을 **처리집단**(treatment group), 처리를 받지 않은 집단을 **대조집단**(control group)이라 한다.
- 실험환경이나 실험조건을 나타내는 변수를 **인자**(factor)라 하고, 인자가 취하는 값을 그 인자의 **수준**(level)이라 한다.
- 인자에 대한 반응을 나타내는 변수를 **반응변수**(response variable)라 한다.
- 실험단위가 처리집단이나 대조집단에 들어갈 기회를 동등하게 부여하는 방법을 **랜덤화**(randomization)라 한다.
- 랜덤화에 의해 모든 실험단위를 각 처리에 배정하는 실험계획을 **완전 랜덤화 계획**(completely randomized design)이라 한다.
- 실험 이전에 동일 처리에 대한 반응이 유사할 것으로 예상되는 실험단위들끼리 모은 것을 **블록**(block)이라 하고, 랜덤화에 의해 모든 블록을 각 처리에 배정하는 실험계획을 **블록화**(randomized block design)라 한다.

정의 1.6. (통계적 실험계획의 원칙)

1. **대조(control)**: 관심 인자 이외의 다른 외부 인자의 효과를 극소화하고, 처리에 대한 대조집단을 통해 비교 실험을 한다.
2. **랜덤화(randomization)**: 완전랜덤화계획
3. **반복 시행(replication)**: 처리효과의 탐지를 용이하게 하기 위해 반복 시행한다.

2 대표값과 산포도

주어진 자료의 변량 x_1, \dots, x_n 에 대하여

정의 2.1. (산술)평균(mean μ)은 변량의 총합을 변량의 개수로 나눈 값이다.

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

정의 2.2. 변량 x_i 의 편차는 $x_i - \mu$ 로 정의한다. [편차의 제곱]의 평균을 분산(variance σ^2)으로, 분산의 양의 제곱근을 표준편차(standard deviation σ)로 정의한다.

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

정리 2.3. $\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \mu^2$ (분산은 [변량²의 평균] - [평균의 제곱])

정의 2.4. 모집단의 평균을 모평균(population mean), 모집단의 분산을 모분산(population variance), 모집단의 표준편차를 모표준편차(population standard deviation)라고 한다.

정의 2.5. 특성값을 작은 것부터 순서대로 나열했을 때 $p\%$ 의 특성값이 그 값보다 작거나 같고, $(100-p)\%$ 의 특성값이 그 값보다 크거나 같게 되는 값을 제 p 백분위수(p -th percentile)라 한다.

정의 2.6. (사분위수 - quartile)

- 제 1 사분위수(first quartile): 제 25 백분위수이며, Q_1 으로 표기한다.
- 제 2 사분위수(second quartile) 또는 중앙값(median): 제 50 백분위수이며, Q_2 으로 표기한다.
- 제 3 사분위수(third quartile): 제 75 백분위수이며, Q_3 으로 표기한다.

정의 2.7. 자료의 값들 중 가장 자주 등장하는 값을 **최빈값(mode)**라고 한다. 최빈값은 유일하지 않을 수도 있다.

정의 2.8. 변량과 중앙값 사이의 거리에 대한 평균을 **평균절대편차(mean absolute deviance MAD)**라 한다.

$$MAD = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - Q_2|$$

정의 2.9. 변량 x_i 가 **최댓값(maximum)**이면 모든 j 에 대해 $x_i \geq x_j$ 이고, x_i 가 **최솟값(minimum)**이면 모든 j 에 대해 $x_i \leq x_j$ 이다. 최댓값에서 최솟값을 뺀 값을 **범위(range R)**라 한다.

정의 2.10. Q_3 에서 Q_1 을 뺀 값을 **사분위수범위(interquartile range IQR)**로 정의한다.

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

위 대표값들을 표본에 대해서도 정의할 수 있다. 모집단으로부터 표본 x_1, \dots, x_n 를 얻었다고 하고, 이를 오름차순으로 나열한 것을 $x_{(1)}, \dots, x_{(n)}$ 이라 하자.

정의 2.11.

- **표본평균(sample mean):** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- **표본분산(sample variance):** $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
- **표본표준편차(sample standard deviation):** $s = \sqrt{s^2}$

정의 2.12. 표본을 크기 순서로 나열했을 때 $p\%$ 가 그 값보다 작고, $(100-p)\%$ 가 그 값보다 크게 되는 값을 **표본의 제 p 백분위수**라 하고, 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{cases} \frac{x_{(k)} + x_{(k+1)}}{2} & \text{if } n \cdot \frac{p}{100} = k \\ x_{(k+1)} & \text{if } k < n \cdot \frac{p}{100} < k+1 \end{cases}$$

정의 2.13. 표본의 제 i 사분위수 \widehat{Q}_i 는 표본의 제 $25i$ 백분위수로 정의한다. (단, $i = 1, 2, 3$)

정의 2.14.

- 표본의 평균절대편차: $\widehat{MAD} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \widehat{Q}_2|$
- 표본의 범위: $\widehat{R} = x_{(n)} - x_{(1)}$
- 표본의 사분위수범위: $\widehat{IQR} = \widehat{Q}_3 - \widehat{Q}_1$

3 순열과 조합

정의 3.1. $0! = 1$, $n! = \prod_{i=1}^n i = n \cdot (n-1) \cdots \cdots 2 \cdot 1$ ($n \geq 1$) 로 정의하고, ! 는 **팩토리얼**(factorial) 이라 읽는다.

정의 3.2. 서로 다른 n 개의 원소에서 서로 다른 r 개를 택하여 일렬로 배열하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 **순열**(permutation)이라 하고, 기호로 ${}_nP_r$ 와 같이 나타낸다.

정리 3.3. ${}_nP_r = n(n-1) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0 \leq r \leq n$)

정의 3.4. 서로 다른 n 개의 원소에서 순서를 생각하지 않고 r 개를 택하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 **조합**(combination)이라 하고, 기호로 ${}_nC_r$ 또는 $\binom{n}{r}$ 과 같이 나타낸다.

정리 3.5. $\binom{n}{r} = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ (단, $0 \leq r \leq n$)

정리 3.6. (조합의 성질)

$$(1) \quad \binom{n}{r} = \binom{n}{n-r} \quad (\text{단, } 0 \leq r \leq n) \quad (\text{대칭성})$$

$$(2) \quad \binom{n}{r} = \binom{n-1}{r} + \binom{n-1}{r-1} \quad (\text{단, } 1 \leq r \leq n-1) \quad (\text{파스칼 법칙})$$

정의 3.7. 서로 다른 n 개의 원소에서 중복을 허락하여 r 개를 택하는 순열을 n 개에서 r 개를 택하는 **중복순열**이라 하고, 기호로 ${}_n\Pi_r$ 과 같이 나타낸다.

정의 3.8. 서로 다른 n 개의 원소에서 중복을 허락하여 r 개를 택하는 조합을 n 개에서 r 개를 택하는 **중복조합**이라 하고, 기호로 ${}_nH_r$ 과 같이 나타낸다.

정리 3.9. ${}_n\Pi_r = n^r$, ${}_nH_r = \binom{n+r-1}{r}$.

정리 3.10. $n \in \mathbb{N}$ 에 대하여,

$$(x+y)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^{n-r} y^r = \binom{n}{0} x^n y^0 + \binom{n}{1} x^{n-1} y^1 + \cdots + \binom{n}{n} x^0 y^n$$

이다. 이를 $(a+b)^n$ 에 대한 **이항정리**(binomial theorem)라 하고, $\binom{n}{r} x^{n-r} y^r$ 을 전개식의 **일반항**, 전개식의 각 항의 계수 $\binom{n}{r}$ 들을 **이항계수**라 한다.

정리 3.11. (이항계수의 성질)

$$(1) \quad (1+x)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^r = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} x + \cdots + \binom{n}{n} x^n \quad (\text{for all } x \in \mathbb{C})$$

$$(2) \quad \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$$

$$(3) \quad \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r} = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$$

$$(4) \quad \sum_{r=0}^n r \binom{n}{r} = \binom{n}{1} + 2 \cdot \binom{n}{2} + \cdots + n \cdot \binom{n}{n} = n \cdot 2^{n-1}$$

$$(5) \quad \sum_{r=0}^n r^2 \binom{n}{r} = 2^2 \cdot \binom{n}{2} + 3^2 \cdot \binom{n}{3} + \cdots + n^2 \cdot \binom{n}{n} = n(n+1) \cdot 2^{n-2}$$

$$(6) \quad \sum_{r=0}^n \frac{1}{r+1} \binom{n}{r} = \frac{1}{1} \binom{n}{0} + \frac{1}{2} \binom{n}{1} + \cdots + \frac{1}{n+1} \binom{n}{n} = \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - 1)$$

정리 3.12. $n \in \mathbb{N}$ 에 대하여,

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_m)^n = \sum_{r_1+r_2+\cdots+r_m=n} \binom{n}{r_1, r_2, \dots, r_m} x_1^{r_1} x_2^{r_2} \cdots x_m^{r_m}$$

이고, 이를 $(x_1 + x_2 + \cdots + x_m)^n$ 에 대한 **다항정리**(multinomial theorem)라 한다. 이 때 $\binom{n}{r_1, r_2, \dots, r_m}$ 를 **다항계수**라 하고, 다음과 같이 정의한다.

$$\binom{n}{r_1, r_2, \dots, r_m} = \frac{n!}{r_1! \cdot r_2! \cdot \cdots \cdot r_m!}$$

정의 3.13. 서로 다른 n 개의 원소를 원형으로 배열하는 순열을 **원순열**이라 하고, 그 경우의 수는 $(n-1)!$ 이다.

정리 3.14. (원순열의 일반공식) n 개 중에서 서로 같은 것이 p_1, p_2, \dots, p_k 개씩 있을 때, 이 $n (= p_1 + \dots + p_k)$ 개를 원형으로 배열하는 방법(원순열)의 수는 다음과 같다.

$$\frac{1}{n} \sum_{d|g} \left\{ \phi(d) \binom{\frac{n}{d}}{\frac{p_1}{n}, \frac{p_2}{n}, \dots, \frac{p_k}{n}} \right\}$$

단, $g = \gcd(p_1, \dots, p_k)$, $d > 0$ 이고 $\phi(d)$ 는 d 이하의 자연수 중에서 d 와 서로소인 자연수의 개수로 정의된다.

4 확률의 뜻과 활용

확률은 모집단에서 표본을 추출할 때, 특정 성질을 만족하는 표본이 관측될 가능성에 대한 측도로, 표본을 바탕으로 **모집단에 대한 결론을 이끌어낼 때 논리적 근거**가 된다.

정의 4.1. 같은 조건 아래에서 반복할 수 있고, 그 결과가 우연에 의하여 결정되는 실험이나 관찰을 **시행**이라고 한다. 어떤 시행에서 일어날 수 있는 모든 가능한 결과 전체의 집합을 **표본공간**(sample space S)이라 하고, 표본공간의 부분집합을 **사건**(event)이라고 한다.

정의 4.2. 표본공간의 부분집합 중에서 원소의 개수가 한 개인 집합을 **근원사건**이라 하고, 반드시 일어나는 사건은 **전사건**, 절대로 일어나지 않는 사건은 **공사건**(\emptyset)이라 한다.

정의 4.3. 두 사건 A, B 에 대하여, A 또는 B 가 일어나는 사건을 A 와 B 의 **합사건**이라 하고, $A \cup B$ 로 나타낸다. 그리고 A 와 B 가 동시에 일어나는 사건을 A 와 B 의 **곱사건**이라 하고, $A \cap B$ 로 나타낸다.

정의 4.4. 표본공간 S 의 부분집합인 두 사건 A, B 에 대하여 $A \cap B = \emptyset$ 이면 A 와 B 는 서로 **배반사건**(disjoint)이라 한다. 또, 사건 A 가 일어나지 않는 사건을 사건 A 의 **여사건**이라 하고, A^C 로 나타낸다.

정의 4.5. 표본공간 S 의 공사건이 아닌 사건 A_1, \dots, A_n 이 다음 조건을 만족하면,

$$(1) \bigcup_{i=1}^n A_i = S$$

$$(2) A_i \cap A_j = \emptyset \quad (\text{for all } 1 \leq i \neq j \leq n) \quad (\text{pairwise disjoint})$$

사건 A_1, \dots, A_n 을 S 의 **분할**(partition)이라 한다.

정의 4.6. 어떤 시행에서 사건 A 가 일어날 가능성을 수로 나타낸 것을 사건 A 가 일어날 **확률**이라 하고, 기호로 $P(A)$ 와 같이 나타낸다.

정의 4.7. (수학적 확률) 어떤 시행의 표본공간 S 가 m 개의 근원사건으로 이루어져 있고, 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같은 정도로 기대될 때, 사건 A 가 r 개의 근원사건으로 이루어져 있으면 사건 A 가 일어날 확률은 다음과 같다.

$$P(A) = \frac{(\text{사건 } A \text{가 일어나는 경우의 수})}{(\text{모든 경우의 수})} = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{r}{m}$$

정의 4.8. (통계적 확률) 같은 시행을 n 번 반복하여 사건 A 가 일어난 횟수를 r_n 이라고 하자. 이 때, 시행 횟수 n 이 한없이 커짐에 따라 그 상대도수 r_n/n 은 $P(A)$ 에 가까워진다.

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_n}{n}$$

정의 4.9. (기하학적 확률) 연속적인 변량을 크기로 갖는 표본공간의 영역 S 안에서 각각의 점을 잡을 가능성이 같은 정도로 기대될 때, 영역 S 에 포함되어 있는 영역 A 에 대하여 영역 S 에서 임의로 잡은 점이 영역 A 에 속할 확률은 다음과 같다.

$$P(A) = \frac{(\text{영역 } A \text{의 크기})}{(\text{영역 } S \text{의 크기})}$$

정의 4.10. (확률의 공리 - Axioms of Probability) 표본공간 S 와 사건 A 에 대하여,

$$(1) 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$(2) P(S) = 1$$

$$(3) \text{서로 배반인 사건열 } A_1, A_2, \dots \text{에 대해 } P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

정리 4.11. (확률의 기본 성질) 사건 A, B 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) P(\emptyset) = 0$$

$$(2) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{확률의 덧셈정리})$$

$$(3) P(A^C) = 1 - P(A) \quad (\text{여사건의 확률})$$

정리 4.12. 사건 A, B, C 에 대하여 다음이 성립한다.

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) + P(A \cap B \cap C)$$

정리 4.13. (포함 배제 원리) 사건 A_1, \dots, A_n 에 대하여 다음이 성립한다.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \left(\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) \right)$$

5 조건부확률

정의 5.1. 확률이 0이 아닌 두 사건 A, B 에 대하여 사건 A 가 일어났을 때, 사건 B 가 일어날 확률을 사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 **조건부확률**(conditional probability)이라 하고, 기호로 $P(B|A)$ 와 같이 나타낸다. 이는 다음과 같이 계산한다.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (P(A) > 0)$$

연습문제 5.2. 주사위 한 개를 던지는 시행에서 소수의 눈이 나오는 사건을 A , 홀수의 눈이 나오는 사건을 B 라 할 때, 다음을 구하여라.

(1) $P(A \cap B)$

(2) $P(B|A)$

(3) $P(A^C|B)$

정리 5.3. (확률의 곱셈정리) 공사건이 아닌 두 사건 A, B 에 대하여 다음이 성립한다.

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A) = P(A|B)P(B)$$

연습문제 5.4. 장난감 100개 중 20개가 불량품이다. 이 중 2개를 임의로 추출할 때, 2개 모두 불량품일 확률을 구하여라.

정의 5.5. 두 사건 A, B 에 대하여 사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률이 사건 B 가 일어날 확률과 같을 때, 즉

$$P(B|A) = P(B|A^C) = P(B)$$

이면, 두 사건 A, B 는 서로 **독립**(independent)이라 하고, 기호로 $A \perp B$ 와 같이 나타낸다. 두 사건이 독립이 아닐 때는 **종속**이라 한다.

연습문제 5.6. 주사위 2개를 던질 때, 다음 두 사건이 독립인지 판정하여라.

- (1) A : 두 주사위 눈의 합이 6인 사건, B : 첫 번째 주사위 눈이 4인 사건
- (2) A : 두 주사위 눈의 합이 7인 사건, B : 첫 번째 주사위 눈이 4인 사건

정리 5.7. 공사건이 아닌 두 사건 A, B 에 대하여 다음 조건은 서로 동치이다.

- (1) A, B 가 서로 독립이다.
- (2) $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

정리 5.8. 공사건이 아닌 두 사건 A, B 에 대하여 다음이 성립한다.

$$[A, B \text{가 독립}] \iff [A^C, B \text{가 독립}] \iff [A, B^C \text{가 독립}] \iff [A^C, B^C \text{가 독립}]$$

연습문제 5.9. 다음을 증명하여라.

- (1) 정리 5.8.
- (2) 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이면, 사건 A, B 는 종속이다.

연습문제 5.10. 두 사건 A, B 가 서로 독립이고 $P(A) = 0.25, P(B) = 0.4$ 일 때, 다음을 구하여라.

- (1) $P(A \cap B)$
- (2) $P(A^C \cap B)$
- (3) $P(A | B^C)$
- (4) $P(B^C | A^C)$

연습문제 5.11. 두 사건 A, B 가 서로 독립이고, $P(A \cup B) = 0.8, P(A \cap B) = 0.3$ 일 때, $P(A), P(B)$ 를 각각 구하여라. (단, $P(A) > P(B)$)

정의 5.12. 공사건이 아닌 사건 A_1, \dots, A_n 에 대하여,

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j) \quad \text{for all } 1 \leq i \neq j \leq n$$

이 성립하면 사건 A_1, \dots, A_n 이 **쌍마다 독립**(pairwise independent)이라고 한다.

정의 5.13. 공사건이 아닌 사건 A_1, \dots, A_n 가 있다. 임의의 $J \subset \{1, 2, \dots, n\}$ 에 대해

$$P\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} P(A_i)$$

이 성립하면 사건 A_1, \dots, A_n 이 **상호 독립**(mutually independent)이라고 한다.

연습문제 5.14. 사건 A, B, C 에 대하여 $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$ 이지만 A, B, C 가 상호 독립은 아닌 A, B, C 의 예시를 찾아라.

정의 5.15. 동일한 시행을 반복할 때, 각 시행에서 일어나는 사건이 서로 독립이면 이러한 시행을 **독립시행**이라고 한다.

정리 5.16. (독립시행의 확률) 1회의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률을 p 라 할 때, 이 시행을 n 회 반복하는 독립시행에서 사건 A 가 r 번 일어날 확률은 다음과 같다.

$$\binom{n}{r} p^r (1-p)^{n-r} \quad (r = 0, 1, \dots, n)$$

연습문제 5.17. 주사위를 한 번 던지는 시행에서 3의 배수의 눈이 나오는 사건을 A 라 할 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) $P(A)$ 를 구하여라.

(2) 주사위를 20번 던지는 시행에서 사건 A 가 12번 일어날 확률을 구하여라.

(3) 주사위를 100번 던지는 시행에서 사건 A 가 r 번 일어날 확률을 구하여라.

정리 5.18. (전확률공식 - Law of Total Probability) 표본공간 S 의 분할인 사건 A_1, \dots, A_n 에 대하여 다음이 성립한다.

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B | A_i) P(A_i)$$

증명. $P(B) = P\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n P(B | A_i) P(A_i)$ □

연습문제 5.19. H 대학의 통계학과 학생의 30%는 1학년이고, 25%는 2학년이고, 25%는 3학년이고, 20%는 4학년이라고 하자. 그런데 1학년의 50%, 2학년의 30%, 3학년의 10%, 4학년의 2%가 수학 과목의 수강생이라 한다. 통계학과 학생 중 한 학생을 임의로 선택할 때 그 학생이 수학 과목의 수강생일 확률을 구하여라.

정리 5.20. (베이즈 정리 - Bayes' Theorem) 사건 A_1, \dots, A_n 이 표본공간 S 의 분할이고 $P(B) > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$P(A_k | B) = \frac{P(B | A_k) P(A_k)}{\sum_{i=1}^n P(B | A_i) P(A_i)} \quad (k = 1, \dots, n)$$

증명. 조건부확률의 정의와 전확률공식으로부터 자명하다. □

연습문제 5.21. 베이즈 정리를 증명하여라.

연습문제 5.22. 주머니 A에는 흰 공 3개, 검은 공 2개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 2개, 검은 공 3개가 들어 있다. 임의로 주머니 하나를 택하여 2개의 공을 동시에 꺼냈더니 모두 흰 공이었을 때, 그것이 주머니 B에서 나왔을 확률을 구하여라.

연습문제 5.23. A 주머니에 흰 공 2개, 검은 공 5개, B 주머니에 흰 공 3개, 검은 공 4개가 들어있다. A 주머니에서 한 개의 공을 임의로 꺼내어 B 주머니에 넣은 다음 다시 B 주머니에서 하나의 공을 꺼내기로 한다. B에서 꺼낸 공이 흰 공일 때, A에서 B로 옮겨진 공이 흰 공이었을 확률을 구하여라.

연습문제 5.24. 어떤 지역의 결핵환자의 비율이 0.1%로 알려져 있다. 결핵에 걸려있는지 알아보는 검사에서 결핵에 걸렸을 때 양성 반응이 나타날 확률은 95%이고 그렇지 않을 때 양성 반응이 나타날 확률은 1.1%라고 한다. 양성 반응이 나타났을 때 결핵에 걸렸을 확률을 구하여라.

6 이산확률변수

정의 6.1. 표본공간 위에 정의된 실수값 함수를 **확률변수**(random variable)라 하고, 확률변수 X 의 값에 따라 확률이 어떻게 흩어져 있는지를 합이 1인 양수로써 나타낸 것을 X 의 **확률분포**(probability distribution)라고 한다.

정의 6.2. 확률변수 X 가 어떤 값 x 를 취할 확률은 기호로 $P(X = x)$, a 이상 b 이하의 값을 취할 확률은 기호로 $P(a \leq X \leq b)$ 와 같이 나타낸다.

정의 6.3. 유한 개이거나, 자연수와 같이 셀 수 있는 값을 취하는 확률변수를 **이산확률변수**(discrete random variable)라 한다.

연습문제 6.4. 서로 다른 3개의 동전을 던지는 시행에서 뒷면이 나오는 동전의 개수를 X 라 할 때, 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내어라.

| X | 합계 |
|------------|----|
| $P(X = x)$ | 1 |

연습문제 6.5. 검은 공 2개와 흰 공 4개가 들어 있는 주머니에서 동시에 3개의 공을 꺼낼 때 나오는 검은 공의 개수를 X 라 하자. 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내어라.

정의 6.6. 이산확률변수 X 가 취할 수 있는 값이 x_1, \dots, x_n 일 때, X 의 각 값에 $[X$ 가 이 값을 취할 확률 $p_1, \dots, p_n]$ 을 대응시키는 함수

$$P(X = x_i) = p_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

를 이산확률변수 X 의 **확률질량함수**(probability mass function)라 하며, 확률질량함수는 다음 조건을 만족해야 한다.

$$(1) \ 0 \leq P(X = x_i) \leq 1$$

$$(2) \sum_{i=1}^n P(X = x_i) = 1$$

$$(3) P(a \leq X \leq b) = \sum_{x=a}^b P(X = x)$$

연습문제 6.7. 5개의 제비 중에 3개의 당첨 제비가 있다. 임의로 뽑은 2개의 제비 중에 있는 당첨 제비의 개수를 X 라고 할 때, 확률변수 X 의 확률질량함수를 구하여라.

연습문제 6.8. 주어진 이산확률변수 X 에 대해 다음 값을 구하여라.

| | | | | | |
|------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------|
| X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| $P(X = x)$ | a | $\frac{1}{8}$ | b | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{8}$ |

$$(1) a + b$$

$$(2) P(X = 1 \cup X = 3)$$

$$(3) P(0 \leq X \leq 2)$$

정의 6.9. 이산확률변수 X 가 취하는 값이 x_1, \dots, x_n 일 때,

- **평균(mean), 기댓값(expectation):** $\mu = E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X = x_i)$
- **분산(variance):** $V(X) = E((X - \mu)^2) = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$
- **표준편차(standard deviation):** $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

연습문제 6.10. 빨간 공 4개, 흰 공 6개가 들어 있는 주머니에서 3개의 공을 꺼낼 때, 빨간 공이 나오는 개수를 X 라 한다. $E(X), V(X), \sigma(X)$ 를 구하여라.

정의 6.11. 이산확률변수 X 와 함수 $g(x)$ 에 대하여, 다음이 성립한다.

$$E(g(X)) = \sum_{x \in X} g(x) \cdot P(X = x)$$

연습문제 6.12. 확률변수 X, Y 에 대하여 다음을 보여라. (단, a, b 는 상수)

$$(1) \mathbf{E}(aX + b) = a\mathbf{E}(X) + b$$

$$(2) \mathbf{V}(aX + b) = a^2\mathbf{V}(X)$$

$$(3) \sigma(aX + b) = |a| \cdot \sigma(X)$$

$$(4) \mathbf{V}(X) = \mathbf{E}(X^2) - \{\mathbf{E}(X)\}^2$$

연습문제 6.13. 연습문제 6.10 의 확률변수 X 에 대하여 $\mathbf{E}(5X + 4), \mathbf{V}(5X - 1), \sigma(5X + 3)$ 을 각각 구하여라.

정의 6.14. 두 확률변수 X, Y 에 대하여 이들이 취할 수 있는 값들의 모든 순서쌍에 확률이 할어진 정도를 합이 1인 양수로 나타낸 것을 X, Y 의 **결합분포**(joint probability distribution)라 한다.

정의 6.15. 이산확률변수 X, Y 에 대하여 X 가 취할 수 있는 값을 x_1, \dots, x_n , Y 가 취할 수 있는 값을 y_1, \dots, y_m 이라 하자. 순서쌍 (x_i, y_j) 에 대하여 [결합분포가 이 값을 취할 확률 p_{ij}]을 대응시키는 함수

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i \cap Y = y_j) = p_{ij}$$

를 이산확률변수 X, Y 의 **결합확률밀도함수**라 하며, 이 함수는 다음 조건을 만족해야 한다.

$$(1) 0 \leq P(X = x_i, Y = y_j) \leq 1$$

$$(2) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(X = x_i, Y = y_j) = 1$$

$$(3) P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \sum_{x=a}^b \sum_{y=c}^d P(X = x, Y = y)$$

정의 6.16. 이산확률변수 X, Y 의 결합확률밀도함수 $P(X = x_i, Y = y_j)$ 에서 확률변수 X 와 Y 의 확률분포를 얻을 수 있다.

$$P(X = x_i) = \sum_{y \in Y} P(X = x_i, Y = y), \quad P(Y = y_j) = \sum_{x \in X} P(X = x, Y = y_j)$$

이를 각각 X, Y 의 **주변확률밀도함수**라 한다.

연습문제 6.17. 하나의 주사위를 던져서 나오는 눈의 종류에 따라 상금이 걸린 게임이 있다. A, B 두 사람이 다음과 같은 게임을 한다.

A: 1 또는 2 가 나오면 100원, 3 또는 4가 나오면 200원, 5 또는 6이 나오면 300원

B: 짝수가 나오면 100원, 홀수가 나오면 (눈의 수 \times 100)원

이 때, A의 수입을 X , B의 수입을 Y 라 하자. X, Y 의 결합확률분포, 주변분포를 구하고, 확률변수 $Z = X + Y$ 로 정의할 때, Z 의 확률분포와 $E(Z)$ 를 구하여라.

| $x \setminus y$ | | | | 행의 합 |
|-----------------|--|--|--|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 열의 합 | | | | 1 |

| z | | | | | | 합계 |
|------------|--|--|--|--|--|----|
| $P(Z = z)$ | | | | | | 1 |

정의 6.18. 이산확률변수 X, Y 와 함수 $g(x, y)$ 에 대하여, 다음이 성립한다.

$$E(g(X, Y)) = \sum_{x \in X} \sum_{y \in Y} g(x, y) \cdot P(X = x, Y = y)$$

연습문제 6.19. 확률변수 X, Y 에 대하여 $\mathbf{E}(aX + bY) = a\mathbf{E}(X) + b\mathbf{E}(Y)$ 임을 보여라.

정의 6.20. 이산확률변수 X, Y 가 주어져 있다. 임의의 $x_i \in X, y_j \in Y$ 에 대해 다음이 성립하면 확률변수 X, Y 는 서로 독립이라 한다.

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$$

연습문제 6.21. 확률변수 X, Y 가 서로 독립일 때, 다음이 성립함을 보여라.

(1) $\mathbf{E}(XY) = \mathbf{E}(X) \mathbf{E}(Y)$

(2) $\mathbf{V}(X \pm Y) = \mathbf{V}(X) + \mathbf{V}(Y)$

연습문제 6.22. 위 연습문제의 역은 성립하지 않음을 보여라. (Hint: $-1, 1$ 을 각각 $1/2$ 의 확률로 취하는 확률변수 X 에 대해 X 와 X^2 을 고려한다.)

7 이항분포

연습문제 7.1. 두 사람 A, B가 게임을 한다. 매 회 동전을 던져 앞면이 나오면 A가 이기고, 뒷면이 나오면 B가 이긴다. 10회 게임을 할 때, A가 이긴 횟수를 X , B가 이긴 횟수를 Y 라 하자. $\mathbf{E}(X)$, $\mathbf{E}(Y)$ 를 구하여라.