

a)

$f(n)$ sei $\sum_{i=1}^{n-1} (n-i)$, so ist das $(n-1) + (n-2) + \dots + (n-(n-1))$ in umgekehrter Reihenfolge also $1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1)$ und das ergibt mit "dem kleinen Gauß": $\sum_{i=1}^{n-1} (i) = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2-n}{2}$

Nun zur asymptotischen Betrachtung:

sei $f(n)$ wie oben gegeben und $g(n) = n^2$, dann gilt zu zeigen:

$$f = O(g) \text{ und } f = \Omega(g)$$

$f = O(g)$: mit $c = 1$ lässt sich leicht erkennen: ab $n_0 = 2$ gilt:

$$f(n) \leq c \cdot g(n), \text{ denn } \frac{n^2-n}{2} < n^2$$

$f = \Omega(g)$: mit $c = 4$ lässt sich leicht erkennen: ab $n_0 = 2$ gilt:

$$g \leq c \cdot f(n), \text{ bzw. } c \cdot f(n) \geq g(n) \text{ denn}$$

$$4 \cdot \frac{n^2-n}{2} = 2n^2 - 2n = n^2 + (n^2 - 2n) \geq n^2, \quad (n^2 \geq 2n \text{ gilt ab } n=2)$$

$$\underline{\text{Damit gilt: } f(n) = \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \Theta(n^2)}$$

b)

Probieren wir mal was mit n^n . Ist $(n+1)^{n+1} = \Theta(n^n)$?

Das würde bedeuten es gäbe eine Konstante c , sodass $(n+1)^{n+1} \leq c \cdot n^n$
 $(n+1)^{n+1} = (n+1)^n \cdot (n+1) \geq n^n \cdot n$ und damit müsste c größer als n sein, für alle $n > n_0$, so ein c gibt es nicht, damit folgt:

Es gibt Funktionen für die nicht gilt $f(n+1) = \Theta(f(n))$

c)

Sei $f(n) = O(n^r) \Rightarrow \exists c_k : f(n) \leq c_k \cdot n^r$ ab $n > n_0$

Was ist mit $\log(f(n))$? Da der Logarithmus monoton wachsend auf $\mathbb{R}_{\geq 0}$ ist gilt damit $\log(f(n)) \leq \log(c_k \cdot n^r)$ und mit den logarithmusgesetzen folgt:
 $\log(f(n)) \leq \log(c_k) + r \cdot \log(n)$, und damit gilt: Es gibt eine Konstante c_r , sodass $\log(f(n)) \leq c_r \cdot \log(n)$

d)

Untersuchen wir den Bruch $\frac{f(n)}{n^r}$ so gilt mit $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^r} = 0$, der Argumentation aus c) und den Logarithmusgesetzen folgt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(f(n))}{\log(n^r)} = 0 \text{ und somit } \frac{1}{r} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(f(n))}{\log(n)} = 0.$$

$$\text{Also } \log(f(n)) = o(\log n)$$

e)

$$f_1 = n^{1,5} \ ; \ f_2 = \log(n) \ ; \ f_3 = n \log(n) \ ; \ f_4 = n \ ; \ f_5 = O(1)$$

$$\text{Assymptotische Reihenfolge: } f_5 < f_2 < f_4 < f_3 < f_1$$

Mehr?

Prüfen wir $n^{\log_b(a)}$

a)

$$(n^{\log_3(27)}) = n^3 = \Omega(n^9) \ ; \ \Theta(n^9)$$

b)

$$\begin{aligned} 2 + 3 \cdot (T(n-3)) &= 2 + 3 \cdot (2 + 3T(n-6)) = 2 \cdot 3^0 + 2 \cdot 3^1 + 3^2(2 + T(n-9)) \\ &= \sum_{i=0}^{n/3} 2 \cdot 3^i = 2 \frac{3^{1+n/3} - 1}{2} = 3 \cdot 3^{n/3} - 1 = \Theta(3^{n/3}) \end{aligned}$$

c)

$$n^{\log_3(1)}, \text{ also } \log(n) = \Omega(n^{0+\epsilon}), \text{ das gilt nicht!}$$

$$\text{Es ist auch nicht } \log(n) = \Theta(n) \text{ oder } (\log n) = O(n^{-\epsilon})$$

Also kein Master-Theorem!

Die Untersuchung ergibt bei $T(0)$ begonnen:

$$T(1) = 0 \ ; \ T(3) = T(1)+1 \ ; \ T(9) = (T(3)+2) = ((T(1)+1)+2) = 0+1+2$$

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_3(n)} i = \frac{\log_3(n)(\log_3(n)+1)}{2} = (k^2 + k)/2, \text{ mit } k = \log_3(n)$$

mal mit Algo

Wir laufen immer n mal eine kleine for schleife durch. In jedem Durchlauf ändert sich der Endwert der kleinen Schleife.

a)

$n-1$ Durchläufe + $n-2$ + $n-3$ + ... + 0 Durchläufe, wenn $i = n$, also

$$0 + 1 + 2 + \dots + n - 2 + n - 1 = \sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$$

b)

$\log(1)$ Durchläufe + $\log(2)$ Durchläufe + $\log(3)$ + $\log(4)$ + ... + $\log(n-1)$ + $\log(n)$

Mit den Logarithmusgesetzen folgt:

$$\log(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n) = \log(n!) = \Theta(n \log(n))$$

c

$$\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n} = \sum_{i=1}^n i^{1/2} = \Theta(n^{1,5})$$

Wälder und Bäume?

pfff..... kommt noch. vielleicht...