

פרויקט - מתמטיקה בדידה - שחר פרץ - שיעורי בית 7, תרגיל 7.ב

מידע כללי

תאריך הגשה: 20.1.2024

ת.ז.: 334558962

השאלה

תהי פונקציה $f: A \rightarrow B$, ויהי $X \subseteq A$, נגדיר את הצמצום של f ל- X בתור פונקציה $f|_X: X \rightarrow B$ המקיימת $\forall x \in X. f|_X(x) = f(x)$. כחלק מתרגיל בית 6, גם ניתנו ההגדרות השקולות הבאות:

$$f|_X := f \cap (X \times B) = \{\langle a, b \rangle \in f \mid a \in X\}$$

יהיו $A, B, C \neq \emptyset$ קבוצות. נגדיר:

$$H: ((B \cup C) \rightarrow A) \rightarrow ((B \rightarrow A) \times (C \rightarrow A)) \quad (1)$$

$$H = \lambda h \in (B \cup C) \rightarrow A. \langle h|_B, h|_C \rangle \quad (2)$$

צ.ל. תנאי הכרחי ומספיק על A, B, C לכך ש- H על $(B \rightarrow A) \times (C \rightarrow A)$

מה לא נכון בהוכחה שנתתי בשיעורי הבית

ניסיתי להוכיח ש- $B \cap C = \emptyset$ אמ"מ H על.

במהלך הגרירה השנייה, הייתי צריך להוכיח ש- H על גורר $B \cap C = \emptyset$ (שבדיעבד אינו נכון). שיטת ה"הוכחה" שנקטתי בה הייתה הנחה בשלילה; הנחתי בשלילה ש- H על, ו"הוכחתי" שנגרר $B \cap C = \emptyset$, אך זו אינה אפילו שיטה להוכחת גרירה - סה"כ כל מה שהוכחתי באמת הוא ש- H לא על. גישה נכונה, הייתה, לדוגמה, להניח ש- H על ולהוכיח את אשר נדרש ממני, ואז, דוגמה, להניח בשלילה ש- $B \cap C = \emptyset$ (ולא ההפך) ולהראות שתחת ההנחה, זאת מוביל לסתירה (אבל כמובן שזה אינו אפשרי).

הוכחה מתוקנת

נוכיח ש- $(B \cap C = \emptyset \vee |A| = 1)$ שקול לכך ש- H על. נוכיח שתי גרירות.

• נניח $B \cap C = \emptyset \vee |A| = 1$. נוכיח H על. כלומר, יהי $\langle f_1, f_2 \rangle \in (B \rightarrow A) \times (C \rightarrow A)$. נוכיח קיום $h \in ((B \cup C) \rightarrow A)$ כך ש- $H(h) = \langle f_1, f_2 \rangle$. נפלג למקרים.

◦ נניח $B \cap C = \emptyset$: נבחר $h = f_1 \cup f_2$. נוכיח ש- h פונ', המקיימת $H(h) = \langle f_1, f_2 \rangle$:

▪ h פונ': נוכיח מליאות וחד ערכיות;

◻ מליאות ב- $B \cup C$: יהי $x \in B \cup C$, נוכיח קיום $y \in A$ כך ש- $\langle x, y \rangle \in h$. נפצל למקרים: אם $x \in B$,

נבחר $y = f_1(x) \in B$ כך ש- $\langle x, y \rangle \in f_1 \subseteq h$, ואם $x \in C$ באופן דומה נבחר $y = f_2(x)$.

אולי קצת מאבאן לכתוב כאן "כך ש-". אפשר לכתוב למשל "ואז".

□ חד-ערכיות: יהי $x \in B \cup C$, ויהי y_1, y_2 כך ש- $\langle x, y_1 \rangle \in h \wedge \langle x, y_2 \rangle \in h$. נוכיח $y_1 = y_2$.
בשילוח שלא כן. נפצל למקרים:

- אם $x \in B \setminus C$, אז $\langle x, y_1 \rangle, \langle x, y_2 \rangle \notin f_2$ ולכן הם ב- f_1 , ומשום ש- f_1 ח"ע אז $y_1 = y_2$.
- אם $x \in C \setminus B$, אז $\langle x, y_1 \rangle, \langle x, y_2 \rangle \notin f_1$ ולכן הם ב- f_2 , ומשום ש- f_2 ח"ע אז $y_1 = y_2$.
- אם $x \in \emptyset$ אז $x \in C \cap B$ והטענה נכונה באופן ריק.

■ h מקיימת $H(h) = \langle f_1, f_2 \rangle$: נשתמש בכלל β וכלל α של תחשיב למדא, נקבל שצ"ל:

$$\langle (f_1 \cup f_2)|_B, (f_1 \cup f_2)|_C \rangle = \langle f_1, f_2 \rangle$$

ובהתחשב בזה שהתחומים של f_1 ו- f_2 הם A, B בהתאמה שהן קבוצות זרות, ובהתאם להגדרה השקולה של הצמצום המופיע לעיל, זהו פסוק אמת.

○ נביח $|A| = 1$, יהי $a \in A$, נסיק $A = \{a\}$. ידוע $f_1: B \rightarrow A$ וידוע $f_2: C \rightarrow A$. נבחר $h = \lambda x \in B \cup C. a$.
לפי הגדרה, $h: (B \cup C) \rightarrow A$, ונשאר להוכיח $h|_B = f_1 \wedge h|_C = f_2$. משום שאין שום הגבלה על B או C ,
נוכיח בה"כ $h|_B = f_1$. משום ש- $|A| = 1$, אזי f_1 הפונקציה הקבוצה ב- a (נביח בשלילה שלא כן, לפיכך קיים
 $b \in A \wedge b \neq a$ בעבורו ישנו x כך ש- $f_1(x) = b$ אך $A = \{a\}$ ולכן $b \in \{a\} \wedge b \neq a$, ובאופן שקול
 $b = a \wedge b \neq a$ וזו סתירה). ולפי הגדרת הפונקציה הקבוצה שניתנה בשיעור $h|_B = \lambda x \in B. a$. מעתה
ואילך, נוכיח $h|_B = f_1$ באמצעות הכלה דו כיוונית.

זה לא "הה"כ"
אלא פשוט מספיק
להוכיח $h|_B = f_1$,
והשוויון השני
יגיע באופן
דומה.

- $f_1 \subseteq h|_B$: יהי $\langle x, y \rangle \in f_1$, ולפי כלל β $x \in B \wedge y = a$. צ"ל $\langle x, y \rangle \in h|_B$. באופן שקול, לפי עקרון ההפרדה, צ"ל $\langle x, y \rangle \in h \wedge x \in B$. הטענה $x \in B$ נכונה מהנתונים, והטענה $\langle x, y \rangle \in h$ נכונה כי $x \in B \cup C \wedge y = a$ שזה שקול לכך ש- $\langle x, y \rangle \in h$ לפי כלל β .
- $h|_B \subseteq f_1$: יהי $\langle x, y \rangle \in h|_B$, נוכיח $\langle x, y \rangle \in f_1$. לפי עקרון ההפרדה, ידוע $\langle x, y \rangle \in h \wedge x \in B$, ולפי כלל β סה"כ $x \in B \cup C \wedge y = a \wedge x \in B$ ובאופן שקול $x \in B \wedge y = a$ שלפי כלל β בכיוון ההפוך גורר $\langle x, y \rangle \in f_1$ כדרוש.

מיותר.
אפשר להסיק
ש- $h|_B = f_1$
בצורה פשוטה.

סה"כ $|A| = 1 \vee B \cap C = \emptyset$ תנאי מספיק להיות H על: $\mathcal{E.F.}$

- נביח H על, נוכיח $|A| = 1 \vee B \cap C = \emptyset$. נביח בשלילה את הטענה ההפוכה; ש- $B \cap C \neq \emptyset$ וגם $|A| \neq 1$ (לפי חוקי דה-מורגן על לוגיקה). ידוע $A, B, C \neq \emptyset$, ולכן $|A| \geq 2$ (ויהי $a_1, a_2 \in A, a_1 \neq a_2$) וגם ישנו לפחות איבר יחיד ב- $B \cap C$ (ויהי $x \in B \cap C$). כדי להראות דוגמה נגדית להנחת השלילה, נתבונן בנתון על היות H על, ונסיק שלכל $\langle f_1, f_2 \rangle \in (B \rightarrow A) \times (C \rightarrow A)$ מתקיים קיום $h \in (B \cup C) \rightarrow A$ עוברו $H(h) = \langle f_1, f_2 \rangle$.
ובפרט עבור $f_1 = \{\langle x, a_1 \rangle\}, f_2 = \{\langle x, a_2 \rangle\}$ זאת מתקיים קיום h כזה [הערה: כאן צריך את קיום לפחות שני איברים ב- A , תנאי שנעדר מההוכחה הקודמת]. מתוך כלל β על הטענה $H(h) = \langle f_1, f_2 \rangle$, נסיק $h|_B = f_1 \wedge h|_C = f_2$. מן הנתון $f_1 = \{\langle x, a_1 \rangle\}, f_2 = \{\langle x, a_2 \rangle\}$ ומכלל η לשוויון בין פונקציות, נסיק ולפי הגדרת $h|_X$ המתבצעת לפי עקרון ההפרדה $\langle x, a_1 \rangle \in h|_B \wedge \langle x, a_2 \rangle \in h|_C$.
ולכן לפי הגדרה h אינה ח"ע ובפרט h אינה פונקציה, שהינה סתירה. להנחה h פונקציה. סה"כ $|A| = 1 \vee B \cap C = \emptyset$ תנאי הכרחי להיות H על: $\mathcal{E.F.}$

פונקציות הן
קבוצות של
זוגות סדורים

זה לא קשה
לפשוט
מהשוויון
בין הפונקציות.

■ $\mathcal{E.D.}$

~ סוף ~