

# תרגיל בית 3 ~ עברי נגר ~ נגזרות וחקירה


שחר פרץ

23 באוקטובר 2024

1

1. השתכנעתי

2. נמצא את כמות הזמן שיקח למצילה לעבור כתלות ב- $\theta_1$ . נשתמש ב- $x_1, y_1, x_2, y_2$  כמו בסרטוט הבא:



לפי הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות, וכלל החיבור, יתקיים:

$$\tan \theta_2 = \frac{x_2}{\ell_2}, \tan \theta_1 = \frac{x_1}{\ell_1}, x_1 + x_2 = d$$

**טענה 1.** נציב ונקבל קשר גיאומטרי בין הזוויות:

$$d = \underbrace{\ell_1 \tan \theta_1}_{x_1} + \underbrace{\ell_2 \tan \theta_2}_{x_2} \implies \ell_2 \tan \theta_2 = d - \ell_1 \tan \theta_1 \implies \theta_2 = \arctan \left( \frac{d - \ell_1 \tan \theta_1}{\ell_2} \right)$$

עתה, נרצה למצוא ישירות את  $t(\theta_1)$ . משום ש- $s = t \cdot v$  אז  $t = \frac{s}{v}$ . נסמן ב- $t_1$  את כמות הזמן שלוקח לעבור את  $y_1$ , וב- $t_2$  את כמות הזמן שלוקח לעבור את  $y_2$ .

$$t(\theta_1) = t_1 + t_2 = \frac{y_1}{v_1} + \frac{y_2}{v_2}$$

באמצעות הגדרת ה- $\cos$  נמצא את  $y_1, y_2$ :

$$\cos \theta_1 = \frac{\ell_1}{y_1}, \cos \theta_2 = \frac{\ell_2}{y_2} \implies y_1 = \frac{\ell_1}{\cos \theta_1}, y_2 = \frac{\ell_2}{\cos \theta_2}$$

**טענה 2.** נציב:

$$t(\theta_1) = \frac{\ell_1}{v_1 \cos \theta_1} + \frac{\ell_2}{v_2 \cos \theta_2}$$

ננסה למצוא את הערך של  $\frac{1}{\cos \theta_2}$ :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos \theta_2} &= \sec \theta_2 = \sqrt{\sec^2 \theta_2} && \text{since } \sec^2 = 1 + \tan^2 \\ &= \sqrt{1 + \tan^2 \theta_2} && \text{לפי טענה 1} \\ &= \sqrt{1 + \tan^2 \left( \arctan \left( \frac{d - \ell_1 \tan \theta_1}{\ell_2} \right) \right)} && \text{since } \tan(\arctan x) = x \\ &= \sqrt{1 + \left( \frac{d - \ell_1 \tan \theta_1}{\ell_2} \right)^2} \end{aligned}$$

**טענה 3.** נציב חזרה בטענה 1. נשתמש בעובדה ש- $x^2 = (-x)^2$ :

$$t(\theta_1) = \frac{\ell_1}{v_1 \cos \theta_1} + \frac{\ell_2}{v_2} \cdot \sqrt{1 + \left( \frac{\ell_1 \tan \theta_1 - d}{\ell_2} \right)^2}$$

3. כדי למצוא את הזמן המינימלי, נגזור את  $t(\theta_1)$  לפי הנוסחה של טענה 2.

$$\begin{aligned} t'(\theta_1) &= -\frac{\ell_1 v_1 \cos \theta_1}{v_1^2 \cos^2 \theta_1} + \frac{\ell_2}{v_2} \left( \frac{1 + \left( \frac{\ell_1 \tan \theta_1 - d}{\ell_2} \right)^2}{2 \sqrt{\frac{\ell_1 \ell_2}{\cos^2 \theta_1} \ell_2^2}} \right) \\ &= -\frac{\ell_1 v_1 \cos \theta_1}{v_1^2 \cos^2 \theta_1} + \frac{\ell_2}{v_2} \left( \frac{\ell_1 \tan \theta_1 - d + \ell_2}{\sqrt{4 \frac{\ell_1}{\cos^2 \theta_1} \ell_2}} \right) \\ &= -\frac{\ell_1 v_1 \cos \theta_1}{v_1^2 \cos^2 \theta_1} + \frac{\ell_1 \tan \theta_1 - d + \ell_2}{v_2 \sqrt{4 \frac{\ell_1}{\cos^2 \theta_1} \ell_2}} \end{aligned}$$

נשווה ל-0 כדי לנסות למצוא את נקודות סטציונריות. נכפיל במכפלת האגפים התחתונים.

$$\begin{aligned} t'(\theta_1) = 0 &\iff -\ell_1 v_1 \cos \theta_1 v_2 \sqrt{4 \frac{\ell_1}{\cos^2 \theta_1} \ell_2} + (\ell_1 \tan \theta_1 - d + \ell_2) \cdot v_1^2 \cos^2 \theta_1 = 0 \\ &\quad 2\ell_1^{1.5} v_1 v_2 \ell_2^{-0.5} + (\ell_1 \tan \theta_1 - d + \ell_2) \cdot v_1^2 \cos^2 \theta_1 = 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} t'(\theta_1) = 0 \iff \end{aligned}} \right\} \text{צמצום}$$

2.

1. **שאלה:** מסך קולנוע נמצא בגובה 10 מטר מהרצפה וגובהו 20 מטר. באיזה מרחק  $x$  ממנו יש לשבת על מנת שזווית הראיה  $\theta$  תהיה מקסימלית?

**תשובה:** מתוך הסרטוט שבשיעורי הבית:

$$\theta(x) = \tan \frac{20+10}{x} - \tan \frac{10}{x} = \tan \frac{30}{x} - \tan \frac{10}{x}$$

כאשר תחום ההגדרה של הזווית יהיה כאשר  $\theta(x) = \frac{\pi}{2}$ , כלומר  $x > 0$ . נגזור ונשווה ל-0 כדי למצוא נקודות סטציונריות:

$$\begin{aligned} \theta'(x) &= -\csc^2 \left( \frac{30}{x} \right) \frac{30}{x^2} + \csc^2 \left( \frac{10}{x} \right) \frac{10}{x^2} \stackrel{!}{=} 0 \\ &\quad 30 \csc^2 \left( \frac{10}{x} \right) - 10 \csc^2 \left( \frac{30}{x} \right) \stackrel{!}{=} 0 \\ &\quad \frac{10}{\cos^2(10x^{-1})} - \frac{30}{\cos^2(30x^{-1})} \stackrel{!}{=} 0 \\ &\quad 10 \cos^2(30x^{-1}) - 30 \cos^2(10x^{-1}) \stackrel{!}{=} 0 \\ &\quad -2 + \cos(60x^{-1}) + \cos(20x^{-1}) \stackrel{!}{=} 0 \\ &\quad \cos \left( \frac{80}{x} \right) \cos \left( \frac{40}{x} \right) \stackrel{!}{=} 2 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \theta'(x) = \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \cdot x^2 \\ \csc \\ \times \\ \cdot 0.2 \end{array}$$

עתה,

2. **שאלה:** מהן אורכי הצלעות של המבחן עם היקף מינימלי ששטחו  $S$ ?

**תשובה:** בהינתן שטח  $S$ , נסמן צלע אחת ב- $x$  ועבור הצלע השנייה  $y$  יתקיים  $y = \frac{S}{x}$ . נתבונן בפונקציית ההיקף  $P$  וננסה למצוא לה מינימום:

$$P(x) = 2x + 2y = 2 \left( x + \frac{S}{x} \right)$$

נגזר ונשווה ל-0 כדי למצוא נקודות סטציונריות:

$$\begin{aligned} P'(x) &= 2 \left( 1 - \frac{S}{x^2} \right) = 0 \\ x^2 - S &= 0 \\ x &= \pm \sqrt{S} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \cdot \frac{x^2}{2} \\ +S, \sqrt{\phantom{x}} \end{array} \right\}$$

בהתחשב בתחום הגדרה  $x \geq 0$ , נמצא שהנקודה הסטציונרית היחידה היא  $x = \sqrt{S}$ . נציב בטבלה כדי למצוא סוג קיצון:

$x$	$\frac{\sqrt{S}}{2}$	$S$	$S+1$
$f'$	$-$	$0$	$+$
$f$	$\searrow$	$\cup$	$\nearrow$

בהתאם לחישובים הבאים:

$$\begin{aligned} f' \left( \frac{\sqrt{S}}{2} \right) &= 2 - 2 \cdot \frac{S}{S/4} = 2 - 4 = -2 \leq 0 \\ f'(S+1) &= 2 - 2 \cdot \underbrace{\frac{S}{(S+1)^2}}_{\leq 1} \geq 0 \end{aligned}$$

סה"כ מינימום לוקאלי ב- $x = \sqrt{S}$ , בו יתקיים:

$$P(x) = P(\sqrt{S}) = 2\sqrt{S} + 2 \cdot \frac{S}{S} = 2(\sqrt{S} + 1)$$

נבדוק קיצון קצה:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2x + \frac{S}{x} = \infty \leq 2\sqrt{S} + 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2x + \frac{S}{x} = +\infty \leq 2\sqrt{S} + 2$$

סה"כ ב- $x = 0$  מינימום מוחלט. נחשב את צלעות המלבן:

$$x = \sqrt{S}, y = \frac{S}{\sqrt{S}} = S, \implies x = y = \sqrt{S}$$

3. **שאלה:** מבין כל הגלילים הסגורים משני הצדדים, עם שטח פנים של  $50\text{cm}^2$ , מה היחס בין גובה הגליל לבסיסו במקרה של הגליל עם הנפח הגדול ביותר?

ידועה ההגבלה ידוע שהמעטפת היא  $2\pi rh$  ושהבסיסים הם  $\pi r^2$  כל אחד; אזי, שטח הפנים יהיה  $50 = 2\pi r(r+h)$ . נמצא את הנפח  $V$  יהיה:

$$\begin{aligned} 25 &= \pi r^2 + rh \implies rh = 25 - \pi r^2 \implies h = \frac{25}{r} - \pi r \\ V &= \pi r^2 h \implies V(r) = \pi r^2 \cdot \left( \frac{25}{r} - \pi r \right) = \pi (25r - r^3) \end{aligned}$$

נגזר את הנפח כדי למצוא מקסימום:

$$V'(r) = 25 - 3r^2 = 0 \implies r^2 = \frac{25}{3} \implies r = \pm \frac{5}{\sqrt{3}}$$

כאשר הפתרון השלילי מחוץ לתחום ההגדרה  $0 \leq r$ . באותה הנקודה, יתקיים שהנפח יהיה  $V \approx 151$ . נתבונן בקצוות תחום ההגדרה  $0 \leq r$ :

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow \infty} V(r) &= \lim_{r \rightarrow \infty} \pi r(25 - r^2) = \left( \lim_{r \rightarrow \infty} \pi r \right) \cdot \left( \lim_{r \rightarrow \infty} 25 - r^2 \right) = \infty \cdot (-\infty) = -\infty \leq 151 \\ \lim_{r \rightarrow 0^+} \pi r(25 - r^2) &= 0 \leq 151 \end{aligned}$$

סה"כ  $r = \frac{5}{\sqrt{3}}$  קיצון מוחלט. אזי, שטח בסיס הוא  $\pi r^2 = \frac{5\pi}{3}$ , וגובה הגליל הוא  $h = \frac{25\sqrt{3}}{5} - \frac{5\pi}{\sqrt{3}}$ . סה"כ, היחס יהיה:

$$\frac{S}{h} = \frac{\frac{5\pi}{3}}{5\sqrt{3} - \frac{5\pi}{\sqrt{3}}}$$

בעיה: זה לא עובד.

1. נחקור את הפונקציה  $f(x) = \frac{e^x}{1+x}$ .

• **תחום הגדרה:**  $1+x \neq 0 \implies x \neq -1$

• **סימטריה:** סתירה;  $x=2 \implies f(2) = 2.43 \neq \pm 0.135 = f(-2)$

• **חיתוך עם הצירים:**  $7f(0) = \frac{e^0}{1+0} = 1$

$$f(x) = 0 \implies \frac{e^x}{x+1} = 0 \implies e^x = 0 \implies x = \ln 0 \in \emptyset$$

סה"כ נקודות החיתוך היחידה  $\langle 0, 1 \rangle$ .

• **סטציונריות וסוג:** נגזור.

$$f'(x) = \frac{(1+x)e^x - e^x \cdot 1}{(1+x)^2} = \frac{e^x + xe^x - e^x}{(1+x)^2} = \frac{e^x}{(1+x)^2}$$

נשווה ל-0:

$$\frac{xe^x}{(1+x)^2} = 0 \implies xe^x = 0 \implies x = 0$$

נמצא את סוג הנקודה. נתבונן בסימן של הנגזרת.

$x$	-2	-1	-0.5	0	1
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	$\emptyset$	$\searrow$	$\cup$	$\nearrow$

כלומר כאשר  $x=0$  המינימום היחיד קיים. משמע  $\langle 0, 1 \rangle$  נקודת המינימום היחידה.

• **נקודות עוגף:** נתבונן בנגזרת השנייה, ונשוואה אותה ל-0:

$$f''(x) = [xe^x]' = e^x + xe^x = 0 \implies e^x(x+1) = 0 \implies \begin{cases} e^x = 0 \implies x = \ln 0 \in \emptyset \\ x+1 = 0 \implies x = -1 \end{cases}$$

נתבונן בכיוון הנגזרת השנייה בין בתחומים המוגדרים ובין נקודות ה-0:

$x$	-2	-1	0
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\cap$	$\emptyset$	$\cup$

סה"כ אין נקודות עוקף.

• **אסימפטוטות:**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x+1} = \frac{e^\infty}{\infty} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x+1} = \frac{\frac{e}{\infty}}{-\infty} = \frac{0}{-\infty} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^x}{x+1} = \frac{e^{-1}}{+0} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{e^x}{x+1} = \frac{e^{-1}}{-0} = -\infty \end{aligned}$$

• **תחומי עלייה/ירידה:** על בסיס הטבלה של הנגזרת הראשונה; עליה:  $x > 0$  / ירידה:  $x < 0 \wedge x \neq -1$

• **תחומי קעירות/קמירות:** על בסיס הטבלה של הנגזרת השנייה; קעירות:  $x < 1$  / קעירות:  $x > -1$

2. נחקור את הפונקציה  $f(x) = \frac{(x+a)^2}{1-|x|}$ .

• **תחום הגדרה:**  $1-|x| \neq 0 \implies |x| \neq 1 \implies x \neq \pm 1$

• **סימטריה:** עבור  $x \geq 0$  כללי:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(x+a)^2}{1-x} \stackrel{!}{=} \frac{(a-x)^2}{1-x} = f(-x) \\ (x+a)^2 &= (x-a)^2 \\ x+a &= x-a \\ 2a &= 0 \implies a = 0 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \cdot (1-x) \\ \searrow \sqrt{\phantom{x}} \end{array} \right\}$$

סה"כ הפונקציה תהיה זוגית אם  $a = 0$ . אם נרצה שהיא תהיה אי-זוגית, באופן דומה נקבל  $x + a = -x + a$  כלומר  $x = 0$  וזו סתירה עבור  $2x = 0$ .

• **חיתוך עם הצירים:**  $f(0) = \frac{(0+a)^2}{1-|0|} = a^2$

$$f(x) = 0 \implies \frac{(x+a)^2}{1-|x|} = 0 \implies (x+a)^2 = 0 \implies x+a = \pm 0 \implies x = -a$$

סה"כ נקודות חיתוך  $\langle 0, a^2 \rangle, \langle -a, 0 \rangle$

• **נק' סטציונריות וסוגן:** נגזור ונשווה ל-0. נפריד למקרים: אם  $x > 0$  ואם  $x < 0$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2(x+a)|x| - 1}{1 - 2|x| + x^2} & x > 0 \\ \frac{2(x+a)|x| + 1}{1 - 2|x| + x^2} & x < 0 \end{cases}$$

בהשוואה ל-0:

$$\frac{2(x+a)|x| \pm 1}{1 - 2|x| + x^2} = 0 \implies 2(x+a)|x| \pm 1 = 0 \implies 2x|x| + 2a \pm 1 = 0$$

נפריד למקרים. אם  $x > 0$ :

$$2x^2 + 2a - 1 = 0 \implies x_{1,2} = \frac{-2a + \sqrt{4a^2 + 4 \cdot 2}}{-2}$$

• **נק' פיתול:** נתבונן בנגזרת השנייה:

$$f''(x) = \begin{cases} 2|x| \cdot 2(x+a) \end{cases}$$

• **אסימפטוטות וגבולות:**

• **תחומי עלייה/ירידה:**

• **תחומי קמירות/קעירות:**

• **סרטוט:**

3. נחקור את הפונקציה  $f(x) = \sqrt{(a^2 - x^2)(1 + 2x^2)}$

• **תחום הגדרה:**  $g(x) := (a^2 - x^2)(1 + 2x^2) \geq 0$ . נמצא נקודות חיתוך עם ציר ה- $x$  ונבדוק כיוון.

$$\begin{cases} a^2 - x^2 = 0 & \implies a^2 = x^2 \implies x = \pm a \\ \vee 1 + 2x^2 = 0 & \implies x^2 = -0.5 \implies x \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \end{cases}$$

$$g(0) = (a^2 - 0^2)(1 + 2 \cdot 0^2) = a^2 \geq 0$$

$$g(2a) = (a^2 - 4a^2)(2 + 8a^2) = -4a^2 - 16a^4 \leq 0$$

$$g(-2a) = (a^2 - 4a^2)(2 + 8a^2) = -4a^2 - 16a^4 \leq 0$$

נציב בטבלה:

$x$	$-2a$	$-a$	$0$	$a$	$2a$
$g(x)$	$-$	$0$	$+$	$0$	$-$

סה"כ, הפונקציה מוגדרת בעבור  $g(x) \geq 0$ , כלומר  $-a \leq x \leq a$ .

• **סימטריה:**

$$\forall x \in \mathbb{R}. f(x) = \sqrt{(a^2 - x^2)(1 + 2x^2)} = \sqrt{(a^2 - (-x)^2)(1 + 2(-x)^2)} = f(-x)$$

סה"כ הפונקציה זוגית, לכל  $a$ . היא לא פונקציית קו ישר ולכן לא ייתכן שהיא גם אי-זוגית.

• **חיתוך עם הצירים:**  $f(0) = \sqrt{(a^2 - 0)(1 + 2 \cdot 0)} = a\sqrt{2}$

$$f(x) = 0 \iff \sqrt{g(x)} = 0 \iff g(x) = 0 \iff x = \pm a$$

אזי  $\langle a, 0 \rangle, \langle -a, 0 \rangle, \langle 0, a\sqrt{2} \rangle$  נקודות החיתוך עם הצירים.

• נק' סטציונריות וסוגן: נגזור ונשווה ל-0.

$$f'(x) = \frac{-2x(1+2x^2) + 4x(a^2 - x^2)}{\sqrt{(a^2 - x^2)(1+2x^2)}} = \frac{2x(-1+2a^2-4x^2)}{\sqrt{(a^2 - x^2)(1+2x^2)}} = 0 \implies 2x(-1+2a^2-4x^2) = 0$$

נפלג למקרים. אם  $2x = 0$  אז עבור  $x = 0$  השוויון יתקיים, אחרת, השוויון הבא יצטרך להתקיים:

$$-1+2a^2-4x^2 = 0 \implies x^2 = \frac{-1+2a^2}{4} \implies x = \pm \frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}$$

נשים לב שהנקודה הזו קיימת אמ"מ  $-1+2a^2 \geq 0$ . נמצא נקודות חיתוך כדי להבין מתי השוויון מתקיים.

$$2a^2 - 1 = 0 \implies a^2 = 0.5 \implies a = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

ידוע כי  $-2^{-0.5} \leq 0 \leq 2^{-0.5}$ , כלומר עבור  $a = 0$  נוכל לבדוק מה יתקיים. שם, נמצא  $-1+2 \cdot 0^2 = -1 \leq 0$ , ומשום שזו פרבולות בקצוות האחרים של התחום היא תהיה חיובית, וסה"כ הא"ש יתקיים אמ"מ  $a \notin (-2^{0.5}, 2^{0.5})$ . נרצה גם לדעת שבהינתן  $a$  שעבורן הן מוגדרות, האם הן יהיו בתחום ההגדרה. נפתור את אי-השוויון  $\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2} \leq a$ . נמצא נקודות חיתוך של שתי הפונקציות:

$$\implies -1+2a^2 = 4a^2 \iff 2a^2 = -1 \iff a = \sqrt{-0.5} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$$

כלומר אין נקודות חיתוך, משמע נוכל לבחור ערך  $a$  אקראי בתחום ההגדרה ולבדוק אם עליו יתקיים אי-השוויון, ומכאן יגרר על השאר. עבור  $a = 2 > 2^{0.5}$ , נציב ונקבל ש- $\frac{1}{2}\sqrt{-1+4} \leq 2$ , כדרוש. באופן דומה אי-השוויון  $-a \leq -\frac{1}{2}\sqrt{-1+a^2}$  יתקיים גם הוא. נסכם: שתי הנקודות הללו קיימות אמ"מ  $a \notin (-2^{0.5}, 2^{0.5})$ , לכל ערך  $a$ .

נמצא את סוג הנקודות הסטציונריות: נפלג למקרים.

$$\text{אם } a \in \mathbb{R}_+ \setminus (-2^{-0.5}, 2^{0.5}) \implies a > \sqrt{2}^{-1}$$

$-a$	$\frac{-a-\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}$	$-\frac{1}{4}\sqrt{-1+2a^2}$	0	$\frac{1}{4}\sqrt{-1+2a^2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}$	$\frac{a+\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}}{2}$	$a$
0	+	0	-	0	-	0	+	0
$\cup$	$\nearrow$	$\cap$	$\searrow$	$\cup$	$\nearrow$	$\cap$	$\searrow$	$\cup$

ניעזרתי בכיוון של ההצבות הבאות:

$$f'\left(\frac{-a-\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}}{2}\right) = \frac{\overbrace{\left(-a-\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}\right)}^{\leq 0} \underbrace{\left(\cancel{-1+2a^2} - (4(-a^2-a\sqrt{-1+2a^2})\cancel{-1+2a^2})\right)}_{\substack{\geq 0 \\ \sqrt{\dots} \\ \geq 0}}}{\sqrt{\dots}} = \frac{(+)(-)^2}{(+)} \geq 0$$

$$f'\left(-\frac{1}{4}\sqrt{-1+2a^2}\right) = \frac{\overbrace{\left(-\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}\right)}^{\leq 0} \underbrace{\left(\cancel{-1+2a^2} + \sqrt{-1+2a^2}\right)}_{\substack{\geq 1 \\ \sqrt{\dots} \\ \geq 0}}}{\sqrt{\dots}} = \frac{(-)(+)}{+} \leq 0$$

כאשר ידוע  $|a| \geq 2^{0.5}$  ולכן  $2a^2 \geq 4 \geq 1$  וסה"כ אי-השוויון בסוגריים תקין.

באופן דומה, ערכם של המקבילים לערכים אלו החיוביים יהיה זהה (כיוון הביטוי בסוגריים הימניות בו  $x$  ממעלה שנייה לא ישתנה, אך המקדם שלהם בסוגריים השמאליות כן ישנה את כיוונו כי הוא ממעלה ראשונה). נמצא את ערכי ה- $y$  של נקודות הקיצון שמצאנו:

$$f\left(\pm \frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}\right) = \sqrt{\left(a^2 - \frac{1}{4}(-1+2a^2)\right)\left(1 - \frac{1}{2}(-1+2a^2)\right)} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{2} - a^2\right)}$$

$$f(0) = \sqrt{(a^2 - 0^2)(1 + 2 \cdot 0^2)} = \sqrt{a^2} = |a| = a$$

$$f(\pm a) = \sqrt{a^2 - (\pm a)^2}(1 + 2a^2) = 0$$

$$\text{אם } a \in (0, 2^{0.5}]$$

$x$	$-a$	$-0.5a$	$0$	$0.5a$	$a$
$f'(x)$	$0$	$+$	$0$	$-$	$0$
$f(x)$	$\cup$	$\nearrow$	$\cap$	$\searrow$	$\cup$

ניעזרתי בכיוון של ההצבות הבאות:

$$f'(-0.5a) = \frac{-a(-1 + 2a^2 - 4 \cdot \frac{1}{4}a^2)}{\sqrt{\dots}} = \frac{-a(-1 + a^2)}{\sqrt{\dots}} = \frac{\overbrace{a - a^2}^{\geq 0}}{\underbrace{\sqrt{\dots}}_{\geq 0}} \geq 0$$

$$f'(0.5a) = \frac{a(-1 + 2a^2 - 4 \cdot \frac{1}{4}a^2)}{\sqrt{\dots}} = \frac{\overbrace{a^2 - a}^{\leq 0}}{\underbrace{\sqrt{\dots}}_{\geq 0}} \leq 0$$

כאשר מתקיים אי-השוויון  $a^2 < a$  כי  $a < \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$  (ראה לפה 1 בסעיף 6).

סה"כ, נקודות הקיצון הן:

$$\begin{cases} \left\langle \pm \frac{1}{2} \sqrt{-1 + 2a^2}, \sqrt{\left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{4}\right) \left(\frac{3}{2} - a^2\right)} \right\rangle \max & a \in (\sqrt{2}^{-1}, \infty) \\ \langle 0, a \rangle, \langle \pm a, 0 \rangle & \min \\ \langle 0, a \rangle \max & a \in (0, \sqrt{2}^{-1}] \\ \langle 0, \pm a \rangle \min & \end{cases}$$

• **נק' פיתול:** אין צורך בסעיף זה.

• **אסימפטוטות וגבולות:** לא מצאנו נקודות אי-הגדרה, והפונקציה מוגדרת בקצוות תחום ההגדרה שלה. אזי, הפונקציה רציפה בכל תחום, וללא אסימפטוטות אופקיות.

• **תחומי עלייה/ירידה:** על בסיס הטבלה שבעזרתה מצאנו נקודות סטציונריות, תחומי העלייה והירידה הם:

$$\nearrow: \begin{cases} x \in (a, -\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}) \cup (0, \frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}) & a \in (\sqrt{2}^{-1}, \infty) \\ x \in (-a, 0) & a \in (0, \sqrt{2}^{-1}] \end{cases}$$

$$\searrow: \begin{cases} x \in (-\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}, 0) \cup (\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}, a) & a \in (\sqrt{2}^{-1}, \infty) \\ x \in (0, a) & a \in (0, \sqrt{2}^{-1}] \end{cases}$$

• **תחומי קמירות/קעירות:** אין צורך בסעיף זה.

• **סרטוט:**

4

(א) **שאלה:** לאילו ערכי  $a$  של הפונקציה  $f(x) = x^4 + ax^3 + 6x^2$  שתי נקודות פיתול.

**פתרון:** נשווה ל-0 את הנגזרת השנייה כדי למצוא נקודות חשודות פיתול:

$$f''(x) = 4x^3 + 3ax^2 + 12x = 0 \implies f''(x) = 12x^2 + 6ax + 12 = 0 \implies x_{1,2} = \frac{6a \pm \sqrt{9a^2 - 576}}{24}$$

הנקודות הללו יהיו קיימות אם  $9a^2 - 576 \geq 0$ . שורשי הפרבולה הזו (כתלות ב- $a$ ) יהיו  $a_{1,2} = \pm 8$ , ומשום שזו פרבולה שמחה, אי-השוויון יתקיים כאשר  $a \notin (-8, 8)$ . אך, כאשר אי-השוויון יתקיים באופן הדוק השורש יוציא רק נקודה אחת, אזי שתי נקודות פיתול שונות ימצאו כאשר  $a \in [-8, 8]$ .

(ב) עבור ערך  $a$  שבו הדיסקמיננטה של הנגזרת השנייה תהיה 0, כלומר הנגזרת השנייה תשתווה ל-0 בנקודה אחת בלבד. זה יקרה בעת ש- $9a^2 - 576 = 0 \implies a = \pm 8$ .

5

(א) נרצה להוכיח  $\forall x \in \mathbb{R}_+, \sin x < x$ . נתבונן ב- $f(x) = \sin x - x$ , ונוכיח את אי-השוויון  $f(x) < 0$ . נתבונן בנגזרתה של הפונקציה:  $f'(x) = \cos x - 1$ . נרצה למצוא לה נקודות קיצון. נתבונן בא"ש  $\cos x = 1 \implies x = 0.5\pi k$ , וממחזוריות  $\cos x$ .

והגדרת הזזה אופקית, בפרט  $x = k\pi$  נקודות המקסימום היחידות, ו- $x = 0.5 + \pi k$  נקודות המינימום היחידות. בפרט עבור  $k = 0$  נמצא  $x = 0, x = 0.5\pi$  נקודות מינימום ומקסימום בהתאמה, כלומר  $f(x)$  מונוטונית יורדת בתחום  $x \in [0, 0.5\pi]$ . משום  $f(0) = \sin 0 - 0 = 0$ , אזי  $f(x) \leq 0$  עבור  $x \in [0, 0.5\pi]$ . מכיוון שאין קיצון נוסף בתחום, נסיק  $f(x) < 0$  עבור  $x \in (0, 0.5\pi)$ . עבור  $x > 0.5\pi$ , נתון  $0.5\pi < x < 1.5\pi$ , כלומר גם כאן יתקיים אי-השוויון המבוקש. סה"כ הוכח אי-השוויון לכל  $x \in \mathbb{R}_+$ .

(b) נרצה להוכיח  $\cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$ .  $\forall x \in \mathbb{R}_+$ . נתבונן בפונקציה  $f(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$ , ונזכיר את אי-השוויון  $f(x) > 0$ . נגזור אותה, ונקבל  $f'(x) = -\sin x - x$ . נגזור שוב, ונקבל  $f''(x) = -\cos x - 1$ , שהיא פונקציה קטנה או שווה ל-0 בכל תחומה (מהגדרת הזזה). לכן,  $f'(x)$  מונוטונית יורדת בכל תחומה. יתקיים  $f'(0) = -\sin 0 - 0 = 0$ , כלומר לכל  $x > 0$  נדע  $f'(x) \leq 0$ . אזי, גם  $f(x)$  מונוטונית יורדת חזק, ובגלל ש- $f(0) = \cos 0 - 1 + \frac{0^2}{2} = 0$  אז סה"כ גם הפונקציה הזו תקיים  $f(x) < 0$  כדרוש.

(c) נרצה להוכיח  $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$ . נתבונן בפונקציה  $f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$ , ונזכיר את אי-השוויון  $f(x) < 0$ . נגזור ונקבל  $f'(x) = \cos x - 1 + 0.5x^2$ ,  $f''(x) = -\sin x + x$ ,  $f'''(x) = -\cos x + 1 < 0$ . ידוע שמתקיים  $f(0) = f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$ . כדרוש (מונוטוני יורד תחת ציר ה-0)  $f(x) < 0 \iff f'''(x) < 0$  (כלומר  $f'''(x) < 0$  מונוטונית יורדת מתחת ל-0, וכן  $f', f''$  ו- $f(x)$  כדרוש).

## 6

צ.ל.  $\forall x \geq -1, 0 \leq a \leq 1, (1+x)^a \leq 1+ax$ . יהיו  $x \geq -1, 0 \leq a \leq 1$ . נעביר אגפים ונמצא שקילות להוכחת הא"ש:  $f(x) := (1+x)^a - 1 - ax \leq 0$ . נגזור:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^a - 1 - ax & f(0) &= 1^a - 1 + a \cdot 0 = 0 \\ f'(x) &= a(1+x)^{a-1} - a & f'(0) &= a(1+0)^{a-1} - a = a - a = 0 \\ f''(x) &= \underbrace{(a^2 - a)}_{\leq 0} \underbrace{(1+x)}_{\geq 0} \leq 0 \end{aligned}$$

הסתמכנו שני אי-שוויונים בטענות לעיל. הראשון,  $x+1 \geq 0$ , שנגרר ישירות מכך ש- $x \geq -1$  (נוסיף 2 לשני האגפים). השני,  $g(a) = a^2 - a$ , נכון כי  $g'(a) = 2a - 1$  יהיה קטן ממש מ-0 לכל  $0 \leq a \leq 1$ , כלומר  $g(a)$  מונוטונית יורד החל מנקודת ההתחלה שלו  $g(0) = 0$ , אזי  $g(a) \leq 0$ . סה"כ הטענות לעיל אכן נכונות, תחת הנתונים. באופן דומה להסקות שהתבצעו בשאלה קודמת,  $f'' < 0$  ולכן  $f'$  מונוטונית יורד, ומשום ש- $f'(0) = 0$  אז  $f'(x) \leq 0$ , ובאופן דומה  $f(x) \leq 0$  גם כן (תחת אותם התנאים שניתנו), כדרוש.

עתה, נותר להוכיח שוויון אמ"מ  $a = 1 \vee x = -1$ . משקולים דומים, לכל  $x \leq -1$  נדע  $f'''(x) \geq 0$  וכך (באופן דומה להוכחת אי-השוויון לעיל) יגרר  $f(x)$  מונוטונית עולה באותו התחום, כלומר הקיצון היחיד הוא קיצון מקסימום כאשר  $x = -1$ , שם אכן יתקיים  $f(x) = 0$  (כלומר, שוויון). נדע, שהפונקציה תעלה/תרד חזק בכל תחום אחר כי היא לא קבועה, אלא אם  $a = 1$ , בעת הזו  $f(x) = (1+x)^1 - 1 - x \cdot 1 = 0$  (כלומר, שוויון גם במקרה הזה). סה"כ אלו המקרים היחידים בהם ייתכן שוויון.

שחר פרץ, 2024

אהבה כן סקסט תחתון