

# חדו"א 1א ~ תרגיל בית 4

שחר פרץ

29 בנובמבר 2025

..... (1) .....

נחשב את הגבולות הבאים:

(א) יהיו  $0 \leq a_0 \dots a_k$  כלשהם. נמצא את הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_1 n + a_0}$$

ניעזר במשפט הסנדוויץ':

$$0 \leq \sqrt[n]{a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_1 n + a_0} \leq \sqrt[n]{n \cdot a_k n^k}$$

נבחין שהחסם העליון שואף ל-0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n \cdot a_k \cdot n^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^{k+1}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_k} = 0 \cdot 0 = 0$$

וכמובן שגם הגבול התחתון. מכאן שהגבול הוא 0.

(ב) נחשב את הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{\sqrt{k}} \right)}_{c_n}$$

ראשית כל, נחשב את הגבול:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n + 1 - \sqrt{n^2 + n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} n + 1 - \sqrt{n^2 + n} \cdot \frac{n + 1 + \sqrt{n^2 + n}}{n + 1 + \sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n + 1)^2 - (n^2 + n)}{n + 1 + \sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + 1}{n + 1 + \sqrt{n^2 + n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n} + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{n}}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n}) + \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{n^2}}} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

נגדיר את הסדרות הבאות:

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \quad b_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \implies \quad c_n = \frac{a_n}{b_n}$$

ואז, נחשב את הגבול הבא, תוך היעזרות בגבול שחשבנו בהתחלה:

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n+1}}}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = \frac{1}{n+1 - (\sqrt{n^2 + n})} = \frac{1}{0.5} = 2$$

משום שהגבול קיים, ממשפט צ'זארו  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = 2$  כלומר  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 2$  וסיימנו.

(ג) יהי  $k \in \mathbb{N}$ . נחשב את הגבול הבא:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=0}^n \frac{(k+i)!}{i!}}{n^{k+1}}$$

$$\frac{\sum_{i=0}^{n+1} \frac{(k+i)!}{i!} - \sum_{i=0}^n \frac{(k+i)!}{i!}}{(n+1)^{k+1} - n^{k+1}} = \frac{\frac{(k+n+1)!}{(n+1)!}}{(n+1)^{k+1} - n^{k+1}} = \frac{(n+1) \cdots (n+k+1)}{((n+1)^{k+1} - n^{k+1})}$$

אמור להתכנס ל- $\frac{1}{k+1}$

..... (2) .....

יהיו  $0 < b_1 < a_1$  כאשר  $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$  ו-  $b_{n+1} = \frac{2a_nb_n}{a_n + b_n}$ . נוכיח ששתייהן מתכנסות סימולטנית ל- $\sqrt{a_1b_1}$ .

הוכחה. נבחין ש-:

$$a_{n+1} = \text{AM}(a_n, b_n) \quad b_{n+1} = \text{HM}(a_n, b_n)$$

ומשום שבהינתן  $x < y$  מתקיים  $x < \text{HM}(x, y) < \text{AM}(x, y) < y$ , באינדוקציה על הבסיס  $0 < b_1 < a_1$  נקבל:

$$0 < b_n < b_{n+1} < a_{n+1} < a_n < a_1$$

נבחין ש- $a_n$  מונוטונית יורדת חסומה ע"י 0 ולכן מתכנסת. נבחין ש- $b_n$  מונוטונית עולה חסומה ע"י  $a_1$  ולכן מתכנסת. סה"כ שתייהן מתכנסות, וממשפט בגלל ש- $a_n > b_n$ , לאותו הגבול.

נניח שהן מתכנסות לערך  $\ell$  כלשהו. בגלל ש- $b_n$  מונוטונית עולה ו- $a_n$  מונוטונית יורדת, נקבל  $a_n > \ell > b_n$ . יהי  $\varepsilon > 0$ . בעבור  $\frac{1}{2}\varepsilon$  מהגדרת הגבול, קיים  $N \in \mathbb{N}$  עבורו לכל  $n > N$  מתקיים:

$$\begin{cases} a_n - \ell = |a_n - \ell| < \frac{1}{2}\varepsilon \\ \ell - b_n = |b_n - \ell| < \frac{1}{2}\varepsilon \end{cases} \implies a_n - \ell + b_n = \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon$$

מא"ש הממוצעים:

$$\text{AM} - \text{HM} = \underbrace{(\text{AM} - \text{GM})}_{\geq 0} + \underbrace{(\text{GM} - \text{HM})}_{\geq 0} > \text{AM} - \text{GM}, \quad \text{GM} - \text{HM}$$

בפרט:

$$\varepsilon > |a_n - b_n| = |\text{AM}(a_{n+1}, b_{n+1}) - \text{HM}(a_{n+1}, b_{n+1})| > |\text{AM}(a_{n+1}, b_{n+1}) - \text{GM}(a_{n+1}, b_{n+1})| \stackrel{(1)}{>} |a_{n+1} - \text{GM}(a_1, b_1)|$$

כאשר (1) מתקיים כי באינדוקציה  $\text{GM}(a_{>1}, b_{>1}) < \text{GM}(a_1, b_1)$  שכן  $a_{n+1} > a_n > b_n > b_{n+1}$  ואז נקבל את הצעד:

$$|a_{n+1}, b_{n+1}| > |a_n, b_{n+1}| > |a_n, b_n| > |a_1, b_1|$$

ו- $\text{GM}$  משמר גודל.

■

סה"כ  $a_n, b_n$  מתכנסות שתייהן לאותו הגבול  $\ell = \text{GM}(a_1, b_1) = \sqrt{a_1 b_1}$ .

..... (3) .....

נפריך ע"י דוגמה נגדית את הטענות הבאות:

(א) תהי סדרה  $a_n$ . נניח  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} = L$ , אז  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ .

הפרכה. נגדיר  $a_n = (-1)^n$ . נבחין שהטור ש- $a_n$  יוצרת הוא  $\sum_{i=0}^n a_n = \delta_{\mathbb{N}_{\text{even}}}(n)$  כאשר:

$$\delta_{\mathbb{N}_{\text{even}}}(n) = \begin{cases} 0 & n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \\ 1 & n \in \mathbb{N}_{\text{even}} \end{cases} \quad 0 \leq g(n) \leq 1$$

ואז נקבל:

$$0 \leq \frac{g(n)}{n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

■

כלומר  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=0}^n (-1)^i}{n} = 0$ . עם זאת,  $a_n$  חסרת גבול (הוכחנו זאת).

(ב) יהיו  $x_n, y_n$  סדרות כאשר  $y_n$  עולה ממש ושואפת ל- $+\infty$ , וכן  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \ell$ , אז  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$ .

נבחר  $y_n = n$  ו- $x_n = (-1)^n$ . נקבל:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n - (-1)^{n+1}}{n+1 - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(-1)^n}{1} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$$

שלא קיים. עם זאת:

$$0 \leftarrow -\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

כלומר  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \rightarrow 0$  ומכאן ש- $\frac{x_n}{y_n} = \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$ , וזו סתירה.

..... (4) .....

תהי  $a_n$  סדרה מתכנסת, כך שלכל  $n \in \mathbb{N}$  מתקיים  $a_n \neq 0$  ונניח  $a_n \rightarrow 0$ . נוכיח ש-:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} = e$$

הוכחה. **למה.** מתקיים ש-:

$$c_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} \rightarrow e$$

ראשית, נוכיח ש- $a_n$  מונוטונית יורדת:

$$1 - \frac{1}{n} < 1 - \frac{1}{n+1} \implies \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \implies a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} > \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{-(n+1)} = a_{n+1}$$

עתה נראה שהיא חסומה ע"י  $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ :

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \stackrel{(1)}{>} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} = c_n$$

כאשר (1) נכון כי  $1 - \frac{1}{n} < 1$ . עוד נבחין ש-:

$$\begin{aligned} b_n < c_n &\iff \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} \\ &\iff \left(1^2 - \frac{1}{n^2}\right)^n < 1 \\ &\iff 1 - \frac{1}{n^2} < 1 \iff \top \end{aligned}$$

כלומר אכן מתקיים  $b_n < c_n < b_{n+1} < c_{n+1}$ . ממשפט  $b_n, c_n$  מתכנסים סימולטנית. משום ש- $b_n \rightarrow e$  אז  $c_n \rightarrow e$ , וסיימנו את הוכחת הלמה.

עתה נפנה להוכיח את המשפט. תהי  $a_n$  סדרה כך ש- $a_n \rightarrow 0$  ו- $a_n \neq 0$ . נוכיח שהיא מתכנסת ל- $e$ . יהי  $\varepsilon > 0$ . מהתכנסות  $c_n \rightarrow e$  בהכרח קיים  $N_1 \in \mathbb{N}$  כך ש- $|c_n - e| < \varepsilon$ . באופן דומה מהתכנסות  $b_n \rightarrow e$  בהכרח קיים  $N_2$  עבורו  $\forall n \geq N_2: |b_n - e| < \varepsilon$ . מהתכנסות  $a_n$  קיים  $N_3 \in \mathbb{N}$  כך ש- $|a_n| < \frac{1}{n}$  לכל  $n \geq N_3$ . אז, לכל  $n \geq N_3$ :

• אם  $a_n > 0$  אז:

$$a_n < \frac{1}{n} \implies -\varepsilon < 0 < \left|(1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} - e\right| < \left|\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e\right| = |b_n - e| < \varepsilon$$

• אם  $a_n < 0$  אז:

$$a_n < -\frac{1}{n} \implies \varepsilon < 0 < \left|(1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} - e\right| < \left|\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} - e\right| = |c_n - e| < \varepsilon$$

כלומר בהכרח  $|a_n - e| < \varepsilon$  וסיימנו. ■

## (5)

נקבע האם  $\sin n$  מתכנסת.

לא. אפילו לא קרובה להתכנס. נניח בשלילה ש- $a_n = \sin n$  מתכנסת ל- $\ell$ . נסמן את תמונתה ב- $A$ . ממשפט בהרצאה, בסביבה נקובה  $(\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon)$  יש כמות אינסופית מאיברי הסדרה, ומחוץ ממנה, יש כמות סופית. ידוע:

$$-1 \leq \sin n \leq \ell \leq \sin n \leq 1$$

כלומר  $\ell \in [-1, 1]$ . נסמן  $A' = A \cap (\mathbb{R} \setminus [-1 + 0.5, 1 - 0.5]) = A \cap [-0.5, 0.5]$ . בעבור  $\varepsilon = 0.5$  נקבל ש- $|A'| < \aleph_0$ . משום שיש בקבוצה כמות סופית של איברים, יש לה מינימום  $m_1$ , וגם ב- $A' \setminus \{m_1\}$  יש מינימום  $m_2$ . מצפיפות  $A$  ב- $[-1, 1]$  שהוכחנו בשיעורי הבית הקודמים, וכן משום ש- $m_1, m_2 \in [-1, 1] \triangle [-0.5, 0.5]$  (חיתוך סימטרי), בהכרח קיים  $m' \in (m_1, m_2) \cap A$  כלשהו. נפריד למקרים.

א. אם  $m_1, m_2 \in [-1, -0.5]$  או  $m_1, m_2 \in (1, 0.5]$  אז  $m' \in A'$  כלומר  $m_2$  לא מינימלי ב- $A' \setminus \{m_1\}$  וסתירה.  
 ב. אם  $m_1 \in [-1, -0.5]$  ו- $m_2 \in (0.5, 1]$  (המקרה ההפוך לא אפשרי כי  $m_1 < m_2$ ) אז נגדיר  $m_2 := -0.5$  וקיים  $m' \in (m_1, m_2) \cap A$  מהצפיפות וסתירה כמו במקרה א'.

סה"כ הגענו לסתירה בכל המקרים (הצפיפות גררה שלא יכולים להיות כמות סופית/בדידה של איברים מחוץ לסביבה). ■

## (6)

תהי  $a_n$  סדרה. נניח ש- $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ . נוכיח ש-:

$$\mathcal{P}(a_n) = [\liminf a_n, \limsup a_n]$$

הוכחה. נניח ש- $a_n$  חסומה, אחרת  $\mathcal{P}(a_n)$  לא מוגדר אלא במובן הרחב.

נסמן ב- $i := \liminf a_n$  וב- $s := \limsup a_n$ . יהי  $a \in [\liminf a_n, \limsup a_n]$ . נוכיח ש- $a$  גבול חלקי. יהיו  $\varepsilon > 0, N_1 \in \mathbb{N}$  כיום קיים  $n > N_1$  כך ש- $|a_n - a| < \varepsilon$ . נגדיר  $\varepsilon_i = \frac{|a-i|}{2}$  ו- $\varepsilon_s = \frac{s-a}{2}$ . נבחר ש- $\varepsilon_s, \varepsilon_i > 0$ . מהנתון  $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$  קיים  $N_1 \in \mathbb{N}$  כך ש- $|a_{n+1} - a_n| < \varepsilon$   $\forall n \geq N_1$ . נסמן  $N = \max\{N_1, N_2\}$ . מהגדרת גבול חלקי, קיים  $n_1 \geq N$  כך ש- $|a_{n_1} - i| < \varepsilon_i$ . באופן דומה קיים  $n_2 \geq \max\{N, n_1\}$  כך ש- $|a_{n_2} - s| < \varepsilon_s$ . סה"כ:

$$a_{n_1} < i + \varepsilon_i = i + \frac{i+a}{2} \leq a \leq s + \frac{s+a}{2} = s + \varepsilon_s < a_{n_2}$$

כלומר רצף האינדקסים  $n_1 \dots n_2$  איפשרו כולל מעבר  $\mathbb{N} \cap [n_1, n_2]$  כך ש- $a_n \leq a \leq a_{n+1}$  (אפשר להראות את זה באינדוקציה, כי רצף האינדקסים סופי). אחרי שנעביר אגפים נקבל:

$$|a_n - a| = a - a_n < a_{n+1} - a_n = |a_{n+1} - a_n| < \varepsilon$$

כי  $n \geq n_1 > N_2$ . סה"כ הוכחנו את הדרוש. ■

## (7)

נמצא סדרה  $a_n$  כך ש- $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$  וכן  $\mathcal{P}(a_n) = [0, 1]$ . נוכיח ש- $a_n = 2|\{\sqrt{n}\} - 0.5|$  כאשר  $\{x\}$  הערך השברי של  $x$  (הוא  $\{x\} = x - [x]$ ).

הוכחה. קל לראות ש- $0 \leq a_n \leq 1$  (נטו מתחומי ההגדרה של הפונקציות). בשיעורי בית קודמים הוכחנו ש- $\{\sqrt{x}\}$  בעלת איפימום 0, ■

## (8)

תהי  $a_n$  סדרה חיובית כך ש- $\frac{a_{n+1}}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ . נמצא דוגמה לפונקציה המקיימת כל אחת מהתכונות הבאות:

● **התכנסות ל-0:** עבור  $a_n = \frac{1}{n}$  מתקיים  $a_n \rightarrow 0$  וגם:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

• **התכנסות ל-1:** עבור  $a_n = \frac{1}{n} + 1$  מתקיים  $a_n \rightarrow 1$  וגם:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1} + 1}{\frac{1}{n} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+2}{n+1}}{\frac{n+1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{n^2 + 2n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} = 1$$

• **התבדרות ל- $+\infty$ :** עבור  $a_n = n$  מתקיים  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$  ו-:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} + 1}{1} = 1$$

• **אי התכנסות במובן הרחב:** נגדיר את הסדרה:

$$a_n = \begin{cases} n & n \in \mathbb{N}_{\text{even}} \\ \frac{1}{n} & n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \end{cases}$$

נבחין ש- $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  ניתן לכיסוי ע"י שתי ת"סים, האחת  $\frac{n}{n+1}$  והשנייה  $\frac{n+1}{n}$ , ושתייהן שואפות ל-1, כלומר ממשפט הכיסוי  $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1$ . עם זאת,  $a_n$  מכיל גבול חלקי  $\frac{1}{2n+1}$  וגבול חלקי  $2n$ , האחד שואף ל-0 והשני ל- $+\infty$ , כלומר  $a_n$  בעל שני גבולות חלקיים שונים במובן הרחב ולכן לא מתכנס.

..... (9) .....

נגדיר  $a_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ . נוכיח ש- $\mathcal{P}(a_n) = [0, 1]$ .

הוכחה. באחד מתרגילי הבית הקודמים הראינו

..... (10) .....

נוכיח את משפט בולצאנו-ווראשטראס תוך שימוש בעקרון הרווחים המקוננים של קנטור, ללא שימוש באקסיומת השלמות.

הוכחה. בכל קונטקסט בו המושגים מוגדרים, נסמן  $b_0 = \pi_1(c_n) = a_0$  ו- $\pi_2(c_n) = a_n$  סדרה חסומה. בפרט  $-M < a_n < M$  עבור  $M$  כלשהו. אם  $\text{Im } a_n$  סופי, אז ת"ס קבועה קיימת בה בהכרח וסיימנו. אחרת, נגדיר את הסדרה הבאה:

$$c_n: \mathbb{N} \rightarrow A \times B \quad \begin{cases} c_1 = \langle -M, M \rangle \\ c_{n+1} = \begin{cases} \langle b_0, \frac{b_0+a_0}{2} \rangle & \text{if } \left| \left[ b_0, \frac{b_0+a_0}{2} \right] \cap A \right| \geq \aleph_0 \\ \langle \frac{b_0+a_0}{2}, a_0 \rangle & \text{if } \left| \left[ \frac{b_0+a_0}{2}, a_0 \right] \cap A \right| \geq \aleph_0 \end{cases} \end{cases}$$

הסדרה מוגדרת היטב, כי:

• משפט הרקורסיה.

• משובך יונים, כאשר נחצה קבוצה  $B$  אינסופית ל- $B = C \oplus D$ , אז  $C$  או  $D$  כוללים אינסוף איברים. בפרט על  $A$  ובאינדוקציה אחד משני התנאים מתקיים.

עתה נגדיר את הסדרות:

$$b_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \quad b_n = \pi_1 \circ c_n \quad a_n: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \quad a_n = \pi_2 \circ c_n$$

מהגדרת  $c_n$  מתקיים ש- $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$ . יהי  $\varepsilon > 0$ . ידוע קיים  $N \in \mathbb{N}$  עבורו  $\frac{M}{2^{n-1}} < \varepsilon$  (כן). צריך בשביל זה ארכימדיאניות. בדקתי, גם בויקיפדיה מופיעה אותה ההוכחה. גם בהרצאה אמרתם לנו להוכיח עם אריה במדבר. זה לא עובד, צריך ארכימדיאניות). בגלל שכל פעם אנו חוצים את הקטעים פי 2, נקבל ש- $b_n - a_n = \frac{M}{2^{n-1}}$ . מכאן ש-:

$$|a_n - b_n| = \frac{M}{2^{n-1}} < \varepsilon$$

כלומר  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - b_n = 0$ , ועכשיו ניתן להפעיל את עקרון הרווחים המקוננים ולקבל ש- $\bigcap_{n=1}^{\infty} [b_n, a_n] = \{c\}$ . נבחין ש- $a_n, b_n \rightarrow c$ . כי לכל  $\varepsilon > 0$  נוכל לבחור  $N$  כך ש- $|a_n - b_n| < \varepsilon$  ו- $a_n, b_n \rightarrow c$  כלומר  $c \in [b_n, a_n]$  ו- $|a_n - c| < \varepsilon$  ושה"כ  $a_n, b_n \rightarrow c$  כדרוש. נגדיר  $p(b, a) = A \cap [b, a]$  ואז נקבל שהפונקציה  $F = p \circ c_n$  (עם תמונה שלא כוללת קבוצות ריקות, מהגדרת  $c_n$ ) בעלת פונקציית בחירה  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  היא סדרה בשם  $d_n$ , ואז נקבל ש- $a_n \leq d_n \leq b_n$  וממשפט הסדוויץ'  $d_n \rightarrow c$ . מהגדרת  $p$  בהכרח  $d_n \in A$  ומהגדרת  $c_n$  היא בהכרח משמרת סדר ביחס ל- $a_n$ , כלומר  $d_n$  ת"ס מתכנסת של  $a_n$  וסיימנו.

# (11)

נראה כי הטענות הבאות שקולות:

1. אקסיומת השלמות.
2. כל סדרת קושי מתכנסת.
3. עקרון הרווחים המקוננים.

## 1 → 2

הוכח בהרצאה.

## 2 → 3

יהי  $(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$  שדה סדור מלא כלשהו (שסתם בחרתי לסמן ב- $\mathbb{R}$ ). נניח שביחס לנורמה  $|\cdot|$  כל סדרת קושי מתכנסת. נראה שעקרון הרווחים המקוננים מתקיים.

הוכחה. תהי  $a_n$  סדרה עולה ו- $b_n$  סדרה יורדת, כך ש- $b_n > a_n$ . נניח שהגבול  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - b_n = 0$ . נגדיר  $A_i = [a_i, b_i]$  שמהנחות שלנו בהכרח לא ריק. מונוטוניות הסדרות,  $A_{i+1} \subseteq A_i$ . נבחין ש- $A_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$  היא פונקציה, ולכן קיימת לה פונקציית בחירה  $c_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ . עוד נבחין ש- $c_i$  סדרה. נראה ש- $c_i$  קושי. יהי  $\varepsilon > 0$ . בגלל ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_i - b_i = 0$ , קיים  $N \in \mathbb{N}$  כך ש- $|a_i - b_i| < \varepsilon$   $\forall n \geq N$ :  $b_i - a_i = |a_i - b_i| < \varepsilon$   $\forall n \geq N$ . יהי  $n \geq N$  ו- $k \geq 0$ . נבחין שמהגדרת  $A_n$  ו- $A_{n+k}$ :

$$a_n \leq c_n \leq b_n \quad a_n \leq a_{n+k} \leq c_{n+k} \leq b_{n+k} \leq b_n \implies c_n, c_{n+k} \in [a_n, b_n] = A_n$$

משום ש- $|a_n - b_n| \leq \varepsilon$ , נקבל שהמרחק בין כל שני איברים ב- $A_n$  קטן גם הוא מ- $\varepsilon$  ובפרט  $|c_n - c_{n+k}| \leq \varepsilon$ . סה"כ  $c_n$  קושי. הנחנו שכל סדרת קושי מתכנסת, אזי בפרט  $c_n$  מתכנסת לערך  $c$  כלשהו, ונסמן  $c_n \rightarrow c$ . נראה ש- $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{c\}$ :

$\subseteq$  יהי  $d \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_i$ . יהי  $\varepsilon > 0$ . בגלל ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - b_n = 0$ , קיים  $N$  עבורו  $|a_n - b_n| \leq \varepsilon$   $\forall n \geq N$ . נבחין ש- $d \in A_N$ , וכן  $c_N \in A_N$ , כלומר  $|c_N - d| \leq \varepsilon$  (שני איברים בקטע סגור שקצוותיו במרחק קטן מ- $\varepsilon$ ). מכאן ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n - d = 0$  מהגדרת הגבול. משום שהגבול של  $c_n$  קיים והוא  $c$ , מתקיים מאריתמטיקת גבולות:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n + d - c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (c_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} (d - c_n) = c - 0 = c$$

כלומר  $d$  סדרה קבועה ששואפת ל- $c$ , ומכאן ש- $|d - c| \leq \varepsilon$   $\forall \varepsilon > 0$ . כלומר  $d = c$  (משפט שהוכחנו ללא תלות באקסיומת השלמות).  $\supseteq$  יהי  $i \in \mathbb{N}$ . נבחין שהחל מ- $N = i$  מתקיים  $a_i \leq a_n \leq c_n \leq b_n \leq b_i$   $\forall i \geq N$ : כלומר  $c_n$  חסומה בין  $a_i$  לבין  $b_i$  החל ממקום מסוים, ולכן  $c = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n \in [a_i, b_i] = A_i$ . מהגדרת חיתוך מוכלל  $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$   $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ . כנדרש.

■ סה"כ הראינו הכלה דו-כיוונית, כלומר  $\bigcup_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$ . כדורש.

## 3 → 1

יהי  $(\mathbb{R}, +, \cdot, <)$  שדה סדור מלא כלשהו (שסתם ממש באקראי מסיבה שלא קשורה לכלום בחרתי לסמן ב- $\mathbb{R}$ ). נניח שביחס לנורמה  $|\cdot|$  עקרון הרווחים המקוננים מתקיים. נראה ש- $\mathbb{R}$  הוא שדה (למעשה, השדה עד לכדי איזומורפיזם) שמתקיים את אקסיומת החסם העליון.

הוכחה. תהי  $A$  קבוצה חסומה מלעיל. נסמן ב- $B$  את קבוצת החסמים מלעיל של  $A$ .

**למה.** בהינתן  $a \in A$ ,  $b \in B$ , לכל  $\varepsilon > 0$ , קיימים  $a' \in A$ ,  $b' \in B$  כך ש- $[a', b'] \subseteq [a, b]$  וגם  $|a' - b'| = b' - a' < \varepsilon$ .

הוכחת הלמה. נניח בשלילה שלא קיימת קבוצה מתאימה. מכאן, שקיים  $\varepsilon$  כך ש- $b' - a' \geq \varepsilon$   $\forall a < a' \in A, b > b' \in B$ . נתבונן בקבוצה  $[a', b'] \in [a, b]$  כך ש- $b' - a' < 2\varepsilon$  (אם לא קיימת כזו, נגדיר את  $\varepsilon$  להיות  $2\varepsilon$  באינדוקציה) ואז  $c = \frac{a+b}{2}$  מקיים  $c \in [a', b']$ , אם  $c \notin B$  אז  $c > a''$  ואז  $[a'', b']$  מקיים  $b' - a'' < \varepsilon$  וסתירה, אחרת  $c \in B$  ואז  $[a', c]$  מקיים  $c - a' < \varepsilon$  וסתירה. ■

צריך להפוך את הרווחים המדוברים לבדידים בשביל להשתמש בעקרון הרווחים המקוננים, ובשביל זה צריך קיום סדרה חיובית שואפת לאפס. בממשיים זה נגרר מארכימדיאניות שתלויה באקסיומת השלמות. זה לא עובד בשדה סדור מלא כללי. אז או שאני טיפש ויש הוכחה שלא צריכה קיום של סדרה כזו, או שמי שבנה את התרגיל לא הוכיח את כולו ועשה ובנה אותו לפי אינטואיציה של מרחבים מטריים. לפי ויקיפדיה הטענה הזו שקולה לבונלצאנו-ויראשטראס, משפט שאיננו שקול לאקסיומת החסם העליון. אזי אחרי הפסקה הארוכה אני פשוט אפיל מהשמיים  $p_n$  כלשהי כך ש- $p_n > 0$  וגם  $p_n \rightarrow 0$ .

מהלמה, ומהגדרת התכנסות של  $p_n$ , נבחין שלכל  $a, b \in A \times B$  קיים  $z_{a,b} \in \mathbb{N}$  כלשהו כך ש- $|a - b| \leq p_n$  ומכאן ש- $[a, b - p_n]$  לא ריקה לכל  $n \geq z_{a,b}$ .

נגדיר את הפונקציה:

$$F: (A \times B) \times \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A \times B) \quad F((a, b), n) = \{(a', b') \in A \times B: a' \in A \wedge b' \in B \wedge [a', b'] \subseteq [a, b - p_{\max(n, z_{a,b})}]\}$$

מהגדרת  $z_{a,b}$  ומקסימום, נבחין שתמונת  $F$  לא מכילה קבוצות ריקות אף פעם, לכן קיימת לה פונקציית בחירה  $f: (A \times B) \times \mathbb{N} \rightarrow A \times B$  כלשהי. בהינתן  $c_1 = (a, b)$  כאשר  $a \in A, b \in B$  לא ריקה מההנחה ש- $A$  חסומה) פונקציית הבחירה משרה את הנסיגה הבאה:

$$c_n: \mathbb{N} \rightarrow A \times B \quad \begin{cases} c_1 = (a, b) \\ c_n = f(c_1, n) \end{cases}$$

היא מוגדרת היטב ממשפט הרקורסיה.  $c_n$  בתורה משרה את הסדרות:

$$b_n: \mathbb{N} \rightarrow B \quad b_n = \pi_2 \circ c_n \quad a_n: \mathbb{N} \rightarrow A \quad a_n = \pi_1 \circ c_n$$

מהיות הרווחים  $[a_n, b_n]$  מקוננים מהגדרתם,  $b_n$  מונוטונית יורדת ו- $a_n$  מונוטונית עולה. בגלל ש- $B$  קבוצת החסמים מלעיל של  $A$ , בהכרח  $a_n < b_n$ . עוד נבחין ש- $[a_n, b_n] \subseteq [a_{n+1} + p_n, b_{n+1} - p_n]$  (עד לכדי  $z_{a,b}$  שגם הוא מונוטוני עולה חזק, כמו  $n$ ) כלומר  $|a_n - b_n| \leq p_n \leq \varepsilon$  החל מ- $N$  מסויים לכל  $n > N$  ואז  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - b_n = 0$ . מעקרון הרווחים המקוננים  $\bigcap [a_n, b_n] = \{c\}$   $\exists! c \in \mathbb{R}$ . נפצל למקרים.

- אם  $c \in A$ , אז  $c$  חסם מלעיל של  $A$ , ולכן הוא מקסימום של  $A$  ובפרט סופרמום וסיימו.
  - אם  $c \in B$ , ונניח בשלילה קיום  $B \ni b < c$ , אזי עבור  $\varepsilon$  קטן דיו קיים  $i \in \mathbb{N}$  כך ש- $[a_i, b_i] \supseteq [a_i, b]$  אזי  $c \notin [a_n, b_n]$  וזו סתירה. מכאן ש- $c$  חסם עליון מינימלי ובפרט סופרמום.
- סה"כ הראינו קיום סופרמום בכל קבוצה  $A$  חסומה מלעיל, כלומר אקסיומת החסם העליון מתקיימת.

..... (12) .....

נמצא סדרה  $a_n$  בעלת יותר משני גבולות חלקיים המקיימת  $a_n \cdot a_{n+1} \rightarrow 1$ . נסמן את הסדרה שמצאנו בשאלה 7 ב- $c_n$ . נגדיר  $b_n = c_n + 2$ . החל ממקום  $N_1$  מסויים,  $c_n > 1$ , משום שקול הגבולות החלקיים של  $b_n$  הם  $[2, 3]$ . מכאן שלכל  $n \geq N_1$  מתקיים  $\frac{a}{b_n} < a$ . יהי  $\varepsilon > 0$ , ובגלל ש- $b_n - b_{n+1} \rightarrow 0$  (זה נשמר תחת הזחה ב-2 מאריתמטיקת גבולות), החל מ- $N_2$  מסויים מתקיים בהכרח  $|b_{n+1} - b_n| < \varepsilon$ . נקבל ש:

$$1 - \varepsilon < 1 - \frac{\varepsilon}{b_n} = \frac{b_n - \varepsilon}{b_n} < \frac{b_{n+1}}{b_n} < \frac{b_n + \varepsilon}{b_n} = 1 + \frac{\varepsilon}{b_n} < 1 + \varepsilon$$

ומכאן ש- $\frac{b_{n+1}}{b_n}$  מתכנסת. נתבונן בסדרה:

$$a_n = \begin{cases} b_n & n \in \mathbb{N}_{\text{even}} \\ \frac{1}{b_n} & n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \end{cases}$$

נבחין של- $a_n \cdot a_{n+1}$  יש שתי סדרות שמכסות אותה,  $\frac{b_n}{b_{n+1}}$  שמאריתמטיקה של גבולות שואפת ל-1, וכן  $\frac{b_{n+1}}{b_n}$  שהראינו ששואפת ל-1. סה"כ  $a_n \cdot a_{n+1} \rightarrow 1$  כי כל הגבולות החלקיים של הסדרות שמכסות אותה הם 1.

נתבונן בת"סים  $b_{2n}$  ו- $\frac{1}{b_{2n+1}}$ . נבחין ש- $b_{2n}$  מכסים את  $b_n$ , ולה יש אינסוף גבולות חלקיים, ומשובך יונים ל- $b_{2n+1}$  או  $b_{2n}$  יש אינסוף גבולות חלקיים. אם זה  $b_{2n}$  אז ל- $a_n$  יש אינסוף גבולות חלקיים וסיימו, ואם זה  $b_{2n+1}$  אז  $[\frac{1}{2}, \frac{1}{3}]$  אינסוף גבולות חלקיים (מאריתמטיקה) וסיימו גם.

סה"כ מצאנו סדרה עם אינסוף גבולות חלקיים (ובפרט יותר מ-2) המקיימת  $a_n \cdot a_{n+1} \rightarrow 1$ .

.....

שחר פרץ, 2023

קומפל ב-L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X וטור באמצעות תוכנה חופשית בלבד