

ליניאריות 8

שחר פרץ

16 בינואר 2025

..... (1)

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצות. נתבונן ב-:

$$C = \begin{pmatrix} A & A \\ A & B \end{pmatrix}_{2n \times 2n}$$

צ. $\text{rank } C \leq 2 \text{rank } A + \text{rank } B$.

הוכחה. ידוע קיום \tilde{A}, \tilde{B} . ממשפט, לכל מטריצה P קיימת צורה מדורגת קאנונית, נסמנה \tilde{P} , וממשפט ידוע $\text{rank } \tilde{P} = \text{rank } P$. נסמן ב- $\text{Col } P$ את מרחב העמודות של P וב- $\text{Row } P$ את מרחב שורותיה. אם P ריבועית, אז ממשפט $\text{Row } P = \text{Col } P = \text{rank } P$.

למה 1. תהי $P = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ מטריצה, כאשר X, Y ריבועיות. אז $\tilde{P} = \begin{pmatrix} \tilde{X} \\ \tilde{Y} \end{pmatrix}$ מקיים

$$\dim \text{Row } P = \dim \text{Row } \tilde{P} = \dim \text{Row } \tilde{P} \leq \text{rank } X + \text{rank } Y$$

נתבונן ב- \tilde{P} . אז כמות שורות שאינן אפסים ב- \tilde{P} היא $\text{rank } \tilde{X} + \text{rank } \tilde{Y} = \text{rank } X + \text{rank } Y$ משום שבצורה מדורגת של מטריצה הדרגה כי כמות השורות שאינן אפסים, ממשפט. מכיוון שבדירוג X, Y בנפרד, למעשה דירגנו את שורותיהם בלבד, ושורותיהם שורות P , ומשום שדירוג הוא הכפלה בהרכבת פעולות אלמנטריות בלבד ממשפט, אז הכפלה בהרכבת שרשור הפעולות האלמנטריות על X, Y (חוקי כי כל אחד בשורות אחרות ולכן הפעולות זרות, והסדר לא משנה), כלומר $\tilde{P} \sim P$. ממשפט, $\text{Row } \tilde{P} = \text{Row } P$, וכמות הוקטורים (שאינם אפסים, שהם ת"ל בינם לבין עצמם) חסם עליון לגודל מ", כלומר $\dim \text{Row } \tilde{P} \leq \text{rank } X + \text{rank } Y$. מטריציביות נקבל את הדרוש.

נתבונן ב- $D = (A, B)$. ניכר כי $D^T = \begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix}$. כמו כן ידוע $\text{Col } A = \text{Row } A = \text{Col } A^T = \text{rank } A$ ובאופן זה בעבור B , ולכן $\text{rank } A^T = \text{rank } A$ וכן על B . מטענות שהוצגו $\text{rank } \tilde{A}^T = \text{rank } A$ וכן"ל בעבור B . נתבונן ב- $\tilde{D} = \begin{pmatrix} \tilde{A}^T \\ \tilde{B}^T \end{pmatrix}$. מלמה 1 ומטריציביות, $\dim \text{Row } \tilde{D} \geq \text{rank } A + \text{rank } B$.

נתבונן ב- $E = (A, A)$. ניכר כי $E^T = \begin{pmatrix} A^T \\ A^T \end{pmatrix}$. אז באופן דומה לנעשה על D , $\text{rank } A = \text{rank } A^T$. מלמה 1 נקבל $\dim \text{Row } E^T = \dim \text{Row } \tilde{E}^T = \dim \tilde{E}^T$ וסה"כ ולכן שורותיהם תלויות ליניארית, וסה"כ $\tilde{A}^T \sim \tilde{A}^T$ אז $\tilde{A}^T = \tilde{A}^T$ בגלל ש- $\tilde{A}^T = \tilde{A}^T$ כאשר $\tilde{E} = \begin{pmatrix} \tilde{A}^T \\ \tilde{A}^T \end{pmatrix}$. $\text{rank } A$.

סה"כ קיבלנו $\dim \text{Col } A \geq \text{rank } A + \text{rank } B \wedge \dim \text{Col } E = \text{rank } A$. נסמן $C_1 = (A, A), C_2 = (A, B)$. אז $C = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$. [...]. צריך לקשר בין Row ל- Col למרות שאני לא במטריצה ריבועית.

באופן דומה ללמה 1, נקבל ש-:

$$\dim \text{Row } C \leq \dim \text{Col } C_1 + \dim \text{Col } C_2 \leq \text{rank } A + \text{rank } B + \text{rank } A = 2 \text{rank } A + \text{rank } B \quad \square$$

■

..... (2)

נגדיר:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

א) נחשב את דרגת המטריצה $A = v_1 v_1^T + v_2 v_2^T + v_3 v_3^T$. ראשית כל, נוכיח שהוקטורים בת"לים. נעשה זאת ע"י דירוגם בשורות.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

מדורג עם 3 איברים פותחים ולכן פורש מרחב ממימד 3, וישנם 3 וקטורים שפרשו את המרחב ולכן הם בסיס ובפרט בת"ל.

אזי, מסעיף ב', שהוכח באופן בלתי תלוי מסעיף א', נקבל ש- $\text{rank } A = 3$.

(ב) תהי $(v_1 \dots v_k)$ בת"ל. נמצא את דרגת $v_1 v_1^T + \dots + v_k v_k^T$.

הוכחה. **למה 1.** לכל וקטור v , ולכל שורה R ב- vv^T , יתקיים $R = av$ $\exists a \in \mathbb{F}$. יהי v וקטור מאורך n , ו- $A = vv^T$. אז:

$$(A)_{ij} = (vv^T)_{ij} = \sum_{j=1}^n v_{ij} v_{ji} = v_i \cdot v_j \implies (a_{ij})_{j=0}^n = (v_i \cdot v_j)_{j=0}^n = v_i \cdot (v_j)_0^n = v_i v$$

סה"כ בעבור כל שורה ב- A יתקיים קיום $a \in v_i$ כך $a v = \text{Col}$, כדורש.

תהי $(v_1 \dots v_k) \in \mathbb{R}^k$ סדרה בת"ל. נסמן $A_k := v_k v_k^T$. נתבונן במטריצה $A_k := \sum_{i=1}^k A_k$. נסמן ב- B_i את השורה ה- i במטריצה הכללית B .

$$\exists (a_i)_{i=1}^k : (\Sigma)_i = \sum_{i=1}^k (A_k)_i = \sum_{i=1}^k a_i v_k$$

כאשר טענה הקיום נובעת מלמה 1 (באינדוקציה). מצאנו קומבינציה ליניארית של (v_i) , היא (a_i) לכל שורות Σ . הקומבינציה הליניארית הזו יחידה משום ש- (v_i) בת"ל, ואם אינה הייתה יחידה, היו בפריסה של (v_i) שני וקטורים עם ייצוג זהה, אך (v_i) בת"ל ופורש את המרחב שהוא עצמו פורש ולכן בסיס, וייצוג איברים מתוך בסיס איזו, ובפרט חח"ע – סתירה.

בגלל שהוקטורים במרחב השורות של Σ ניתנים לייצוג כקומבינציה ליניארית של שורות Σ מהגדרת span , ואלו מוגדרות באופן יחיד מ- (v_i) , אז הם ניתנים לייצוג באופן יחיד ע"י וקטורים ב- (v_i) . סה"כ, (v_i) בסיס לפי הגדרה למרחב השורות של Σ , שממדו זהה למימד $\text{rank } \Sigma$ לפי הגדרה. בגלל ש- $\Sigma = v_1 v_1^T + \dots + v_k v_k^T$ וגם $|(v_i)| = k$, אז דרגת המטריצה היא k , כדורש. ■

$$\dots \dots \dots (3) \dots \dots \dots$$

$\text{rank } A = r$ כך ש- $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$.

(א) צ.ל. קיום $B_1 \dots B_r \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $\text{rank } B_i = 1$ $\forall 1 \leq i \leq r$: $A = \sum B_i$.

הוכחה. תהי $A \in M_{m \times n}$ מטריצה, ונסמן $\text{rank } A = r$. נסמן את קבוצת וקטורי העמודה ב- A $\text{Col } A$. אז מרחב העמודות $\text{span Col } A$ נפרש ע"י $\text{Col } A$. משום ש- $\text{rank } A = r$, $\dim \text{span Col } A = r$, ובגלל של- A יש n עמודות (כלומר $|\text{Col } A| = n$) אז ממשפט ישנו בסיס בגודל r . ממשפט לכל $n \geq i > r$, אם לא קיימים r וקטורים בת"ל ב- $\text{Col } A$ אז נפרש מרחב מגודל קטן ממש r על ידי הבסיס, ושאר הוקטורים ת"ל ולא משנים ממד, כלומר ישנם r וקטורים ב- $\text{Col } A$ בסיס של $\text{span Col } A$, נסמנם B . נסמן גם $\bar{B} = \text{Col} \setminus B$.

משום ש- $|\text{Col } A| = r$ אז קיימת פונ' חח"ע ועל $R_i: [r] \rightarrow \text{Col } A$ מהגדרת עוצמה. עבור ההופכית לה $f(x)$ נסמן $v_i = f(v) \in [r]$. בה"כ הסדר R_i זהה לסדר השורות המטריצה, משמאל לימין. אז, לכל $v \in \bar{B}$, אז $v \in \text{Col } A$ ולכן ניתן לביטוי כקומבינציה ליניארית עם קבועים שנסמן (λ_j^i) (עבור j כך ש- $R_j \in B$). זאת כי:

$$\begin{aligned} \exists (\tilde{\lambda}_i)_{i=0}^{r+1}: 0 &= \tilde{\lambda}_1 B_1 + \dots + \tilde{\lambda}_r B_r + \lambda_{r+1} v \\ -\lambda_{r+1} v &= \exists (\tilde{\lambda}_i)_{i=0}^{r+1}: \tilde{\lambda}_1 B_1 + \dots + \tilde{\lambda}_r B_r \\ v &= -\frac{\lambda_1}{\lambda_{r+1}} B_1 - \dots - \frac{\lambda_r}{\lambda_{r+1}} B_r \\ &= \lambda_1 B_1 + \dots + \lambda_r B_r \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} -\tilde{\lambda}_{r+1} v \\ \cdot \frac{-1}{\tilde{\lambda}_{r+1}} \end{array}$$

קיים זיווג בין $[r]$ לבין $\{i \in [n]: R_i \in B\}$ כי יש r וקטורים ב- B , נסמנו $f(i)$. בעבור M מט', נסמן ב- M_i את הטור ה- i ב- M . נבחין שתחת ההגדרה הזו $R_i = A_i$. נתבונן בקבוצת המטריצות הבאה:

$$(P_i)_j = \begin{cases} R_{f(i)} & f(i) = j \\ \lambda_{f(i)}^j R_{f(i)} & R_j \in \bar{B} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

נוכיח ש- $\sum P_i = A$ $\forall i \in [r]$: $\text{rank } P = 1$.

• **דרגה.** נוכיח ש- $\text{rank } P_i = 1$. ידוע ש- $\text{rank } B = \dim \text{span Col } P_i$ (הדרגה היא ממד מרחב העמודות). נבחין ש- $\text{Col } B$ הוא פרישה של וקטורים שהם אחד מההבאים:

- וקטור ה- 0 , שת"ל ב- $R_{f(i)}$.

- הוקטור $R_{f(i)}$, שתלוי ליניארית בעצמו.

- וקטור כלשהו $\lambda R_{f(i)}$, שבעבור הקבוע $-\frac{1}{\lambda}$ סכמו עם $R_{f(i)}$ יהיה 0 כלומר הוא ת"ל ב- $R_{f(i)}$.

סה"כ כל הוקטורים שפורשים את המ"ו ת"ל בוקטור שאינו 0 (ובפרט גודל המרחב אינו 0), ולכן גודל המרחב לכל היותר 1 , וסה"כ גודל המ"ו $\text{Col } B$ הוא 1 , כלומר $\text{rank } P = 1$ כדורש.

• **סכום.** נוכיח ש- $\sum P_i = A$. נוכיח שוויון עמודות. נפלג למקרים בעבור העמודה j ב- A .

- נניח $j \in \{i \in [n] : R_i \in B\} = \text{Im } f$. אז עבור כל מטרצה P_i , אם $f(i) = j$, אז מהיות f זיווג, i האינדקס של P הוא גם קיים וגם היחיד שיקיים תכונה זו. כמו כן, $j \notin B$ ולכן בשאר המטרצות עמודה זו תהיה 0. סה"כ קיבלנו $0 + \dots + R_{f(i)} + \dots + 0 = R_j = A_j$. כדרוש.

- אחרת, $j \notin \text{Im } f$. לכן בהכרח $R_j \in \overline{B}$ מהגדרת תמונת f . אז:

$$\Sigma = \sum_{i=1}^r \lambda_{f(i)}^j R_{f(i)} \stackrel{(1)}{=} \sum_{i=1}^r \lambda_{f(i)}^j R_{f(i)} \stackrel{(2)}{=} A_j$$

כדרוש. הערות:

(1) נכון מהיות f על + שינוי סדר סכימה.

(2) נכון מהגדרת (λ_i) , ע"פ זהות זו בדיוק.

סה"כ הוכחנו את הדרוש.

■

(ב) צ.ל. אי קיום $B_1 \dots B_{r-1} \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $\text{rank } B_i = 1$ $\forall 1 \leq i \leq r-1$: $A = \sum B_i$

..... (4)

נתבונן בשלושת הוקטורים הבאים:

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}, \quad \det(u, v, w) = \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{pmatrix}$$

$\det(u, v, w)$ ואת $\det(u+v, v+w, w+u)$ באמצעות $\det(u, v, w)$.

טענה.

$$\begin{aligned} 9 \det(u+x, v, w) &= \begin{vmatrix} u_1+x_1 & v_1 & w_1 \\ u_2+x_2 & v_2 & w_2 \\ u_3+x_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2+x_2 & v_2 & w_2 \\ u_3+x_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & v_1 & w_1 \\ u_2+x_2 & v_2 & w_2 \\ u_3+x_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3+x_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ x_2 & v_2 & w_2 \\ u_3+x_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} + \dots \\ &= \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & v_1 & w_1 \\ x_2 & v_2 & w_2 \\ x_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ x_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ x_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} \\ &+ \begin{vmatrix} x_1 & v_1 & w_1 \\ x_2 & v_2 & w_2 \\ x_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & v_1 & w_1 \\ x_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ x_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

•

$$\det(u+v, v+w, w+u) =$$