

תרגיל בית 3 ~ עברי נגר ~ נגזרות וחקירה

שחר פרץ

24 באוגוסט 2024

1

1. השתכנעתי

2. נמצא את כמות הזמן שיקח למצילה לעבור כתלות ב- θ_1 . נשתמש ב- x_1, y_1, x_2, y_2 כמו בסרטוט הבא:

לפי הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות, וכלל החיבור, יתקיים:

$$\tan \theta_2 = \frac{x_2}{\ell_2}, \tan \theta_1 = \frac{x_1}{\ell_1}, x + y = d$$

טענה 1. נציב ונקבל קשר גיאומטרי בין הזוויות:

$$d = \underbrace{\ell_1 \tan \theta_1}_{x_1} + \underbrace{\ell_2 \tan \theta_2}_{x_2} \implies \ell_2 \tan \theta_2 = d - \ell_1 \tan \theta_1 \implies \theta_2 = \arctan \left(\frac{d - \ell_1 \tan \theta_1}{\ell_2} \right)$$

עתה, נרצה למצוא ישירות את $t(\theta_1)$. משום ש- $s = t \cdot v$ אז $t = \frac{s}{v}$. נסמן ב- t_1 את כמות הזמן שלוקח לעבור את y_1 , וב- t_2 את כמות הזמן שלוקח לעבור את y_2 .

$$t(\theta_1) = t_1 + t_2 = \frac{y_1}{v_1} + \frac{y_2}{v_2}$$

באמצעות הגדרת ה- \cos נמצא את y_1, y_2 :

$$\cos \theta_1 = \frac{\ell_1}{y_1}, \cos \theta_2 = \frac{\ell_2}{y_2} \implies y_1 = \frac{\ell_1}{\cos \theta_1}, y_2 = \frac{\ell_2}{\cos \theta_2}$$

טענה 2. נציב:

$$t(\theta_1) = \frac{\ell_1}{v_1 \cos \theta_1} + \frac{\ell_2}{v_2 \cos \theta_2}$$

ננסה למצוא את הערך של $\frac{1}{\cos \theta_2}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos \theta_2} &= \sec \theta_2 = \sqrt{\sec^2 \theta_2} \quad \text{since } \sec^2 = 1 + \tan^2 \\ &= \sqrt{1 + \tan^2 \theta_2} \quad \text{לפי טענה 1} \\ &= \sqrt{1 + \tan^2 \left(\arctan \left(\frac{d - \ell_1 \tan \theta_1}{\ell_2} \right) \right)} \\ &= \sqrt{1 + \left(\frac{d - \ell_1 \tan \theta_1}{\ell_2} \right)^2} \quad \text{since } \tan(\arctan x) = x \end{aligned}$$

טענה 3. נציב חזרה בטענה 1. נשתמש בעובדה ש- $x^2 = (-x)^2$.

$$t(\theta_1) = \frac{\ell_1}{v_1 \cos \theta_1} + \frac{\ell_2}{v_2} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\ell_1 \tan \theta_1 - d}{\ell_2} \right)^2}$$

3. כדי למצוא את הזמן המינימלי, נגזור את $t(\theta_1)$ לפי הנוסחה של טענה 2.

$$t'(\theta_1) = -\frac{\ell_1 \sin \theta_1 + v_1 \cos \theta_1}{v_1^2 \cos^2 \theta_1} - \frac{\ell_2 \sin \theta_2 + v_2 \cos \theta_2}{v_2^2 \cos^2 \theta_2}$$

נשווה ל-0 כדי לנסות למצוא את נקודות סטציונריות.

$$\frac{\ell_1 \sin \theta_1 + v_1 \cos \theta_1}{v_1^2 \cos^2 \theta_1} = -\frac{\ell_2 \sin \theta_2 + v_2 \cos \theta_2}{v_2^2 \cos^2 \theta_2}$$

1. **שאלה:** מסך קולנוע נמצא בגובה 10 מטר מהרצפה וגובהו 20 מטר. באיזה מרחק x ממנו יש לשבת על מנת שזווית הראיה θ תהיה מקסימלית?

תשובה: מתוך הסרטוט שבשיעורי הבית:

$$\theta = \tan \frac{20+10}{x} - \tan \frac{10}{x} = \tan \frac{30}{x} - \tan \frac{10}{x}$$

נרצה ש- θ תהיה מקסימלית. נגזור נסמן $\theta(x) = \theta$. כתלות ב- x . נגזור ונשווה ל-0 כדי למצוא נקודות סטציונריות:

$$\begin{aligned} \theta(x)' &= \frac{30}{x^2} \cdot \sec^2 \left(\frac{30}{x} \right) - \frac{10}{x^2} \cdot \left(\sec^2 \frac{10}{x} \right) = 0 \\ &\quad \left. \begin{aligned} &\sec^2 \frac{30}{x} - \sec^2 \frac{10}{x} = 0 \\ &\sec^2 \frac{30}{x} = \sec^2 \frac{10}{x} \\ &\frac{30}{x} = \frac{10}{x} + 2\pi k \\ &20 = 2x\pi k \\ &\frac{10}{\pi k} = x \end{aligned} \right\} \cdot x^2 \quad \left. \begin{aligned} &+ \sec^2 \frac{10}{x} \\ &\downarrow \text{arcsec} \\ &\cdot x, -10 \\ &\downarrow \cdot \frac{1}{2\pi k} \end{aligned} \right\} \end{aligned}$$

ידוע ת.ה. θ

2. **שאלה:** מהן אורכי הצלעות של המבחן עם היקף מינימלי ששטחו S ?

תשובה: בהינתן שטח S , נסמן צלע אחת ב- x ועבור הצלע השנייה y יתקיים $y = \frac{S}{x}$. נתבונן בפונקציית ההיקף P ונסה למצוא לה מינימום:

$$P(x) = 2x + 2y = 2 \left(x + \frac{S}{x} \right)$$

נגזור ונשווה ל-0 כדי למצוא נקודות סטציונריות:

$$\begin{aligned} P'(x) &= 2 \left(1 - \frac{S}{x^2} \right) = 0 \\ &\quad \left. \begin{aligned} &x^2 - S = 0 \\ &x = \pm \sqrt{S} \end{aligned} \right\} \cdot \frac{x^2}{2} \quad \left. \begin{aligned} &+ S, \sqrt{} \end{aligned} \right\} \end{aligned}$$

בהתחשב בתחום הגדרה $x \geq 0$, נמצא שהנקודה הסטציונרית היחידה היא $x = \sqrt{S}$. נציב בטבלה כדי למצוא סוג קיצון:

x	$\frac{\sqrt{S}}{2}$	S	$S+1$
f'	-	0	+
f	\searrow	\cup	\nearrow

בהתאם לחישובים הבאים:

$$f' \left(\frac{\sqrt{S}}{2} \right) = 2 - 2 \cdot \frac{S}{S/4} = 2 - 4 = -2 \leq 0$$

$$f'(S+1) = 2 - 2 \cdot \underbrace{\frac{S}{(S+1)^2}}_{\leq 1} \geq 0$$

סה"כ מינימום לוקאלי ב- $x = \sqrt{S}$, בו יתקיים:

$$P(x) = P(\sqrt{S}) = 2\sqrt{S} + 2 \cdot \frac{S}{\sqrt{S}} = 2(\sqrt{S} + 1)$$

נבדוק קיצון קצה:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2x + \frac{S}{x} = \infty \leq 2\sqrt{S} + 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \cancel{2x} + \frac{S}{x} = +\infty \leq 2\sqrt{S} + 2$$

סה"כ ב- $x = 0$ מינימום מוחלט. נחשב את צלעות המלבן:

$$x = \sqrt{S}, y = \frac{S}{\sqrt{S}} = S, \implies x = y = \sqrt{S}$$

3. **שאלה:** מבין כל הגלילים הסגורים משני הצדדים, עם שטח פנים של 50cm^2 , מה היחס בין גובה הגליל לבסיסו במקרה של הגליל עם הנפח הגדול ביותר?

ידועה ההגבלה ידוע שהמעטפת היא $2\pi rh$ ושהבסיסים הם πr^2 כל אחד; אזי, שטח הפנים יהיה $50 = 2\pi r(r + h)$. נמצא את הנפח V יהיה:

$$25 = \pi r^2 + rh \implies rh = 25 - \pi r^2 \implies h = \frac{25}{r} - \pi r$$

$$V = \pi r^2 h \implies V(r) = \pi r^2 \cdot \left(\frac{25}{r} - \pi r \right) = \pi (25r - r^3)$$

נגזור את הנפח כדי למצוא מקסימום:

$$V'(r) = 25 - 3r^2 = 0 \implies r^2 = \frac{25}{3} \implies r = \pm \frac{5}{\sqrt{3}}$$

כאשר הפתרון השלילי מוחץ לתחום ההגדרה $0 \leq r$. באותה הנקודה, יתקיים שהנפח יהיה $V \approx 151$. נתבונן בקצוות תחום ההגדרה $0 \leq r$:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} V(r) = \lim_{r \rightarrow \infty} \pi r(25 - r^2) = \left(\lim_{r \rightarrow \infty} \pi r \right) \cdot \left(\lim_{r \rightarrow \infty} 25 - r^2 \right) = \infty \cdot (-\infty) = -\infty \leq 151$$

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \pi r(25 - r^2) = 0 \leq 151$$

סה"כ $r = \frac{5}{\sqrt{3}}$ קיצון מוחלט. אזי, שטח בסיס הוא $\pi r^2 = \frac{5\pi}{\sqrt{3}}$, וגובה הגליל הוא $h = \frac{25\sqrt{3}}{5} - \frac{5\pi}{\sqrt{3}}$. סה"כ, היחס יהיה:

$$\frac{S}{h} = \frac{\frac{5\pi}{\sqrt{3}}}{5\sqrt{3} - \frac{5\pi}{\sqrt{3}}}$$

בעיה: זה לא עובד.

3

1. נחקור את הפונקציה $f(x) = \frac{e^x}{1+x}$.

• **תחום הגדרה:** $1 + x \neq 0 \implies x \neq -1$

• **סימטריה:** סתירה; $x = 2 \implies f(2) = 2.43 \neq \pm 0.135 = f(-2)$

• **חיתוך עם הצירים:** $7f(0) = \frac{e^0}{1+0} = 1$

$$f(x) = 0 \implies \frac{e^x}{x+1} = 0 \implies e^x = 0 \implies x = \ln 0 \in \emptyset$$

סה"כ נקודות החיתוך היחידה $\langle 0, 1 \rangle$.

• **סטציונריות וסוג:** נגזור.

$$f'(x) = \frac{(1+x)e^x - e^x \cdot 1}{(1+x)^2} = \frac{e^x + xe^x - e^x}{(1+x)^2} = \frac{e^x}{(1+x)^2}$$

נשווה ל-0:

$$\frac{xe^x}{(1+x)^2} = 0 \implies xe^x = 0 \implies x = 0$$

נמצא את סוג הנקודה. נתבונן בסימן של הנגזרת.

x	-2	-1	-0.5	0	1
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	\searrow	\emptyset	\searrow	\cup	\nearrow

כלומר כאשר $x = 0$ המינימום היחיד קיים. משמע $\langle 0, 1 \rangle$ נקודת המינימום היחידה.

• **נקודות עוגף:** נתבונן בנגזרת השנייה, ונשוואה אותה ל-0:

$$f''(x) = [xe^x]' = e^x + xe^x = 0 \implies e^x(x+1) = 0 \implies \begin{cases} e^x = 0 \implies x = \ln 0 \in \emptyset \\ x+1 = 0 \implies x = -1 \end{cases}$$

נתבונן בכיוון הנגזרת השנייה בין בתחומים המוגדרים ובין נקודות ה-0:

x	-2	-1	0
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$	\cap	\emptyset	\cup

סה"כ אין נקודות עוקף.

• **אסימפטוטות:**

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x+1} = \frac{e^\infty}{\infty} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x+1} = \frac{\frac{e}{\infty}}{-\infty} = \frac{0}{-\infty} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{e^x}{x+1} = \frac{e^{-1}}{+0} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{e^x}{x+1} = \frac{e^{-1}}{-0} = -\infty \end{aligned}$$

• **תחומי עלייה/ירידה:** על בסיס הטבלה של הנגזרת הראשונה; עליה: $x > 0$ / ירידה: $x < 0 \wedge x \neq -1$

• **תחומי קעירות/קמירות:** על בסיס הטבלה של הנגזרת השנייה; קעירות: $x < 1$ / קמירות: $x > -1$

2. נחקור את הפונקציה $f(x) = \frac{(x+a)^2}{1-|x|}$.

• **תחום הגדרה:** $1 - |x| \neq 0 \implies |x| \neq 1 \implies x \neq \pm 1$

• **סימטריה:** עבור $x \geq 0$ כללי:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(x+a)^2}{1-x} \stackrel{!}{=} \frac{(a-x)^2}{1-x} = f(-x) \\ \left. \begin{aligned} (x+a)^2 &= (x-a)^2 \\ x+a &= x-a \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\cdot (1-x) \\ &\sqrt{} \end{aligned} \end{aligned}$$

$$2a = 0 \implies a = 0$$

סה"כ הפונקציה תהיה זוגית אמ"מ $a = 0$. אם נרצה שהיא תהיה אי-זוגית, באופן דומה נקבל $x+a = -x+a$ כלומר $2x = 0 \implies x = 0$ וזו סתירה עבור $x = 2$.

• **חיתוך עם הצירים:** $f(0) = \frac{(0+a)^2}{1-|0|} = a^2$

$$f(x) = 0 \implies \frac{(x+a)^2}{1-|x|} = 0 \implies (x+a)^2 = 0 \implies x+a = \pm 0 \implies x = -a$$

סה"כ נקודות חיתוך $\langle 0, a^2 \rangle$, $\langle -a, 0 \rangle$

• **נק' סטציונריות וסוגן:** נגזור ונשווה ל-0. נפריד למקרים: אם $x > 0$ ואם $x < 0$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2(x+a)|x| - 1}{1 - 2|x| + x^2} & x > 0 \\ \frac{2(x+a)|x| + 1}{1 - 2|x| + x^2} & x < 0 \end{cases}$$

בהשוואה ל-0:

$$\frac{2(x+a)|x| \pm 1}{\dots} = 0 \implies 2(x+a)|x| \pm 1 = 0 \implies 2x|x| + 2a \pm 1 = 0$$

נפריד למקרים. אם $x > 0$:

$$2x^2 + 2a - 1 = 0 \implies x_{1,2} = \frac{-2a + \sqrt{4a^2 + 4 \cdot 2}}{-2}$$

- נק' פיתול: נתבונן בנגזרת השנייה:

$$f''(x) = \begin{cases} 2|x| \cdot 2(x+a) \end{cases}$$

- אסימפטוטות וגבולות:
- תחומי עלייה/ירידה:
- תחומי קמירות/קעירות:
- סרטוט:

$$f(x) = \sqrt{(a^2 - x^2)(1 + 2x^2)}$$

- תחום הגדרה: $g(x) = (a^2 - x^2)(1 + 2x^2) \geq 0$. נמצא נקודות חיתוך עם ציר ה- x ונבדוק כיוון.

$$\begin{cases} a^2 - x^2 = 0 & \implies a^2 = x^2 \implies x = \pm a \\ \vee 1 + 2x^2 = 0 & \implies x^2 = -0.5 \implies x \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} g(0) &= (a^2 - 0^2)(1 + 2 \cdot 0^2) = a^2 \geq 0 \\ g(2a) &= (a^2 - 4a^2)(2 + 8a^2) = -4a^2 - 16a^4 \leq 0 \\ g(-2a) &= (a^2 - 4a^2)(2 + 8a^2) = -4a^2 - 16a^4 \leq 0 \end{aligned}$$

נציב בטבלה:

x	$-2a$	$-a$	0	a	$2a$
$g(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

סה"כ, הפונקציה מוגדרת בעבור $g(x) \geq 0$, כלומר $a \leq x \leq -a$.

- סימטריה:

$$\forall x \in \mathbb{R}. f(x) = \sqrt{(a^2 - x^2)(1 + 2x^2)} = \sqrt{(a^2 - (-x)^2)(1 + 2(-x)^2)} = f(-x)$$

סה"כ הפונקציה זוגית, לכל a . היא לא פונקציית קו ישר ולכן לא ייתכן שהיא גם אי-זוגית.

- חיתוך עם הצירים: $f(0) = \sqrt{(a^2 - 0)(1 + 2 \cdot 0)} = a\sqrt{2}$

$$f(x) = 0 \iff \sqrt{g(x)} = 0 \iff g(x) = 0 \iff x = \pm a$$

אזי $\langle a, 0 \rangle, \langle -a, 0 \rangle, \langle 0, a\sqrt{2} \rangle$ נקודות החיתוך עם הצירים.

- נק' סטציונריות וסוגן: נגזור ונשווה ל-0.

$$f'(x) = \frac{-2x(1 + 2x^2) + 4x(a^2 - x^2)}{\sqrt{(a^2 - x^2)(1 + 2x^2)}} = \frac{2x(-1 + 2a^2 - 4x^2)}{\sqrt{(a^2 - x^2)(1 + 2x^2)}} = 0 \implies 2x(-1 + 2a^2 - 4x^2) = 0$$

נפלג למקרים. אם $2x = 0$ אז עבור $x = 0$ השוויון יתקיים, אחרת, השוויון הבא יצטרך להתקיים:

$$-1 + 2a^2 - 4x^2 = 0 \implies x^2 = \frac{-1 + 2a^2}{4} \implies x = \pm \frac{1}{2} \sqrt{-1 + 2a^2}$$

נשים לב שהנקודה הזו קיימת אם $-1 + 2a^2 \geq 0$. נמצא נקודות חיתוך כדי להבין מתי השוויון מתקיים.

$$2a^2 - 1 = 0 \implies a^2 = 0.5 \implies a = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

ידוע כי $-2^{-0.5} \leq 0 \leq 2^{-0.5}$, כלומר עבור $a = 0$ נוכל לבדוק מה יתקיים. שם, נמצא $-1 + 2 \cdot 0^2 = -1 \leq 0$, ומשום שזו פרבולות בקצוות האחרים של התחום היא תהיה חיובית, וסה"כ הא"ש יתקיים אם $a \notin (-2^{0.5}, 2^{0.5})$. נרצה גם לדעת שבהינתן a שעבורן הן מוגדרות, האם הן יהיו בתחום ההגדרה. נפתור את אי-השוויון $\frac{1}{2} \sqrt{-1 + 2a^2} \leq a$. נמצא נקודות חיתוך של שתי הפונקציות:

$$\implies -1 + 2a^2 = 4a^2 \iff 2a^2 = -1 \iff a = \sqrt{-0.5} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$$

כלומר אין נקודות חיתוך, משמע נוכל לבחור ערך a אקראי בתחום ההגדרה ולבדוק אם עליו יתקיים אי-השוויון, ומכאן יגרר על השאר. עבור $a = 2 > 2^{0.5}$, נציב ונקבל $\frac{1}{2} \sqrt{-1 + 4} \leq 2$, כדרוש. באופן דומה אי-השוויון $-\frac{1}{2} \sqrt{-1 + a^2} \leq -a$ יתקיים גם הוא. נסכם: שתי הנקודות הללו קיימות אם $a \notin (-2^{0.5}, 2^{0.5})$, לכל ערך a .

נמצא את סוג הנקודות הסטציונריות: נפלג למקרים.

$$\text{אם } a \in \mathbb{R}_+ \setminus (-2^{-0.5}, 2^{0.5}) \implies a > \sqrt{2}^{-1}$$

$-a$	$\frac{-a - \frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}$	$-\frac{1}{4}\sqrt{-1+2a^2}$	0	$\frac{1}{4}\sqrt{-1+2a^2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}$	$\frac{a + \frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}}{2}$	a
0	+	0	-	0	-	0	+	0
\cup	\nearrow	\cap	\searrow	\cup	\nearrow	\cap	\searrow	\cup

ניעזרתי בכיוון של ההצבות הבאות:

$$f' \left(\frac{-a - \frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}}{2} \right) = \frac{\overbrace{\left(-a - \frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2} \right)}^{\leq 0} \underbrace{\left(-1+2a^2 - (4(-a^2 - a\sqrt{-1+2a^2}) - 1+2a^2) \right)}_{\substack{\sqrt{\dots} \\ \geq 0}}}{\sqrt{\dots}} = \frac{(+)(-)^2}{(+)} \geq 0$$

$$f' \left(-\frac{1}{4}\sqrt{-1+2a^2} \right) = \frac{\overbrace{\left(-\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2} \right)}^{\leq 0} \underbrace{\left(-1+2a^2 + \sqrt{-1+2a^2} \right)}_{\substack{\sqrt{\dots} \\ \geq 0}}}{\sqrt{\dots}} = \frac{(-)(+)}{+} \leq 0$$

כאשר ידוע $|a| \geq 2^{0.5}$ ולכן $2a^2 \geq 4 \geq 1$ וסה"כ אי-השוויון בסוגריים תקין.

באופן דומה, ערכם של המקבילים לערכים אלו החיוביים יהיה זהה (כיוון הביטוי בסוגריים הימניות בו x ממעלה שנייה לא ישתנה, אך המקדם שלהם בסוגריים השמאליות כן ישנה את כיוונו כי הוא ממעלה ראשונה). נמצא את ערכי ה- y של נקודות הקיצון שמצאנו:

$$f \left(\pm \frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2} \right) = \sqrt{\left(a^2 - \frac{1}{4}(-1+2a^2) \right) \left(1 - \frac{1}{2}(-1+2a^2) \right)} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{4} \right) \left(\frac{3}{2} - a^2 \right)}$$

$$f(0) = \sqrt{(a^2 - 0^2)(1 + 2 \cdot 0^2)} = \sqrt{a^2} = |a| = a$$

$$f(\pm a) = \sqrt{a^2 - (\pm a)^2}(1 + 2a^2) = 0$$

אם $a \in (0, 2^{0.5}]$

x	$-a$	$-0.5a$	0	$0.5a$	a
$f'(x)$	0	+	0	-	0
$f(x)$	\cup	\nearrow	\cap	\searrow	\cup

ניעזרתי בכיוון של ההצבות הבאות:

$$f'(-0.5a) = \frac{-a(-1+2a^2 - 4 \cdot \frac{1}{4}a^2)}{\sqrt{\dots}} = \frac{-a(-1+a^2)}{\sqrt{\dots}} = \frac{\overbrace{a-a^2}^{\geq 0}}{\underbrace{\sqrt{\dots}}_{\geq 0}} \geq 0$$

$$f'(0.5a) = \frac{a(-1+2a^2 - 4 \cdot \frac{1}{4}a^2)}{\sqrt{\dots}} = \frac{\overbrace{a^2-a}^{\leq 0}}{\underbrace{\sqrt{\dots}}_{\geq 0}} \leq 0$$

כאשר מתקיים אי-השוויון $a < a^2 < 1$ כי $a < \frac{1}{\sqrt{2}}$ (ראה לפה 1 בסעיף 6).

סה"כ, נקודות הקיצון הן:

$$\begin{cases} \left\langle \pm \frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}, \sqrt{\left(\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{4} \right) \left(\frac{3}{2} - a^2 \right)} \right\rangle \max & a \in (\sqrt{2}^{-1}, \infty) \\ \langle 0, a \rangle, \langle \pm a, 0 \rangle & \min \\ \langle 0, a \rangle \max & a \in (0, \sqrt{2}^{-1}] \\ \langle 0, \pm a \rangle \min & \end{cases}$$

• **נק' פיתול:** אין צורך בסעיף זה.

• **אסימפטוטות וגבולות:** לא מצאנו נקודות אי-הגדרה, והפונקציה מוגדרת בקצוות תחום ההגדרה שלה. אזי, הפונקציה רציפה בכל תחום, וללא אסימפטוטות אופקיות.

• **תחומי עלייה/ירידה:** על בסיס הטבלה שבעזרתה מצאנו נקודות סטציונריות, תחומי העלייה והירידה הם:

$$\nearrow: \begin{cases} x \in (a, -\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}) \cup (0, \frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}) & a \in (\sqrt{2}^{-1}, \infty) \\ x \in (-a, 0) & a \in (0, \sqrt{2}^{-1}] \end{cases}$$

$$\searrow: \begin{cases} x \in (-\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}, 0) \cup (\frac{1}{2}\sqrt{-1+2a^2}, a) & a \in (\sqrt{2}^{-1}, \infty) \\ x \in (0, a) & a \in (0, \sqrt{2}^{-1}] \end{cases}$$

• **תחומי קמירות/קעירות:** אין צורך בסעיף זה.

• **סרטוט:**

4

(א) **שאלה:** לאילו ערכי a של הפונקציה $f(x) = x^4 + ax^3 + 6x^2$ שתי נקודות פיתול.

פתרון: נשווה ל-0 את הנגזרת השנייה כדי למצוא נקודות חשודות פיתול:

$$f''(x) = 4x^3 + 3ax^2 + 12x = 0 \implies f''(x) = 12x^2 + 6ax + 12 = 0 \implies x_{1,2} = \frac{6a \pm \sqrt{9a^2 - 576}}{24}$$

הנקודות הללו יהיו קיימות אם $9a^2 - 576 \geq 0$. שורשי הפרבולה הזו (כתלות ב- a) יהיו $a_{1,2} = \pm 8$, ומשום שזו פרבולה שמחה, אי-השוויון יתקיים כאשר $a \notin (-8, 8)$. אך, כאשר אי-השוויון יתקיים באופן הדוק השורש יוציא רק נקודה אחת, אזי שתי נקודות פיתול שונות ימצאו כאשר $a \notin [-8, 8]$.

(ב) עבור ערך a שבו הדיסקרימיננטה של הנגזרת השנייה תהיה 0, כלומר הנגזרת השנייה תשתווה ל-0 בנקודה אחת בלבד. זה יקרה בעת $9a^2 - 576 = 0 \implies a = \pm 8$ -ש.

5

(a) נרצה להוכיח $\forall x \in \mathbb{R}_+, \sin x < x$. נתבונן ב- $f(x) = \sin x - x$, ונוכיח את אי-השוויון $f(x) < 0$. נתבונן בנגזרתה של הפונקציה: $f'(x) = \cos x - 1$. נרצה למצוא לה נקודות קיצון. נתבונן בא"ש $\cos x = 1 \implies x = 0.5\pi k$, וממחזוריות $\cos x$ והגדרת הזווית אופקית, בפרט $x = k\pi$ נקודות המקסימום היחידות, ו- $x = 0.5 + \pi k$ נקודות המינימום היחידות. בפרט עבור $k = 0$ נמצא $x = 0, x = 0.5\pi$ נקודות מינימום ומקסימום בהתאמה, כלומר $f(x)$ מונוטונית יורדת בתחום $x \in [0, 0.5\pi]$. משום ש- $f(0) = \sin 0 - 0 = 0$, אזי $f(x) \leq 0$ עבור $x \in [0, 0.5\pi]$. מכיוון שאין קיצון נוסף בתחום, נסיק $f(x) < 0$ עבור $\forall x \in (0, 0.5\pi]$. עבור $x > 0.5\pi$, נתון $0.5\pi < x < \pi$, $\sin x \leq 1 < 0.5\pi < x$, כלומר גם כאן יתקיים אי-השוויון המבוקש. סה"כ הוכח אי-השוויון לכל $x \in \mathbb{R}_+$.

(b) נרצה להוכיח $\forall x \in \mathbb{R}_+, \cos x > 1 - \frac{x^2}{2}$. נתבונן בפונקציה $f(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$, ונוכיח את אי-השוויון $f(x) > 0$. נגזור אותה, ונקבל $f'(x) = -\sin x - x$. נגזור שוב, ונקבל $f''(x) = -\cos x - 1$, שהיא פונקציה קטנה או שווה ל-0 בכל תחומה (מהגדרת הזווית). לכן, $f'(x)$ מונוטונית יורדת בכל תחומה. יתקיים $f'(0) = -\sin 0 - 0 = 0$, כלומר לכל $x > 0$ נדע $f'(x) \leq 0$. אזי, גם $f(x)$ מונוטונית יורדת חזק, ובגלל ש- $f(0) = \cos 0 - 1 + \frac{0^2}{2} = 0$ אז סה"כ גם הפונקציה הזו תקיים $f(x) < 0$ כדרוש.

(c) נרצה להוכיח $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$. נתבונן בפונקציה $f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$, ונוכיח את אי השוויון $f(x) < 0$. נגזור ונקבל $f'(x) = \cos x - 1 + 0.5x^2$, $f''(x) = -\sin x + x$, $f'''(x) = -\cos x + 1 < 0$. ידוע שמתקיים $f(0) = f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 0$. $\cos x - 1 + 0.5x^2$ ידוע שמתקיים $f(x) < 0 \iff f'''(x) < 0$ (מנוטוני יורד תחת ציר ה-0). ולכן $f'''(x) < 0$ מתחת ל-0, וכן f'' , f' ו- $f(x)$ כדרוש (מנוטוני יורד תחת ציר ה-0).

6

צ.ל. $\forall x \geq -1, 0 \leq a \leq 1, (1+x)^a \leq 1+ax$. יהיו $x \geq -1, 0 \leq a \leq 1$. נעביר אגפים ונמצא שקילות להוכחת הא"ש $f(x) := (1+x)^a - 1 - ax \leq 0$, כלומר $f(x) \leq 0$. נגזור:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^a - 1 - ax & f(0) &= 1^a - 1 + a \cdot 0 = 0 \\ f'(x) &= a(1+x)^{a-1} - a & f'(0) &= a(1+0)^{a-1} - a = a - a = 0 \\ f''(x) &= \underbrace{(a^2 - a)}_{\leq 0} \underbrace{(1+x)}_{\geq 0} & & \end{aligned}$$

הסתמכנו שני אי-שוויונים בטענות לעיל. הראשון, $x+1 \geq 0$, שנגרר ישירות מכך ש- $x \geq -1$ (נוסיף 2 לשני האגפים). השני, $g(a) = a^2 - a$, נכון כי $g'(a) = 2a - 1$ יהיה קטן ממש מ-0 לכל $0 \leq a \leq 1$, כלומר $g(a)$ מונוטוני יורד החל מנקודת ההתחלה שלו $g(0) = 0$, אזי

$g(a) \leq 0$. סה"כ הטענות לעיל אכן נכונות, תחת הנתונים. באופן דומה להסקות שהתבצעו בשאלה קודמת, $f'' < 0$ ולכן f' מונוטוני יורד, ומשום ש- $f'(0) = 0$ אז $f'(x) \leq 0, \forall x \geq 0$, ובאופן דומה $f(x) \leq 0$ גם כן (תחת אותם התנאים שניתנו), כדרוש.

עתה, נותר להוכיח שוויון אמ"מ $a = 1 \vee x = -1$. משיקולים דומים, לכל $x \leq -1$ נדע $f'''(x) \geq 0$ וכך (באופן דומה להוכחת אי-השוויון לעיל) יגרר $f(x)$ מונוטונית עולה באותו התחום, כלומר הקיצון היחיד הוא קיצון מקסימום כאשר $x = -1$, שם אכן יתקיים $f(x) = 0$ (כלומר, שוויון). נדע, שהפונקציה תעלה/תרד חזק בכל תחום אחר כי היא לא קבועה, אלא אם $a = 1$, בעת הזו $f(x) = (1+x)^1 - 1 - x \cdot 1 = 0$ (כלומר, שוויון גם במקרה הזה). סה"כ אלו המקרים היחידים בהם ייתכן שוויון.

PID 7

.....

שחר פרץ, 2024
אהבה כן טקסט תחתון