

## תרגיל בית 5 - אלגברה לינארית 1' לאודיסיאה סייבר

1. בכל אחד מהסעיפים הבאים, קבעו האם קיימת העתקה לינארית  $T$  המקיימת את התנאים הנתונים. אם קיימת, קבעו האם היא יחידה. אם היא יחידה מצאו אותה, את הגרעין והתמונה שלה, וקבעו אם היא חח"ע / על / איזומורפיזם: (א) מעל השדה  $\mathbb{Z}_3$ , העתקה  $T: (\mathbb{Z}_3)^3 \rightarrow M_2(\mathbb{Z}_3)$  המקיימת

$$T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

(ב) מעל השדה  $\mathbb{Z}_5$ , העתקה  $T: (\mathbb{Z}_5)^3 \rightarrow M_2(\mathbb{Z}_5)$  המקיימת

$$T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = T\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(ג) מעל השדה  $\mathbb{R}$ , העתקה  $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$  המקיימת

$$T(1 + 2x + x^2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(1 + x + x^2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T(1 + x^2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(ד) מעל השדה  $\mathbb{R}$ , העתקה  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  המקיימת

$$\text{Im}(T) = \ker(T) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(ה) מעל השדה  $\mathbb{R}$ , העתקה  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  המקיימת

$$\text{Im}(T) = \ker(T) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

2. בכל אחד מהסעיפים הבאים, נתונים מ"ו  $V$  מעל שדה  $\mathbb{F}$ , וקטור  $v \in V$  ובסיס  $B$  של  $V$ . מצאו את  $[v]_B$  בכל סעיף: (א)

$$\mathbb{F} = \mathbb{R}, V = M_2(\mathbb{R}), v = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \left( \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

(ב)

$$\mathbb{F} = \mathbb{Z}_5, V = (\mathbb{Z}_5)^5, v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, B = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

(ג)

$$\mathbb{F} = \mathbb{R}, V = \mathbb{R}_4[x], v = 2 + 4x - 5x^3 + x^4, B = (1, 1 + x, 1 + x + x^2, 1 + x + x^2 + x^3, 1 + x + x^2 + x^3 + x^4)$$

3. בכל אחד מהסעיפים הבאים נתונה העתקה לינארית  $T$  ובסיסים  $B, C$ . חשבו את  $[T]_C^B$  בכל סעיף:

(א)  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  הנתונה על ידי

$$T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ x - y \end{pmatrix}$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right), C = \left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$$

(ב)  $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow M_2(\mathbb{R})$  הנתונה על ידי

$$T(ax^2 + bx + c) = \begin{pmatrix} a + b & b + c \\ c - a & a - b \end{pmatrix}$$

$$B = (1, 1 + x, 1 + x^2), C = \left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right)$$

(ג)  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  הנתונה על ידי

$$T\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 \\ 2x_1 + x_3 - x_4 \end{pmatrix}$$

כאשר  $B, C$  הבסיסים הסטנדרטיים של  $\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^3$  בהתאמה.

4. חשבו את המכפלות הבאות:

א.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \end{pmatrix}$$

ב.

$$\begin{pmatrix} 6 & 7 & 9 & -12 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & -3 & 9 \\ 1 & -7 & -3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

5. יהי  $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_5$  ותהי  $T: \mathbb{F}_2[t] \rightarrow \mathbb{F}^2$  המוגדרת על ידי  $T(p(t)) = \begin{pmatrix} p(1) \\ p(2) \end{pmatrix}$ . נגדיר

$$B = (1, t+1, t^2+t+1), C = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

להיות בסיסים של  $\mathbb{F}_2[t], \mathbb{F}^2$  בהתאמה. בתרגול ראינו ש- $[T]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ .

(א) הוכיחו שלכל  $p \in \mathbb{F}_2[t]$  מתקיים  $[T(p)]_C = [T]_C^B \cdot [p]_B$  (ללא שימוש במשפט שאומר שזה מתקיים, כלומר חשבו את שני הצדדים של המשוואה ובדקו שהשוויון אכן מתקיים).  
(ב) מצאו את הגרעין ואת התמונה של  $T$  באמצעות המטריצה המייצגת

6. יהיו  $V, W$  מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל שדה  $\mathbb{F}$ . תהי  $T: V \rightarrow W$  העתקה לינארית. יהי  $C$  בסיס כלשהו של  $W$ .

(א) הוכיחו שקיים בסיס  $B$  של  $V$  כך ש- $\dim(\ker(T)) = \dim$  העמודות הראשונות של  $[T]_C^B$  הן עמודות אפסים  
(ב) נניח ש- $T$  אינה העתקת האפס. הוכיחו שקיים בסיס  $B'$  של  $V$  כך שב- $[T]_C^{B'}$  אין עמודות אפסים בכלל