רשימות פונקציות ממשיות

שחר פרץ $\sim$ 2027A $\sim$ מבוסס על הקלטות 2016B

תאריך קימפול: 21 באוקטובר 2026

0 Introduction to the Introduction . . . . . .

0.1 רישיון ∼ License

The following summary is provided under the GNU General Public License version 3 (GPLv3). It can be distributed and/or modified under the terms of the license, or any later version of it. Additional information can be found here.

הסיכום להלן מסופק תחת רשיון התוכנה החופשית של גנו גרסה 3 (GNU General Public License (GPL) version 3). ניתן להעתיקו ו/או להפיצו תחת GPLv3 או גרסה מאוחרת יותר. מידע נוסף אפשר למצוא כאן.

0.2 הרבה מילים שאפשר לדלג עליהן

להלן מובא סיכום מוקלד של ההרצאות ביוטיוב של פרופסור בועז קלרטג ב־2016. הסיכום הוקלד בסמסטר הראשון של שנת 2027. הסיכום עדיין בשלבי כתיבה.

0.3 סימונים ∼

בסיכום הבא נניח את הסימונים הבאים:

- $[n] \coloneqq \mathbb{N} \cap [0, n]$
- $\subset \coloneqq \subseteq$
- $\bigcup A \coloneqq \bigcup_{X \in A} X$
- $I \coloneqq [0, 1]$

תוכן העניינים

0 מבוא למבוא **2**

0.1 רישיון 2

0.2 הרבה מילים שאפשר לדלג עליהן 2

0.3 סימונים 2

1 מבואות למיניהם **4**

1.1 חומרי קריאה 4

1.2 השלמות מטופולוגיה 4

1.3 מידת לבג ב-$\mathbb{R}^2$ 5

1.3.1 מידה חיצונית 7

1.3.2 קבוצות מדידות 8

1.3.3 הגדרת מידה מחוץ ל-Ω 10

2 מידת לבג למרחב מידה **14**

בתיאבון

1 All Kinds of Introductions

תחילת הרצאה 1

1.1 ∼ חומרי קריאה

- Stein & Sakarachi: Measure Theory
- לינדשטראוס, וייס: מבוא לאנליזה מודרנית

1.2 ∼ השלמות מטופולוגיה

הרציונלים בני מנייה, כלומר נוכל למספר $\mathbb{Q} = \{q_n\}_{n=1}^{\infty}$. עתה נתבונן בקבוצה הבאה:

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(q_n - \frac{1}{2^n}, q_n + \frac{1}{2^n} \right)$$

נבחין שהיא איחוד של קבוצות ולכן פתוחה. משום ש־$\mathrm{Cl}\,\mathbb{Q} = \mathbb{R}$, מתבקש לשאול האם $A = \mathbb{R}$. נוכל לענות על שאלה זו באמצעות מושג המידה שנגדיר בהמשך, שיגדיר את גודל הקבוצה להיות סופי, ובפרט:

$$m(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2$$

הערה: משפט דיריכלה על קירובים דיופאנטים:

$$\forall p, q \in \mathbb{N}\colon \left| \sqrt{2} - \frac{p}{q} \right| > \frac{1}{q^2}$$

לכן, לדוגמה, "אי אפשר לקרב את $\frac{1}{\sqrt{2}}$ בצורה יחסית טובה ב־A".

שימו לב שהקטעים בהגדרה של A לא זרים, בהכרח, מצפיפות. עם זאת, ניתן להציג את A כאיחוד קטעים זרים ופתוחים (היא לא קשירה).

מִשפט 1.2.1. תהא $A \subset \mathbb{R}$ קבוצה פתוחה. אז אפשר להציג את A כאיחוד סופי או בן־מנייה של איחוד קטעים פתוחים זרים.

הִגדרה 1.2.1. שקטע $I \subset A$ קטע פתוח מקסימלי ביחס ל־A אם לא קיים $J \subset \mathbb{R}$ קטע פתוח כך ש־$I \subsetneq J \subset A$

נוכל להגדיר את המושג באופן דומה בעבור קבוצה פתוחה.

הִערה 1. לצורך המשפט, "קטע פתוח" במובן הרחב, כלומר בפרט קרנות $(a, \infty), (\infty, a)$ ו־$\mathbb{R}$.

לֶמה 1.2.2. תהא A פתוחה. אז לכל $x_0 \in A$ קיים קטע מקסימלי שמכיל את x_0.

הוכחה. נסמן:

$$\beta_* = \sup\{\beta > x_0\colon [x_0, \beta) \subset A\}$$
$$\alpha_* = \inf\{\alpha < x_0\colon (\alpha, x_0] \subset A\}$$

נבחין במספר הבחנות:

- $\boldsymbol{\alpha_* < x_0 < \beta_*}$**:** כי נקודת פנים ($x_0 \in \operatorname{Int} A$ כי A פתוחה) לכן $x_0 \in (\alpha, \beta) \subset A$ אז יש איזשהם α, β לא טרוויאלים
- **הקטע $\boldsymbol{A \supset (\alpha_*, \beta_*)}$:** ניקח $x \in (\alpha_*, \beta_*)$.
  - אם $x > x_0$ אז קיים $\beta \geqslant x_0$ כך ש־$x \in [x_0, \beta) \subset A$
  - אם $x \leqslant x_0$ אז $x > \alpha_*$ ולכן קיימת $\alpha < x$ כך ש־$x \in [\alpha, x_0) \subset A$
- **הקטע $\boldsymbol{(\alpha_*, \beta_*) =: I}$ מקסימלי** (ביחס ל־A)**:** נניח בשלילה שלא היה מקסימלי, ואז היה קטע (α, β) כך ש־$(\alpha_*, \beta_*) \subsetneq (\alpha, \beta) \subset A$, אך מהגדרת הסופרמום $\beta \leqslant \beta_*$ ומהאינפימום $\alpha \geqslant \alpha_*$ כלומר $(\alpha, \beta) = (\alpha_*, \beta_*)$ בסתירה.

■

נפנה להוכחת המשפט.

הוכחת משפט 1.2.1. נתונה קבוצה A. נביט באוסף הקטעים המקסימליים ביחס ל־A.

- **הקטעים הנ"ל פתוחים:** טרוויאלי, קטע פתוח הוא קבוצה פתוחה.
- **איחודם מכסה את A:** ישירות מטענת העזר, סביב כל נקודה יש קטע פתוח מקסימלי כזה.
- **הקטעים הנ"ל זרים:** נניח ש־$I, J \subset A$ שני קטעים מקסימליים שנחתכים, ובשלילה $I \cap J \neq \varnothing$. אזי $I \cup J \subset A$ פתוח, ומכיל את הקטע המקסימלי I כלומר $I = I \cup J$. באותו האופן $J = I \cup J = I$ ולכן הם שווים.
- **האיחוד לכל היותר בן בנייה:** כי $\mathbb{R}$ הוא CII – בכל קטע ישנו רציונלי, הרציונלים שווים זה מזה (הם זרים) ומאקסיומת הבחירה הבת מנייה הגדרנו העתקה חח"ע לקבוצה בת מנייה. ■

1.3 ∼ מידת לבג ב־$\mathbb{R}^2$

כיצד נגדיר את מושג המידה? הרעיון הוא להתאים לקבוצה $A \subset \mathbb{R}^d$ מספר, שאמור לתאר את המידה שלה.

- כש־$d = 1$, מידה משמעה אורך
- כש־$d = 2$, מידה משמעה אורך
- כש־$d = 3$, מידה משמעה נפח

נגדיר את מידת לבג במקרה הפרטי בו $d = 2$. הבנייה עובדת באותה המידה בכל הממדים. לאחר מכן נגדיר את המידה באופן כללי בכל מרחב מידה (כלומר קבוצה עם מבנה נוסף שמתאר אילו קבוצות מדידות ואילו לא).

תהא $A \subset \mathbb{R}^2$, ונרצה באיזשהו אופן להגדיר את $m(A)$ שמייצג את השטח שלה. אנחנו כבר יודעים לחשב שטח של מלבן $a \times b$ ששטחו $a \cdot b$. זו הנחת הייסוד שנעבוד איתה (ביחד עם אדטיביות של קבוצות זרות).

הגדרה 1.3.1. מלבן אלמנטרי ב־$\mathbb{R}^2$ הוא קבוצה מהצורה $[a, b) \times [c, d)$ כאשר $a \leqslant b, c \leqslant d \in \mathbb{R}$.

נבחין שהגדרה זו בפרט כוללת את הקבוצה הריקה. נגדיר את השטח/מידה של מלבן אלמנטרי כזה להיות:

$$m(A) \coloneqq m_2(A) \coloneqq (b - a) \cdot (d - c)$$

(מסמנים לעיתים ב־m_d את המידה ל־$\mathbb{R}^d$).

למה 1.3.1 (אדטיביות). נניח ש־$R, R_1 \dots R_N \subset \mathbb{R}^2$ מלבנים אלמנטריים, כך ש־$R = \biguplus_{k=1}^{N} R_k$ (איחוד זר). אזי:

$$m(R) = \sum_{k=1}^{N} m_2(R_k)$$

הוכחה באמצעות טרוויאלי. טרוויאלי. ■

(הטריק שעושים כאן, הוא לקחת את כל המלבנים, "להמשיך" את הצלעות שלהם לישרים אינסופיים, להוכיח למקרה הזה ואז לעשות רדוקציה למקרה המקורי).

באותו האופן, נוכל להוכיח את הלמה הבאה:

לֶמה 1.3.2 (תת־אדטיביות). יהיו $P, P_1 \dots P_N \subset \mathbb{R}^2$ מלבנים אלמנטריים, כך ש־$P \subset \bigcup_{i=1}^{N} P_i$, אזי $m(P) \leqslant \sum_{i=1}^{N} m(P_i)$.

לעיתים גם תת־אדטיביות מכונה סאב־אדטיביות.

נקבע מלבן אלמנטרי $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, ונעבוד בה"כ בתוכו לצורך הנוחות.

הגדרה 1.3.2. קבוצה $A \subset \Omega$ נקראת קבוצה אלמנטרית אם היא איחוד סופי של מלבנים אלמנטריים.

ההצגה לא יחידה (ניתן לייצגה כאיחוד סופי של מלבנים אלמנטריים שונים), אך מידת הקבוצה לא תלויה בהצגה.

טענה 1.3.3. ב־Ω, איחוד, חיתוך ומשלים של מספר סופי של קבוצות אלמנטריות, הוא קבוצה אלמנטרית.

הוכחה. יהיו $P_1 \dots P_N, R_1 \dots R_T$ מלבנים אלמנטריים, כך ש־$A = \bigcup_{i=1}^{N} P_i,\ B = \bigcup_{i=1}^{T} R_i$ אלמנטריים.

- איחוד: ברור ש־$A \cup B = \bigcup_{i=1}^{T} R_i \cup \bigcup_{j=1}^{N} P_i$ כנדרש.
- חיתוך: בדומה לאיחוד, בשילוב עם העובדה שחיתוך מלבנים אלמנטריים נותנת מלבן אלמנטרי.
- משלים: אם $\gamma = [a,b) \times [c,d) \subset \Omega$ אז משלים של מלבן מדה־מורגן $R = [x,y) \times [z,w)$ ואז נקבל ש־:

$$\overline{R} = [a,b) \times [c,z) \cup [a,b) \times [w,c) \cup [a,x) \times [z,w) \cup [y,b) \times [z,w)$$

קבוצה אלמנטרית. ואז ל־A כללית נקבל ש־$\Omega \setminus A = (\Omega \setminus R_1) \cap \cdots \cap (\Omega \setminus R_N)$

■

סוף הרצאה 1, תחילת הרצאה 2

הערה 2. תוצאה של המשפט לעיל היא המקרה הפרטי לפיו $A \cup B, A \cap B, A \triangle B, A^c = \Omega \setminus A, A \setminus B$ כולן קבוצות אלמנטריות. מכאן ש־:

- קבוצת הקבוצת האלמנטריות המוכלות ב־Ω היא אלגברה בוליאנית.
- כל $A \subset \Omega$ אלמנטרית אפשר להציג כאיחוד זר של מספר סופי של מלבנים אלמנטריים.

ההוכחה של המסקנה השנייה היא הוכחה דומה למה שכבר ראינו של להמשיך את המלבנים.

תזכורת: $A \triangle B \coloneqq (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

הגדרה 1.3.3. אוסף תת־קבוצות של Ω הסגור למשלים ולאיחוד סופיים, וכן מכיל את הקבוצה הריקה, נקרא אלגברה של קבוצות.

טענה 1.3.4. בהינתן אלגברה של קבוצות מעל Ω, תחת ההגדרה:

$$A + B \coloneqq A \triangle B \qquad\qquad A \cdot B = A \cap B$$

מקבלים חוג עם יחידה (שהוא $\varnothing$), שבו $\forall x : x^2 = x$. קבוצה שמקיימת תנאים אלו נקראת אלגברה בוליאנית.

הגדרה 1.3.4. חוג שבו $\forall x : x^2 = x$ נקרא חוג בוליאני.

מסקנה 1.3.1. חוג בוליאני היא חוג קומטטיבי ממאפיין 2.

הערה 3. יש איזומורפיזם בין קטגוריית החוגים הבוליאנים לבין קטגוריית האלגבראות הבוליאניות, שמנוסח במפורש במשפט 1.3.4. לרוב משתמשים במושג אלגברה בוליאנית בהקשרים של תקב"ע, ובחוג בוליאני בהקשרים אלגבריים.

הגדרה 1.3.5. תהי $A \subset \mathbb{R}^2$ קבוצה אלמנטרית $A = \bigcup_{i=1}^{N} P_i$ כאשר $P_i \subset \mathbb{R}^2$ מלבנים אלמנטריים. נגדיר את מידת A להיות:

$$m(A) \coloneqq \sum_{i=1}^{N} m(P_i)$$

טענה 1.3.5.

1. $m(A)$ לא תלויה בהצגה של A כאיחוד של מלבנים אלמנטרים זרים,
2. ההגדרה לעיל מזדהה עם ההגדרה הקודמת במקרה ש־A מלבן אלמנטרי.

ההוכחה של 1 פשוטה מאדטיביות של מידת מלבנים, ו־1 גורר ישירות את 2.

טענה 1.3.6. תכונות בסיסיות של מידת קבוצות אלמנטריות:

- בהינתן $A, B \subset \Omega$ אלמנטריות אז $A \cap B = \varnothing \implies m(A \cup B) = m(A) + m(B)$
- אם $A_1 \dots A_N$ אלמנטריות זרות בזוגות, אז $m\left(\bigcup A_i\right) = \sum m(A_i)$ (באינדוקציה על 1)
- אם $A_1 \dots A_N$ אלמנטריות, אז $m\left(\bigcup A_i\right) \leqslant \sum m(A_i)$

ההוכחה של כולן מסתמכת על "הרחבה" של המלבנים.

משפט 1.3.7 (תת־סיגמה־אדטיביות)**.** נניח ש־$A, A_1 \cdots \subset \mathbb{R}^2$ סדרת קבוצות אלמנטריות כך ש־$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, אז:

$$m(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$$

הערה 4. בהקשרים הללו, האות סיגמה לרוב מסמנת איחוד בן־מנייה.

התכונה לעיל קשורה לשלמות של $\mathbb{R}^2$ כמרחב מטרי. אם לדוגמה היינו עוברים ברציונליים, אז לדוגמה המלבן $I = [0,1)^2 \cap \mathbb{Q}^2$ היה איחוד של "המון ישרים דקים" וזה לא היה עובד.

הוכחת המשפט מסתמכת על רדוקציה מאיחוד בן־מנייה לאיחוד סופי (שם יש לנו בבירור סאב סיגמה אדטיביות מתכונות האלגברה), והדרך המתבקשת לעשות את זה היא באמצעות היינה־בורל.

למה 1.3.8. תהא A אלמנטרית ו־$\varepsilon > 0$. אז קיימות אלמנטריות $A', \tilde{A} \subset \mathbb{R}^2$ כך ש־:
(א) קירוב מבפנים ע"י קבוצה סגורה: $\operatorname{Cl} A' \subset A \ \wedge \ m(A \setminus A') < \varepsilon$.
(ב) קירוב מבחוץ ע"י קבוצה פתוחה: $A \subset \operatorname{Int}(\tilde{A}) \ \wedge \ m(\tilde{A} \setminus A) < \varepsilon$.

הוכחה. במלבנים, ההוכחה פשוטה (בונים מלבן קטן). במקרה של איחוד סופי של n מלבנים, נקרב באופן זהה כל אחד מהמלבנים בעבור $\frac{\varepsilon}{n}$, ואז נאחד. פנים וסגור אינוריאנטים לאיחוד ולכן סיימנו. ■

"אנחנו לא פיזיקאים" $\sim$ המרצה אחרי שהוא כתב את ההוכחה הזו.

הוכחת 1.3.7. לאיחוד סופי – טרוויאלי. **הרעיון:** במקום להוכיח ש־$x \leqslant y$, נוכיח ש־$\forall \varepsilon : x \leqslant y + \varepsilon$. נקבע $\varepsilon > 0$ כלשהו. מטרתנו להוכיח ש־$m(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$. נחליף את A באלמנטרית $\operatorname{Cl} A' \subset A$ כך ש־$m(A \setminus A') \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$, ובאופן דומה נחליף את A_n באלמנטרית $\tilde{A}_n$ כך ש־$A \subset \operatorname{Int}(\tilde{A}_n)$ ו־$m(\tilde{A}_n \setminus A_n) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$. נשים לב ש־$A'$ פרה־קומפקטית (היא חסומה + היינה־בורל) ולכן:

$$\operatorname{Cl} A' \subset A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \operatorname{Int}(\tilde{A}_n)$$

הקבוצות הפתוחות $\operatorname{Int}(\tilde{A}_1) \dots \operatorname{Int}(\tilde{A}_n)$ כיסוי פתוח של הקומפט $\operatorname{Cl} A'$, ולכן ויש תת־כיסוי סופי $\overline{A'} \subset \bigcup_{r=1}^{\infty}$. עתה, נשתמש בטענה לאיחוד סופי של אלמנטריות:

$$\begin{aligned}
m(A) &= m(A') + m(A \setminus A') \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + m(A') \qquad A' \subset \textstyle\bigcup_{r=1}^{N} \tilde{A}_n \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{r=1}^{N} m(\tilde{A}_n) \\
&\leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[m(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} \right] \\
&= \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} (m(A_n)) \qquad \textstyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

■

מסקנה 1.3.2. אז מה אנחנו יודעים על קבוצות אלמנטריות ב־Ω?
1. הן מהוות אלגברה (סגורות לאיחוד סופי ומשלים)
2. המידה m אדטיבית־סופית עבורן (כלומר $A \cap B = \varnothing \implies m(A \cup B) = m(A) + m(B)$)
3. m היא תת־σ־אדטיבית (כלומר $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \implies m(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$)

(1.3.1) מידה חיצונית

אלו שלושת התכונות היחידות שאנחנו עומדים להשתמש בהן בהגדרת המידה לקבוצות שאינן אלמנטריות. הניסיון הראשון שלנו להגדיר מידה כזו תהיה מידה חיצונית.

הגדרה 1.3.6. תהא $A \subset \mathbb{R}^2$ קבוצה כלשהי. אז המידה החיצונית של A היא:

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} m(P_n) \;\middle|\; A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n \text{ s.t. } {}_nA \text{ אלמנטריים} \right\}$$

הבחנה חשובה היא ש־$\operatorname{Im} m^* = [0, +\infty]$. יש קבוצות שהשטח עבורן "אינסופי".

- **מה טוב?** אכן קבוצות שהיינו מצפים לשטח מסוים יצאו סבירות, לדוגמה השטח של מעגל היחידה הוא π.
- **מה רע?** אם מאמינים באקסיומת הבחירה, ניתן לבנות $A, B \subset I^2$ זרות כך ש־$m^*(A \cup B) < m^*(A) + m^*(B)$

הפתרון של הדבר הרע יהיה לצמצם את m^* לתת קבוצה נחמדה של קבוצות "מדידות".

הערה 5. את הרחבת מושג השטח, אפשר לבסס רק על שלוש התכונות במסקנה 1.3.2.

מסקנה 1.3.3 (תכונות של m^*).
1. אם $A \subset \mathbb{R}^2$ ברת מנייה, אז $m^*(A) = 0$. למה? כי $A = \{x_i\}_{i=1}^{\infty}$, ואז נוכל לכסות את x_i על מלבן אלמנטרי ששטחו $\frac{\varepsilon}{2^i}$, ולקבל $\forall \varepsilon > 0 : m^*(A) \leqslant \varepsilon$.
2. בהגדרה של $m^*(A)$, אפשר להחליף "מלבנים אלמנטריים" ב־"קבוצות אלמנטריות" (כי איחוד בן נייה של קבוצות סופיות הוא בן מנייה).

3. בהגדרה של $m^*(A)$, אפשר להחליף את $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ בתנאי $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A_n}$ או בתנאי $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathrm{Int}(A_n)$
4. עבור קבוצה $A \subset \mathbb{R}^2$ אלמנטרית, מתקיים $m(A) = m^*(A)$.

ההבחנה השנייה, תאפשר לנו בהמשך להגדיר מידה חיצונית נטו בעזרת מעין מידה אלמנטרית (מקיימת את שלושת התכונות) מעל אלגברה נחמדה מספיק.

הוכחה של מסקנה 4. ברור ש־$m^*(A) \leqslant m(A)$ בעבור כיסוי עם איבר 1 – A עצמה. יותר קשה להראות ש־$m^*(A) \geqslant m(A)$, כלומר צ.ל. בהינתן $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ כאשר A_n אלמנטריות, מתקיים $m(A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$. גם כאן התשובה פשוטה, מתת־σ־אדטיביות. ■

"ביטול. אין הפסקה".

דוגמאות של מידה חיצונית.

1. $m^*([0,1))^2 = 1$ (כי זה אלמנטרי)
2. $m^*(I^2) = 1$. חסם תחתון ברור מהסעיף הקודם. החסם העליון כי עבור $\varepsilon > 0$ קל להראות ש־$m^*(A) \leqslant 1 + \varepsilon$ ע"י הכיסוי $[0,1) \cup P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4$ כאשר $P_1 \dots P_4$ מלבנים אלמנטריים סביב צלעות המלבן ממידה $\frac{\varepsilon}{4}$ (העובי שלהם קטן כרצוננו).
3. באופן דומה להוכחה של $P_1 \dots P_4$, ברור ש־$m^*(I) = 0$ בתוך $\mathbb{R}^2$.

משפט 1.3.9. מידה חיצונית היא תת־σ־אדטיבית, כלומר:

$$m^*\left(\overbrace{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n}^{A}\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n)$$

הוכחה. ניקח $\varepsilon > 0$ ונוכיח את הא"ש עד לכדי אפסילון. לכל n, קיימות אלמנטריות $P_{n,1} \dots P_{n,3} \dots \subset \mathbb{R}^2$ כך ש־$A_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_{n,k}$, וכמעט מתקבל ה־$\inf$, כלומר:

$$\sum_{k=1}^{\infty} m^*(P_{n,k}) < m^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n} \xrightarrow{A \subset \bigcup_{n,k} P_{n,k}} m^*(A) \leqslant \sum_{n,k=1}^{\infty} m^*(P_{n,k}) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n)$$

כנדרש. ■

(1.3.2) קבוצות מדידות

בעוד כמה שבועות, נראה A, B ("כלל וכלל לא אלמנטריות") זרות כך ש־$m^*(A \cup B) < m^*(A) + m^*(B)$. זו הבעיה העיקרית במידה חיצונית – זה אמור להיות אדטיבי ביחד לשתי קבוצות זרות.

הפתרון יהיה להצטמצם לקבוצה בשם קבוצת הקבוצות המדידות, שעליהן m^* אדטיבית (מידת איחוד זר היא סכום המידות) "רוב הקבוצות הן מדידות", בהיבט הזה שחייבים להשתמש באקסיומת הבחירה כדי לבנות קבוצות לא מדידות.

לעת עתה, אנחנו עדיין עובדים בתחום תחום קבוע $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ כלשהו.

הגדרה 1.3.7. קבוצה $A \subset \Omega$ נקראת מדידה אם ניתן לקרבה ע"י אלמנטריות, כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיימת אלמנטרית $P_\varepsilon \subset \Omega$ כך ש־$m^*(A \triangle P_\varepsilon) < \varepsilon$.

הערה 6. בלעז, measurable.

הערה 7. יש גישה אלטרנטיבית, שקולה, בה מגדירים את A להיות מדידה אמ"מ לכל B מתקיים ש־$m^*(A) = m^*(A \cup B) + m^*(A \setminus B)$. אנחנו נעבוד עם הגישה המוגדרת לעיל, שהיא הגישה של לבג.

"נוכיח שזה שקול', "יום אחד"

דוגמאות:

1. כל אלמנטרית היא מדידה, ניתנת לקירוב ע"י עצמה.
2. עיגולים הם גם סבבה: עם בנייה מגעילה מספיק אפשר לעשות את זה. ניתן להוכיח בצורה יותר אלגנטית באמצעות קריטריון דרבו לאינטגרביליות רימן. נראה בהמשך שכל פתוחה/סגורה היא מדידה.
3. אם $A \subset \Omega$ קב' בעלת מידה חיצונית 0 היא בהכרח מדידה (ניתן לקרבה עם הקבוצה הריקה).

בתרגיל, נוכיח ש־$d(A,B)=m^*(A\triangle B)$ מקיים את א"ש המשולש וזו פסאודומטריקה. יתרה מכך, הפונקציה $A\to m^*(A)$ רציפה (מליפשיציות).

טענה 1.3.10. אוסף הקבוצות המדידות ב־Ω סגור למשלים ולאיחוד (מהווה אלגברה).

הוכחה. יהיו $A,B\subset\Omega$ מדידות, ונוכיח ש־$A\cup B$ מדיד. יהי $\varepsilon>0$. רוצים למצוא ε־קירוב אלמנטרי ל־$A\cup B$. ישנן אלמנטריות $P_\varepsilon,Q_\varepsilon$ שמקרבות את A,B בהתאמה ברזולוציה של $\frac{\varepsilon}{2}$ (כלומר $m^*(A\triangle P_\varepsilon)<\frac{\varepsilon}{2}$ ו־$m^*(B\triangle P_\varepsilon)<\frac{\varepsilon}{2}$).

נרצה לקרב את $A\cup B$ באמצעות $P_\varepsilon\cup Q_\varepsilon$. ואכן:

$$(A\cup B)\triangle(P_\varepsilon\cup Q_\varepsilon)\subset(A\triangle P_\varepsilon)\cup(B\triangle Q_\varepsilon)$$

ומתת־אדטיביות של m^* קיבלנו ש־$m^*((A\cup B)\triangle(P_\varepsilon\cup Q_\varepsilon))<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$ וסיימנו.

מה לגבי $\Omega\setminus A$? יש אפסילון־קירוב ל־A ע"י P_ε כך ש־$m^*(A\triangle P_\varepsilon)<\varepsilon$. אך $A^c\triangle P_\varepsilon^c=A\triangle P_\varepsilon$ כלומר $m^*(A^c\triangle P_\varepsilon^c)=\varepsilon$ כנדרש. ■

טענה 1.3.11. נניח שיש $A,B\subset\Omega$ מדידות וזרות. אז $m^*(A\cup B)=m^*(A)+m^*(B)$.

הוכחה. א"ש אחד ידוע מתת־אדטיביות של m^*. הכיוון השני (צ.ל. $m^*(A\cup B)\leqslant m^*(A)+m^*(B)$) לאו דווקא ברור.

כדי להוכיח את הא"ש השני, ניקח $\varepsilon>0$ ונסתפק בלהוכיח ש־$m^*(A\cup B)\geqslant m^*(A)+m^*(B)-10\varepsilon$. ממדידות A,B קיימות אלמנטריות $P_\varepsilon,Q_\varepsilon\subset\Omega$ כך ש־$m^*(A\triangle P_\varepsilon),m^*(B\triangle Q_\varepsilon)<\varepsilon$.

[שימו לב שלמרות ש־$A\cap B=\varnothing$, ייתכן ש $P_\varepsilon\cap Q_\varepsilon\neq\varnothing$, אבל אפשר להראות שהחיתוך קטן]

נבחין ש־:

$$P_\varepsilon\cap Q_\varepsilon\subset(P_\varepsilon\setminus A)\cup(Q\varepsilon\setminus B)\subset(P_\varepsilon\triangle A)\cup(Q_\varepsilon\triangle B)$$

לכן $m^*(P_\varepsilon\cap Q_\varepsilon)\leqslant m^*(P_\varepsilon\triangle A)+m^*(Q_\varepsilon\triangle B)<2\varepsilon$. מכיוון ש־$P_\varepsilon,Q_\varepsilon\subset\Omega$ אלמנטריות, אז $m^*(P_\varepsilon)=m(P_\varepsilon)$ וכנ"ל לגבי Q_ε (כאשר m המידה שהגדרנו רק לאלמנטריות, והוכחנו בה אדטיביות סופית) ולכן:

$$m^*(P_\varepsilon\cup Q_\varepsilon)=m^*(P_\varepsilon)+m^*(Q_\varepsilon)-m^*(Q_\varepsilon\cap P_\varepsilon)$$

עבור $x,y\in\mathbb{R}$ נסמן $x\approx y$ אם $|x-y|<\varepsilon$. לעיל הסקנו ש־$m^*(P_\varepsilon\cup Q_\varepsilon)\overset{2\varepsilon}{\approx}m^*(P_\varepsilon)+m^*(Q_\varepsilon)$.

בנוסף, ברור ש־$m^*(A)\approx m^*(P_\varepsilon)$ ו־$m^*(B)\approx m^*(Q_\varepsilon)$.

לגבי $A\cup B$, ראינו בהוכחה הקודמת ש־$m^*[(A\cup B)\triangle(P_\varepsilon\cup Q_\varepsilon)]\leqslant m^*(A\triangle P_\varepsilon)+m^*(B\triangle P_\varepsilon)\leqslant 2\varepsilon$. לכן $m^*(A\cup B)\overset{2\varepsilon}{\approx}m^*(P_\varepsilon\cup Q_\varepsilon)$. נציב למעלה ונקבל:

$$m^*(A\cup B)\overset{2\varepsilon+2\varepsilon+\varepsilon+\varepsilon}{\approx}m^*(A)+m^*(B)$$

ובפרט עד לכדי 10ε כנדרש. ■

מסקנה 1.3.4.
1. אפשר להמשיך באינדוקציה על $A_1\dots A_n$ מדידות וזרות בזוגות ולקבל $m^*(\bigcup A_i)=\sum m^*(A_i)$.
2. עבור $A,B\subset\Omega$ מדידות, נוכל לקבל הכלה והפרדה:

$$m^*(A\cup B)=m^*(A)+m^*(B)-m^*(A\cap B)$$

(כי $m^*(B)=m^*(A\cap B)+m^*(B\setminus A)$ ובאופן דומה על A)

"המשפט הבא הוא פלא". "במידה מסוימת, הקורס הזה הוא הערות למשפט הזה"

משפט 1.3.12 (סיגמה־אדטיביות של המידה)**.** תהיינה $A_1,A_2\dots\subset\Omega$ סדרה בת־מנייה של קבוצות מדידות. אז:
1. איחוד הבן מנייה $\bigcup_{n=1}^\infty A_n$ של קבוצות מדידות הוא מדיד
2. אם הקבוצות זרות בזוגות, אז $m^*\left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n\right)=\sum_{n=1}^\infty m^*(A_n)$

הוכחה. • להוכחת החלק הראשון של המשפט, אפשר להניח בה"כ שהן זרות בזוגות, שכן אפשר תמיד להחליפן ב־:

$$\begin{cases}A_1'=A_1\\A_n'=A_n\setminus\left(\bigcup_{i=1}^{n-1}A_i\right)\end{cases}$$

קיבלנו קבוצות $A_1'\dots A_n'$ זרות, מדידות (קבוצת המדידות היא אלגברה, ו־A_n' מתקבלת ע"י מספר סופי של חיתוכים ואיחודים), ואיחודן אותו הדבר ($\bigcup A_n=\bigcup A_n'$).

- לכל N סופי, ידוע ש־:
$$\sum_{n=1}^{N} m^*(A_n) = m^*\left(\bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) \leqslant m^*(A) < \infty$$
מתת־σ־אדטיביות. לכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n)$ מתכנס, כי סדרת הסכומים החלקיים חסומה (הרגע הוכחנו) ומונוטונית עולה (המידה חיובית). לכן הזנב קטן כרצוננו, כלומר לכל $\varepsilon > 0$ ישנו N_ε כך ש־$\sum_{n=N_\varepsilon}^{\infty} m^*(A_n) < \varepsilon$ (זנב כל טור מתכנס).
- למה $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ מדידה? יהי $\varepsilon > 0$, נמצא קירוב אלמנטרי מתאים. הקבוצה $\bigcup_{n=1}^{N_\varepsilon} A_n$ מדידה, ולכן יש אלמנטרית P_ε שמקרבת אותה $m^*(P_\varepsilon \triangle \bigcup_{n=1}^{N_\varepsilon} A_n) < \varepsilon$. נראה ש־$m^*(P_\varepsilon \triangle A) < 2\varepsilon$. אכן:
$$\begin{aligned} m^*(P_\varepsilon \triangle A) &= m^*\left(P_\varepsilon \triangle \left[\bigcup_{n=1}^{N_\varepsilon} \cup \bigcup_{n=N_\varepsilon+1}^{\infty} A_n\right]\right) \xrightarrow{\text{סאב־אדטיביות}} \\ &= m^*\left(P_\varepsilon \triangle \bigcup_{n=1}^{n_\varepsilon}\right) + m^*\left(\bigcup_{n=N_\varepsilon+1}^{\infty} A_n\right) \\ &= \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \end{aligned}$$
בכך הוכחנו את חלק א' של המשפט.
- עתה, נותר להראות ש־$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A_n)$ כאשר A_n זרות. כיוון אחד יש לנו מתת־σ־אדטיביות. לגבי הכיוון השני, ממונוטוניות. לכל N מתקיים:
$$m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geqslant m^*\left(\bigcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \sum_{n=1}^{N} m^*(A_n)$$
ולכן מסנדוויץ' סיימנו. ■

הגדרה 1.3.8. אוסף תת־קבוצות של Ω הסגור למשלים ולאיחודים בני מנייה, וכן מכיל את הקבוצה הריקה, נקרא σ־אלגברה | (קרי: סיגמא אלגברה).

או במילים אחרות: אלגברה שעובדת גם לאיחודים בני מנייה (ולא רק סופיים).

יש סיגמה־אלגבראות מעוצמת הרצף, אך אין סיגמה־אלגברה (לא סופית) מעוצמה בת־מנייה.

לסיכום, הקבוצות המדידות ב־Ω הוא σ־אלגברה, והמידה החיצונית היא σ־אדטיבית (כלומר היא אינווריאנטית לאיחוד קבוצות זרות).

הגדרה 1.3.9. עבור $A \subset \Omega$ מדידה, מסמנים ב־$m(A) = m^*(A)$, וזו נקראת מידת לבג של A.

זה כמובן מרחיב את ההגדרה הקודמת לקבוצות אלמנטריות. זה לא תלוי ב־Ω (כי מידה חיצונית לא תלויה ב־Ω).

דוגמאות:

1. אם $A_1, A_2 \cdots \subset \Omega$ מדידות, אז גם $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ מדיד (כי יש שימור של איחוד אינסופי ושל משלים, ומכללי דה מורגן, כלומר $\bigcap A_n = \left(\bigcup A_n^c\right)^c$).
2. איחוד בן־מנייה של מלבנים אלמנטריים (או איחוד כל המלבנים הרציונליים שמוכלים בקבוצה מדידה).
3. כל קבוצה פתוחה $A \subset \Omega$ מדידה.
4. כל קבוצה סגורה $A \subset \Omega$ מדידה, זאת כי:
$$\Omega \setminus A = \underbrace{\operatorname{Int}\Omega \setminus A}_{\text{פתוחה}} \cup B$$
כאשר $B \subset \partial\Omega$, ו־$\partial\Omega$ זניחה וממונוטוניות וסגירות לאיחוד סיימנו.

סוף הרצאה 2, תחילת הרצאה 3

(1.3.3) הגדרת מידה מחוץ ל־Ω

כרגע, קובעים מלבן אלמנטרי $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ ועובדים בתוכו. נרצה להתרחב לכל $\mathbb{R}^2$.

מומלץ לקרוא על המאמר של Falconer מ־1986.

תופעה מעניינת: אין קבוצה מדידה שמכילה "חצי מהממשיים בכל סקאלה". הכוונה היא שלא קיימת $A \subset \mathbb{R}$ מדידה כך שלכל $I \subset \mathbb{R}$ מתקיים $m(A \cup I) = \frac{m(I)}{2}$.

כשנרצה להתרחב מחוץ ל־Ω, נרצה להגדיר גם מידה לקבוצות לא חסומות.

הרעיון: נרצף את $\mathbb{R}^2$ עם מלבנים אלמנטריים, לדוגמה באמצעות $[n, n+1) \times [m, m+1)$ לכל $n, m \in \mathbb{Z}$. נסמן את הריבועים בריצוף ב־$\Omega_1, \Omega_2 \dots$ ומן הסתם מתקיים ש־$\mathbb{R}^2 = \biguplus_{i=1}^{\infty} \Omega_i$.

הגדרה 1.3.10. קבוצה $A \subset \mathbb{R}^2$ תקרא מדידה לבג אם $\forall n : A \cap \Omega_n$ מדידה ב־Ω_n, ונגדיר את מידת לבג של A להיות:

$$m(A) \coloneqq \bigcup_{n=1}^{\infty} m(A \cap \Omega_n)$$

תרגיל 1.3.1. נניח ש־Ω_1, Ω_2 מלבנים אלמנטריים, ונניח ש־$A \subset \Omega_1 \cap \Omega_2$. אז אם A מדידה ביחס ל־Ω_1 היא גם מדידה ביחס ל־Ω_2.

מסקנה 1.3.5. הגדרת המדידות לא תלויה בבחירת הריצוף.

טענה 1.3.13. ההגדרה ב־1.3.10 מקיימת את התנאים הבאים:

1. אוסף הקבוצות ב־$\mathbb{R}^2$ הוא σ־אלגברה.
2. אם $A_1, A_2 \dots \subset \mathbb{R}^2$ מדידות וזרות, אז:

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n)$$

הוכחה. 1. ברור ש־$\varnothing$ מדידה (כי $\varnothing \cap \Omega_n = \varnothing$ מדידה ב־Ω_n). סגירות למשלים ברורה כי:

$$\mathbb{R}^2 \setminus A = \biguplus \Omega_n \setminus A$$

ו־$\Omega_n \setminus A$ מדידה לכל n (כי שווה ל־$\Omega_n \setminus (\Omega_n \cap A)$). ישנה סגירות לאיחוד בן־מנייה:

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap \Omega_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} \underbrace{(A_i \cap \Omega_n)}_{\text{מדידה ב־}\Omega_n}$$

2. יהיו $A_1, A_2 \dots$ כמו קודם, ואז:

$$\begin{aligned}
&m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) && \text{מההגדרה} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} m\left(\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap \Omega_n\right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap \Omega_n)\right) && \sigma\text{־אדטיביות ב־}\Omega_n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} m\left(A_i \cap \Omega_n\right) && \text{החלפת סדר סכימה} \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} m\left(A_i \cap \Omega_n\right)\right)
\end{aligned}$$

■

טענה 1.3.14. לכל $A \subset \mathbb{R}^2$ מדידה לבג, מתקיים $m(A) = m^*(A)$

הערה 8. זכרו שמידה חיצונית מוגדרת לכל $\mathbb{R}^2$. ראה 1.3.6.

הוכחה. למה $m(A) \geqslant m^*(A)$? כי:

$$m(A) = \sum_{n=1}^{\infty} m(A \cap \Omega_n) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(A \cap \Omega_n) \geqslant m^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap \Omega_n) \right) = m^*(A)$$

למה $m(A) \leqslant m^*(A)$? מספיק להראות את השוויון $m^*(A) \geqslant \sum_{n=1}^{N} m(A \cap \Omega_n)$ לכל N, ואז לקחת גבול וסיימנו. נקבע מלבן אלמנטרי שמכיל את $\Omega_1 \dots \Omega_n$ (יש מספר סופי, ולכן יש מלבן אלמנטרי שמכיל את כולם). הקבוצה $A \cap \Omega_i$ מדידה ב־Ω לכל i (תרגיל למעלה), לכן $A \cap \Omega = \bigcup_{i=1}^{N} (A \cap \Omega_i)$ מדידה ב־Ω, ו־:

$$m^*(A) \geqslant m^*(A \cap \Omega) m(A \cap \Omega) \geqslant \sum_{i=1}^{N} m(A \cap \Omega_i)$$

כאשר הא"שים לעיל נכונים ממונוטוניות, מדידות ותת־אדטיביות. והוכחנו את הנדרש. ■

בפרט, הגדרת מידת לבג לא תלויה בריצוף.

שאלה: נתונות $A, B \subset \mathbb{R}^2$ מדידות. האם $m(A \cup B) = m(A) + m(B) - m(A \cap B)$?

תשובה: זה לאו דווקא מוגדר היטב. ייתכן שהקבוצות אין־סופיות, ואי אפשר לחסר אינסוף מאינסוף. מה שאפשר להגיד הוא ש־$m(A \cup B) + m(A \cap B) = m(A) + m(B)$.

שאלה: איזה קבוצות מדידות יש ב־$\mathbb{R}^2$? הוכחנו שיש:

- אלמנטריות
- פתוחות (כאיחוד בן מנייה של אלמנטריות) וסגורות
- קבוצות ממידה (חיצונית) אפס
- ועוד

שאלה מתבקשת היא כמה קבוצות מדידות יש ב־$\mathbb{R}^d$.

טענה 1.3.15. יש $2^{\mathfrak{c}}$ קבוצות מדידות ב־$\mathbb{R}^d$.

הוכחה. החסם העליון פשוט, כי $\left|\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)\right| = 2^{\mathfrak{c}}$. נדרש למצוא רק חסם תחתון. נחפש קבוצה מעוצמת הרצף, שכל תת־הקבוצות שלה מדידות. מספיק למצוא קבוצה ממידה אפס, שעוצמתה רצף. ב־$d \geqslant 2$ ההוכחה פשוטה: ניקח פשוט קו ישר. ב־$d = 1$ נוכל להשתמש בקבוצת קנטור. ■

נתבונן בקבוצה החביבה הבאה:

$$A_\varepsilon = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(q_n - \frac{\varepsilon}{2^n}, q + \frac{\varepsilon}{2^n} \right)$$

זו בבירור קבוצה פתוחה, $\mathbb{Q} \subset A_\varepsilon$, ו־$A_\varepsilon \subsetneq \mathbb{R}$ (כי מידתה לכל היותר 2ε סופית מתת־סיגמה אדטיביות. ראינו כבר את זה בעבר). זו קבוצה פתוחה, צפופה ו"קטנה". נוכל להקטין אותה אפילו עוד:

$$A = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_{\frac{1}{k}}$$

זו קבוצה אפילו יותר קטנה (כי $m(A) \leqslant m(A_{\frac{1}{k}}) \leqslant \frac{2}{k} \to 0$), צפופה (כי $\mathbb{Q} \subset A$), והיא גם מעוצמת הרצף (ממשפט הקטגוריה של בייר). הקבוצה A היא קבוצת G_δ.

הגדרה 1.3.11. תהא $A \subset X$ מרחב טופולוגי. A תקרא G_δ אם קיימות $(O_i)_{i=1}^{\infty}$ פתוחות כך ש־$A = \bigcap_{i=1}^{\infty} O_i$, ו־$F_\sigma$ אם קיימות $(F_i)_{i=1}^{\infty}$ סגורות כך ש־$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i$.

תרגיל 1.3.2. חיתוך של σ־אלגבראות הוא σ־אלגברה.

הגדרה 1.3.12. ה־σ של בורל, היא ה־σ־אלגברה המינימלית שמכילה קבוצות פתוחות ב־$\mathbb{R}^d$.

הערה 9. בלעז, Borel.

הערה 10. ה־σ־אלגברה של בורל מוגדרת ביחידות מכיוון שניתן לקחת את החיתוך של כל ה־σ־אלגבראות ולקבל σ־אלגברה מינימלית.

מסתבר שה־σ־אלגברה של בורל קטנה יותר מה־σ־אלגברה של לבג (קבוצת הקבוצות המדידות).

טענה 1.3.16. ה־σ־אלגברה של בורל, היא הקבוצה המורכבת מהקבוצות הבאות:

- קבוצות פתוחות
- קבוצות סגורות
- קבוצות F_σ
- קבוצות G_δ

נרצה לנסח קריטריון למדידות של קבוצות ב־$A \subset \mathbb{R}^2$ שלא מערב ריצוף ספציפי של $\mathbb{R}^2$.

משפט 1.3.17 (תנאי המדידות של Lebesgue)**.** תהא $A \subset \mathbb{R}^2$ קבוצה. אז A מדידה אמ"מ לכל $\varepsilon > 0$ קיימות G פתוחה ו־F סגורה כך ש־$F \subset A \subset G \wedge m(G \setminus F) < \varepsilon$.

הוכחה. $\Longrightarrow$ רוצים להוכיח ש־$A \cap \Omega_n$ מדידה לכל n. נבחר $\Omega := \Omega_n$, ונסמן $A' = A \cap \Omega$. רוצים להראות ש־A' מדידה ב־Ω, כלומר שיש לה קירוב אלמנטרי טוב. יהי $\varepsilon > 0$, ומתנאי המשפט נמצא $F \subset A \subset G$ מתאימות. נתבונן ב־$F' = F \cap |og, G' = G \cap \Omega$. ברור ש־$F', G'$ מדידות ב־Ω (כי $G' \setminus \partial\Omega$ פתוחה ו־$F' \setminus \partial\Omega$ סגורה, והשפה זניחה).

חיתוך של מדידות מדיד ב־$\mathbb{R}^2$ ולכן F', G' מדידות ב־$\mathbb{R}^2$. לכן ל־F', G' יש קירובים אלמנטריים $P_\varepsilon, Q_\varepsilon \subset \Omega$ כך ש־$m^*(F' \triangle P_\varepsilon), m^*(G' \triangle Q_\varepsilon) < \varepsilon$. נבחין ש־$P_\varepsilon$ קירוב טוב:

$$m^*(A' \triangle P_\varepsilon) \leqslant m^*(\underbrace{A' \triangle F'}_{A' \setminus F'}) + m^*(F' \triangle P_\varepsilon) \leqslant m(A \setminus F) + \varepsilon \leqslant m(G \setminus F) + \varepsilon \leqslant 2\varepsilon$$

$\Longleftarrow$ נתון ש־A מדידה, ולכל $\varepsilon > 0$ נרצה למצוא F, G המקיימים את התנאים. נגדיר (לצורך ההוכחה הזו) פנים של מלבן אלמנטרי־פתוח". היה תרגיל לפיו מידה חיצונית אינווריאנטית ביחס ללקיחת פנים.

יהי $\varepsilon > 0$. נבנה פתוחה G כך ש־$m(G \setminus A) < \varepsilon$. לכל $n \in \mathbb{N}$ ידוע ש־$m(A \cap \Omega_n) = m^*(A \cap \Omega_n)$ ולכן מהגדרת המידה החיצונית קיימים מלבנים אלמנטריים פתוחים $P_n^{(1)}, P_n^{(2)} \cdots \subset \Omega_n$ שקרובים לאינפימום כרצוננו ובפרט בקצב מעריכי (ישירות מהגדרת $\inf$ וממדידות), כלומר:

$$A \cap \Omega = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_n^{(i)} \qquad \sum_{i=1}^{\infty} m(P_n^{(i)}) \leqslant \frac{\varepsilon}{2^n} + m(A \cap \Omega_n)$$

נשים לב ש־:

$$\sum_{i=1}^{\infty} m\left(P_n^{(i)} \setminus A\right) \leqslant \frac{\varepsilon}{2^n}$$

כי:

$$m(P_n^i \setminus A) = m(P_n^{(i)}) - m(P_n^{(i)} \cap A)$$

(הכל מתכנס בהחלט) דהיינו:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(m(P_n^{(i)}) - m(P_n^{(i)} \cap A)\right) = \frac{\varepsilon}{2^n} + m(A \cap \Omega_n) - \underbrace{\sum_{i=1}^{\infty} m(P_n^{(i)} \cap A)}_{m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}(P_n^{(i)} \cap A)\right)} = \frac{\varepsilon}{2^n} + \cancel{m(A \cap \Omega_n) - m(A \cap \Omega_n)}$$

(תנסו לצייר את זה, זה אמור להיות יחסית אינטואיטיבי). עתה נגדיר:

$$G := \bigcup_{n,i} P_n^{(i)}$$

זו פתוחה (איחוד פתוחות), שמכילה את A (כי לכל n מתקיים $A \cap \Omega_n \subset \bigcup_{i=1} P_n^{(i)} \subset G$ ובאיחוד מוכלל על n זה אכן מכיל את A). נחשב את $m(G \setminus A)$:

$$m(G \setminus A) = m\left(\bigcup_{n,i} P_n^{(i)} \setminus A\right) \leqslant \sum_{n,i} m(P_n^{(i)} \setminus A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon$$

איך נמצא את F? נחזור על התהליך בעבור $\mathbb{R}^2 \setminus A$, ונקבל לG' פתוחה כך ש־$\mathbb{R}^2 \setminus \subset G'$ וכן $m(G' \setminus (\mathbb{R}^2 \setminus A))) < \varepsilon$ ומכאן קל לראות ש־$F = \mathbb{R}^2 \setminus G'$ מקיימת את הנדרש.

■

מסקנה 1.3.6. תהא $A \subset \mathbb{R}^2$ מדידה. אז:

$$\begin{aligned} m(A) &= \inf\{m(G) | A \subset G \wedge G \text{ open}\} \\ &= \inf\{m(F) | F \subset A \wedge F \text{ closed}\} \end{aligned}$$

הוכחה. ברור ש־$m(A) \leqslant \inf\{\cdots\}$. מהצד השני, לכל $\varepsilon > 0$, G פתוחה ו־F סגורה, נקבל ש־:

$$m(G \setminus A) \leqslant m(G \setminus P) < \varepsilon$$

ולכן $m(G) = m(A) + m(G \setminus A) \leqslant m(A) + \varepsilon$ וסיימנו. הסופרמום באופן דומה. ■

תרגיל 1.3.3. לכל $A \subset \mathbb{R}^d$ מדידה, מתקיים ש־:

$$m(A) = \sup\{m(K) \mid K \subset A \wedge K \text{ compact}\}$$

מסקנה 1.3.7. לכל מדידה $A \subset \mathbb{R}^2$ קיימת $S \subset \mathbb{R}^2$ שמכילה את A והיא G_δ, כך ש־$m(S \setminus A) = 0$.

הוכחה. לכל n יש G_n פתוחה שמכילה את A ו־$m(G_n \setminus A) \leqslant \frac{1}{n}$, ונגדיר:

$$S = \bigcap_{i=1}^{\infty} G_n$$

מהגדרה היא G_n ו־:

$$m(S \setminus A) \leqslant m(G_n \setminus A) \leqslant \frac{1}{n} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

■

בכך סיימנו את בניית מידת לבג ב־$\mathbb{R}^2$.

נבחין במספר תכונות של מידת לבג שמצאנו:

טענה 1.3.18. נניח ש־$A \subset \mathbb{R}^d$ מדידה. אז:

- אם $x \in \mathbb{R}^d$, אז $A + x$ מדידה.
- אם $\lambda \in \mathbb{R}$, אז $m(\lambda A) = |\lambda|^d m(A)$ מדידה.
- אם $T : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ לינארית, אז:

$$m(T(A)) = |\det T| \, m(A)$$

(הוכחה של זה בחדו"א 3q)

2 Lebegue Measure for a Mesuare Space . . . . . .

. . . . . .