

# Les primitives et les dérivées.

Louis Herzog

22 avril 2024

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Établissement des outils indispensables.</b>	<b>1</b>
1.1	Quelques formules de la trigonométrie rectiligne. . . . .	1
1.2	Quelques formules de la trigonométrie hyperbolique. . . . .	1
<b>2</b>	<b>Fonctions trigonométriques et trigonométriques inverses.</b>	<b>2</b>
2.1	La fonction $x \mapsto \cos(x)$ . . . . .	2
2.1.1	Dérivée de la fonction $x \mapsto \cos(x)$ . . . . .	3
2.1.2	Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \cos(x)$ . . . . .	3
2.2	La fonction $x \mapsto \sin(x)$ . . . . .	3
2.2.1	Dérivée de la fonction $x \mapsto \sin(x)$ . . . . .	4
2.2.2	Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \sin(x)$ . . . . .	4
2.3	La fonction $x \mapsto \tan(x)$ . . . . .	4
2.3.1	Dérivée de la fonction $x \mapsto \tan(x)$ . . . . .	5
2.3.2	Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \tan(x)$ . . . . .	5
2.4	La fonction $x \mapsto \operatorname{Arccos}(x)$ . . . . .	5
2.4.1	Calcul de la dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{Arccos}(x)$ . . . . .	5
2.4.2	Calcul de la primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{Arccos}(x)$ . . . . .	6
2.5	La fonction $x \mapsto \operatorname{Arcsin}(x)$ . . . . .	7
2.5.1	Calcul de la dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{Arcsin}(x)$ . . . . .	7
2.5.2	Calcul de la primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{Arcsin}(x)$ . . . . .	8
2.6	La fonction $x \mapsto \operatorname{Arctan}(x)$ . . . . .	8
2.6.1	Calcul de la dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{Arctan}(x)$ . . . . .	8
2.6.2	Calcul de la primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{Arctan}(x)$ . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Fonctions hyperboliques et hyperboliques inverses.</b>	<b>10</b>
3.1	La fonction $x \mapsto \operatorname{ch}(x)$ . . . . .	10

3.1.1	Dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{ch}(x)$ . . . . .	11
3.1.2	Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{ch}(x)$ . . . . .	11
3.2	La fonction $x \mapsto \operatorname{sh}(x)$ . . . . .	11
3.2.1	Dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{sh}(x)$ . . . . .	12
3.2.2	Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{sh}(x)$ . . . . .	12
3.3	La fonction $x \mapsto \operatorname{th}(x)$ . . . . .	12
3.3.1	Dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{th}(x)$ . . . . .	13
3.3.2	Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{th}(x)$ . . . . .	13
3.4	La fonction $x \mapsto \operatorname{Argch}(x)$ . . . . .	13
3.4.1	Dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{Argch}(x)$ . . . . .	14
3.4.2	Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{Argch}(x)$ . . . . .	14
3.5	La fonction $x \mapsto \operatorname{Argsh}(x)$ . . . . .	15
3.5.1	Dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{Argsh}(x)$ . . . . .	16
3.5.2	Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{Argsh}(x)$ . . . . .	16
3.6	La fonction $x \mapsto \operatorname{Argth}(x)$ . . . . .	16
3.6.1	Dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{Argth}(x)$ . . . . .	17
3.6.2	Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{Argth}(x)$ . . . . .	17

#### 4 Récapitulation des résultats 19

4.1	Dérivées, fonctions, primitives des fonctions trigonométriques . . . . .	19
4.2	Dérivées, fonctions, primitives des fonctions trigonométriques inverses . . . . .	19
4.3	Dérivées, fonctions, primitives des fonctions trigonométriques hyperboliques . . . . .	20
4.4	Dérivées, fonctions, primitives des fonctions trigonométriques hyperboliques inverses . . . . .	20

#### 5 Calcul de quelques primitives. 21

5.1	La fonction $x \mapsto \ln(x)$ . . . . .	21
5.1.1	Calcul de la dérivée de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ . . . . .	21
5.1.2	Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ . . . . .	22
5.2	Calcul d'une primitive de $x \mapsto \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}}$ . . . . .	22
5.2.1	Avons nous $\operatorname{Argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ? . . . . .	23
5.3	Calcul d'une primitive de $x \mapsto \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$ . . . . .	24
5.3.1	Avons nous $\operatorname{Argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ ? . . . . .	24

## Résumé

On se propose d'étudier la trigonométrie rectiligne et la trigonométrie hyperbolique. La trigonométrie sphérique ne sera pas abordée dans ce document. On utilise le logiciel SageMath et le paquetage SageTeX du traitement de texte L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

Quelques considérations préliminaires sur le calcul de certaines primitives telles que celles des fonctions  $x \mapsto \operatorname{Arccos}(x)$ ,  $x \mapsto \operatorname{Arcsin}(x)$  ou bien  $x \mapsto \operatorname{Arctan}(x)$  une astuce est indispensable. Elle consiste à procéder à une intégration par parties. En effet, n'ayant aucune idée des primitives, il est raisonnable de changer leurs rôles respectifs et de considérer, non plus la fonction initiale, mais sa dérivée.

Le premier objectif est donc de vérifier si celles-ci existent et sont calculables.

# Chapitre 1

## Établissement des outils indispensables.

### 1.1 Quelques formules de la trigonométrie rectiligne.

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \quad (1.1)$$

$$\sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b) \quad (1.2)$$

$$\cos(a + b) = \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b) \quad (1.3)$$

### 1.2 Quelques formules de la trigonométrie hyperbolique.

Remarque : on passe des formules de la trigonométrie linéaire aux formules de la trigonométrie hyperbolique en remplaçant  $\cos$  par  $\text{ch}$  et  $\sin$  par  $i \cdot \text{sh}$ .

$$(i \cdot \text{sh}(x))^2 + \text{ch}^2(x) = 1$$

$$- \text{sh}^2(x) + \text{ch}^2(x) = 1 \quad (1.4)$$

$$i \cdot \text{sh}(a + b) = i \cdot \text{sh}(a) \text{ch}(b) + \text{ch}(a)(i \cdot \text{sh}(b)) \quad \text{puis en divisant par } i$$

$$\text{sh}(a + b) = \text{sh}(a) \text{ch}(b) + \text{ch}(a) \text{sh}(b) \quad (1.5)$$

$$\text{ch}(a + b) = \text{ch}(a) \text{ch}(b) - (i \cdot \text{sh}(a))(i \cdot \text{sh}(b)) \quad \text{autrement écrit}$$

$$\text{ch}(a + b) = \text{ch}(a) \text{ch}(b) + \text{sh}(a) \text{sh}(b) \quad (1.6)$$

# Chapitre 2

## Fonctions trigonométriques et trigonométriques inverses.


### 2.1 La fonction $x \mapsto \cos(x)$ .

Définissons nos fonctions dans Sage. Soit

$$f(x) = \cos(x)$$

$$g(x) = \text{diff}(f(x), x)$$

$$F(x) = \text{integrate}(f(x), x)$$



La représentation graphique de  $x \mapsto \cos(x)$  sur l'intervalle  $[-\pi, \pi]$ .

La fonction est paire et périodique de période  $2\pi$ .

### 2.1.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto \cos(x)$ .

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x)\cos(h) - \sin(x)\sin(h) - \cos(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{\cos(x)(\cos(h) - 1)}{h} - \frac{\sin(x)\sin(h)}{h} \right) \\ &= \cos(x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} - \sin(x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \\ &= -\sin x\end{aligned}$$

### 2.1.2 Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \cos(x)$ .


Dans la section suivante, on calcule la dérivée de la fonction  $x \mapsto \sin(x)$  qui vaut  $x \mapsto \cos(x)$ , par conséquent une primitive de  $x \mapsto \cos(x)$  est égale, à une constante près, à  $\sin(x) + C^{ste}$ .

**On vérifie ce résultat avec Sage.** Une primitive de la fonction  $x \mapsto \cos(x)$  est la fonction  $x \mapsto \sin(x) + C^{ste}$  définie à une constante près.

## 2.2 La fonction $x \mapsto \sin(x)$ .

Définissons nos fonctions dans Sage

```
f(x) = sin(x)
g(x) = diff(f(x), x)
F(x) = integrate(f(x), x)
```



La représentation graphique de  $x \mapsto \sin(x)$  sur l'intervalle  $[-\pi, \pi]$ .

La fonction est impaire et périodique de période  $2\pi$ .

### 2.2.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto \sin(x)$ .

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x)\cos(h) + \cos(x)\sin(h) - \sin(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{\sin(x)(\cos(h) - 1)}{h} + \frac{\cos(x)\sin(h)}{h} \right) \\ &= \sin(x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \\ &= \cos x\end{aligned}$$

### 2.2.2 Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \sin(x)$ .


Dans la section précédente, on a calculé la dérivée de la fonction  $x \mapsto \cos(x)$  qui vaut  $x \mapsto -\sin(x)$ , par conséquent une primitive de  $x \mapsto \sin(x)$  est égale, à une constante près, à  $-\cos(x) + C^{ste}$ .

**On vérifie ce résultat avec Sage.** Une primitive de  $\sin(x)$  est  $-\cos(x) + C^{ste}$  définie à une constante près.

## 2.3 La fonction $x \mapsto \tan(x)$ .

Définissons nos fonctions dans Sage

```
f(x) = tan(x)
g(x) = diff(f(x), x)
F(x) = integrate(f(x), x)
```



La représentation graphique de  $x \mapsto \tan(x)$  sur l'intervalle ouvert  $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ .

La fonction  $x \mapsto \tan(x)$  étant périodique de période  $\pi$ , on choisit de restreindre le domaine de définition à l'intervalle ouvert  $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ .



### 2.3.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto \tan(x)$ .

$$\begin{aligned}\tan(x)' &= \left( \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right)' \\ &= \frac{\cos(x) \times \cos(x) - (-\sin(x)) \times \sin(x)}{\cos^2(x)} \\ &= \frac{\cos(x) \times \cos(x) + \sin(x) \times \sin(x)}{\cos^2(x)} \\ &= \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)\end{aligned}$$

**On vérifie ce résultat avec Sage.** La dérivée de  $\tan(x) = \tan(x)^2 + 1$ .

### 2.3.2 Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \tan(x)$ .

On a  $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ , alors  $\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx$ .

Je pose  $u(x) = \cos(x)$  donc  $u'(x) = -\sin(x) dx$  et par ce changement de variable on a  $\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = -\int \frac{u'}{u} = -\ln|u| = \ln\left(\frac{1}{|u|}\right) = \ln\left(\frac{1}{|\cos(x)|}\right) + C^{ste}$ .

Or, on a choisi le domaine de définition de la fonction  $x \mapsto \tan(x)$  restreint à l'intervalle ouvert  $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ , par conséquent  $\cos(x)$  est positif sur cet intervalle donc  $|\cos(x)| = \cos(x)$ .

Finalement,  $\ln\left(\frac{1}{\cos(x)}\right) + C^{ste}$  est une primitive de  $x \mapsto \tan(x)$ .

**On vérifie ce résultat avec Sage.** Une primitive de  $\tan(x)$  est la fonction définie à une constante près  $x \mapsto \log(\sec(x)) + C^{ste}$ . Sage utilise la fonction  $x \mapsto \sec$  qui est la fonction paire  $x \mapsto \frac{1}{\cos(x)}$  périodique de période  $2\pi$  définie sur  $\mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ . On retrouve bien le résultat précédent.

## 2.4 La fonction $x \mapsto \text{Arccos}(x)$ .

La restriction de la fonction  $x \mapsto \cos(x)$  à l'intervalle  $[0, \pi]$  est une bijection de  $[0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ . Il existe donc une fonction réciproque à la fonction  $x \mapsto \cos(x)$  que l'on nomme  $x \mapsto \text{Arccos}(x)$ . C'est également une bijection, elle est continue sur l'intervalle fermé  $[-1, 1]$  et est dérivable sur l'intervalle ouvert  $] -1, 1[$ .

### 2.4.1 Calcul de la dérivée de la fonction $x \mapsto \text{Arccos}(x)$ .

Définissons nos fonctions dans Sage

$$f(x) = \arccos(x)$$

$$g(x) = \text{diff}(f(x), x)$$

$$F(x) = \text{integrate}(f(x), x)$$


Pour ce faire, il faut utiliser le calcul de la dérivée d'une fonction composée. On a  $\cos(\text{Arccos}(x)) = x$ , par conséquent la dérivée de cette expression s'exprime par  $-\sin(\text{Arccos}(x)) \times \text{Arccos}'(x) = 1$ , d'où  $\text{Arccos}'(x) = \frac{-1}{\sin(\text{Arccos}(x))}$ .

La difficulté est maintenant de déterminer  $\sin(\text{Arccos}(x))$ , or on sait que pour tout  $X \in \mathbb{R}$ , on a  $\sin^2(X) + \cos^2(X) = 1$ , d'où  $\sin(X) = \sqrt{1 - \cos^2(X)}$ .

En remplaçant  $X$  par  $\text{Arccos}(x)$ , on a  $\sin(\text{Arccos}(x)) = \sqrt{1 - \cos^2(\text{Arccos}(x))} = \sqrt{1 - x^2}$ .

Finalement,  $\text{Arccos}'(x) = \frac{-1}{\sin(\text{Arccos}(x))} = \frac{-1}{\sqrt{1 - \cos^2(\text{Arccos}(x))}} = \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$ .

**On vérifie ce résultat avec Sage.** La dérivée de la fonction  $\text{Arccos}(x)$  est la fonction  $x \mapsto -\frac{1}{\sqrt{-x^2 + 1}}$ , ce que l'on retrouve sous une écriture légèrement modifiée de Sage.



Les représentations graphiques de  $x \mapsto \text{Arccos}(x)$  et de  $x \mapsto \cos(x)$ .

On peut maintenant entreprendre le calcul de la primitive de la fonction  $x \mapsto \text{Arccos}(x)$ .

## 2.4.2 Calcul de la primitive de la fonction $x \mapsto \text{Arccos}(x)$ .

Je pose que  $u(x)$  est égal à la fonction  $\text{Arccos}(x)$  et  $v'(x)$  est égal  $dx$  d'où  $u'(x)$  est égal à la fonction  $\frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}}$  et  $v(x)$  est égal  $x$ . Alors on a, par une intégration par parties,  $\int \text{Arccos}(x) dx = x \times \text{Arccos}(x) - \int \frac{-1}{\sqrt{1 - x^2}} \times x dx = x \text{Arccos}(x) + \int \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$ .

**Calcul de**  $\int \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$ .  $\int \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \frac{-1}{2} \int \frac{d(1 - x^2)}{\sqrt{1 - x^2}} = -\sqrt{1 - x^2}$ .

Finalement,  $\int \text{Arccos}(x) dx = x \text{Arccos}(x) - \sqrt{1 - x^2} + C^{\text{ste}}$  est une primitive de la fonction  $x \mapsto \text{Arccos}(x)$ .

**On vérifie ce résultat avec Sage.** Une primitive de  $\text{Arccos}(x) = x \text{Arccos}(x) - \sqrt{-x^2 + 1} + C^{\text{ste}}$ .

## 2.5 La fonction $x \mapsto \text{Arcsin}(x)$ .

La restriction de la fonction  $x \mapsto \sin(x)$  à l'intervalle  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  est une bijection de  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ . Il existe donc une fonction réciproque à la fonction  $x \mapsto \sin(x)$  que l'on nomme  $x \mapsto \text{Arcsin}(x)$ . C'est également une bijection, elle est continue sur l'intervalle fermé  $[-1, 1]$  et est dérivable sur l'intervalle ouvert  $] -1, 1[$ .

### 2.5.1 Calcul de la dérivée de la fonction $x \mapsto \text{Arcsin}(x)$ .

Définissons nos fonctions dans Sage

```
f(x) = arcsin(x)
g(x) = diff(f(x), x)
F(x) = integrate(f(x), x)
```


Pour ce calcul, il faut utiliser le calcul de la dérivée d'une fonction composée. On a  $\sin(\text{Arcsin}(x)) = x$ , par conséquent la dérivée de cette expression s'exprime par  $\cos(\text{Arcsin}(x)) \times \text{Arcsin}'(x) = 1$ , d'où  $\text{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\cos(\text{Arcsin}(x))}$ .

La difficulté est maintenant de déterminer  $\cos(\text{Arcsin}(x))$ , or on sait que pour tout  $X \in \mathbb{R}$ , on a  $\sin^2(X) + \cos^2(X) = 1$ , d'où  $\cos(X) = \sqrt{1 - \sin^2(X)}$ .

En remplaçant  $X$  par  $\text{Arcsin}(x)$ , on a  $\cos(\text{Arcsin}(x)) = \sqrt{1 - \sin^2(\text{Arcsin}(x))} = \sqrt{1 - x^2}$ .

Finalement,  $\text{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\cos(\text{Arcsin}(x))} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\text{Arcsin}(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$ .

**On vérifie ce résultat avec Sage.** La dérivée de  $\text{Arcsin}(x) = \frac{1}{\sqrt{-x^2 + 1}}$ .



Les représentations graphiques de  $x \mapsto \text{Arcsin}(x)$  et de  $x \mapsto \sin(x)$ .

On peut maintenant entreprendre le calcul de la primitive de la fonction  $x \mapsto \text{Arcsin}(x)$ .

## 2.5.2 Calcul de la primitive de la fonction $x \mapsto \text{Arcsin}(x)$ .

Je pose que  $u(x)$  est égal à la fonction  $\text{Arcsin}(x)$  et  $v'(x)$  est égal  $dx$  d'où  $u'(x)$  est égal à la fonction  $\text{Arcsin}(x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  et  $v(x)$  est égal  $x$ . Alors on a  $\int \text{Arcsin}(x) dx = x \times \text{Arcsin}(x) - \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \times x dx$ .

**Calcul de**  $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ .  $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = \sqrt{1-x^2}$ .

Finalement, une primitive de la fonction  $x \mapsto \text{Arcsin}(x)$  est une fonction  $x \mapsto x \text{Arcsin}(x) - \sqrt{1-x^2} + C^{ste}$ .

**On vérifie ce résultat avec Sage.** Une primitive de la fonction  $\text{Arcsin}(x) = x \text{Arcsin}(x) + \sqrt{-x^2+1} + C^{ste}$ .

## 2.6 La fonction $x \mapsto \text{Arctan}(x)$ .

La restriction de la fonction  $x \mapsto \tan(x)$  à l'intervalle  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  est une bijection de  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ . Il existe donc une fonction réciproque à la fonction  $x \mapsto \tan(x)$  que l'on nomme  $x \mapsto \text{Arctan}(x)$ . C'est également une bijection, elle est continue sur l'intervalle fermé  $[-1, 1]$  et est dérivable sur l'intervalle ouvert  $] -1, 1[$ .

### 2.6.1 Calcul de la dérivée de la fonction $x \mapsto \text{Arctan}(x)$ .

Définissons nos fonctions dans Sage

$$f(x) = \arctan(x)$$

$$g(x) = \text{diff}(f(x), x)$$


$$F(x) = \text{integrate}(f(x), x)$$

Pour ce calcul, il faut utiliser le calcul de la dérivée d'une fonction composée. On a  $\tan(\text{Arctan}(x)) = x$ , par conséquent la dérivée de cette expression s'exprime par  $\tan'(\text{Arctan}(x)) \times \text{Arctan}'(x) = 1$ , d'où  $\text{Arctan}'(x) = \frac{1}{\tan'(\text{Arctan}(x))}$ .

La difficulté est maintenant de déterminer  $\tan'(\text{Arctan}(x))$ , or on sait que pour tout  $X \in \mathbb{R}$ , on a  $\tan'(X) = 1 + \tan^2(X)$ , avec  $X = \text{Arctan}(x)$  d'où  $\tan'(\text{Arctan}(x)) = 1 + x^2$ .

Finalement,  $\text{Arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ .

**On vérifie ce résultat avec Sage.** La dérivée de  $\text{Arctan}(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ .



Les représentations graphiques de  $x \mapsto \text{Arctan}(x)$  et de  $x \mapsto \tan(x)$ .

On peut maintenant entreprendre le calcul de la primitive de la fonction  $x \mapsto \text{Arctan}(x)$ .

### 2.6.2 Calcul de la primitive de la fonction $x \mapsto \text{Arctan}(x)$ .

Je pose que  $u(x)$  est égal à la fonction  $\text{Arctan}(x)$  et  $v'(x)$  est égal  $dx$  d'où  $u'(x)$  est égal à la fonction  $\frac{1}{1+x^2}$  et  $v(x)$  est égal  $x$ . Alors on a  $\int \text{Arctan}(x) dx = x \times \text{Arctan}(x) - \int \frac{1}{1+x^2} \times x dx$ .

**Calcul de**  $\int \frac{x}{1+x^2} dx$ .  $\int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = \frac{1}{2} \ln |1+x^2|$ .

D'où  $\int \text{Arctan}(x) dx = x \text{Arctan}(x) - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + C^{ste}$ . Finalement, une primitive de la fonction  $x \mapsto \text{Arctan}(x)$  est une fonction  $x \mapsto x \text{Arctan}(x) - \ln \left( \sqrt{1+x^2} \right) + C^{ste}$  ou encore  $x \mapsto x \text{Arctan}(x) + \ln \left( \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C^{ste}$ .

**On vérifie ce résultat avec Sage.** Une primitive de  $\text{Arctan}(x) = x \text{Arctan}(x) - \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) + C^{ste}$ .

# Chapitre 3

## Fonctions hyperboliques et hyperboliques inverses.

On passe des formules de trigonométrie aux formules de trigonométries hyperboliques en remplaçant  $\cos$  par  $\text{ch}$  et  $\sin$  par  $i.\text{sh}$ . Par exemple pour  $\cos^2 + \sin^2 = 1$  nous obtenons  $(\text{ch})^2 + (i.\text{sh})^2 = (\text{ch})^2 - (\text{sh})^2 = 1$  et pour  $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$ , nous obtenons  $\text{ch}(a+b) = \text{ch}(a)\text{ch}(b) - i.\text{sh}(a)i.\text{sh}(b)$  c'est-à-dire  $\text{ch}(a+b) = \text{ch}(a)\text{ch}(b) - (i)^2 \text{sh}(a)\text{sh}(b)$ .

Finalement, on a  $\text{ch}(a+b) = \text{ch}(a)\text{ch}(b) + \text{sh}(a)\text{sh}(b)$ . On change de signe !


### 3.1 La fonction $x \mapsto \text{ch}(x)$ .

Définissons nos fonctions dans Sage

$$f(x) = \cosh(x)$$

$$g(x) = \text{diff}(f(x), x)$$

$$F(x) = \text{integrate}(f(x), x)$$



La représentation graphique de  $x \mapsto \text{ch}(x)$  et de sa dérivée.

### 3.1.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto \text{ch}(x)$ .

$$\begin{aligned}\text{ch}(x)' &= \left( \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2} \right)' \\ &= \frac{\exp(x)' + \exp(-x)'}{2} \\ &= \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} \\ &= \text{sh}(x)\end{aligned}$$

### 3.1.2 Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \text{ch}(x)$ .


$$\int \text{ch}(x) dx = \int \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2} dx = \frac{1}{2} \times \int \exp(x) dx + \frac{1}{2} \times \int \exp(-x) dx = \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} = \text{sh}(x) + C^{\text{ste}}$$

On vérifie ce résultat avec Sage. Une primitive de  $\text{ch}(x) = \text{sh}(x) + C^{\text{ste}}$ .

## 3.2 La fonction $x \mapsto \text{sh}(x)$ .

Définissons nos fonctions dans Sage

```
f(x) = sinh(x)
g(x) = diff(f(x), x)
F(x) = integrate(f(x), x)
```



La représentation graphique de  $x \mapsto \text{sh}(x)$  et de sa dérivée.

### 3.2.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto \text{sh}(x)$ .

$$\begin{aligned}\text{sh}(x)' &= \left( \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} \right)' \\ &= \frac{\exp(x)' - \exp(-x)'}{2} \\ &= \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2} \\ &= \text{ch}(x)\end{aligned}$$

### 3.2.2 Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \text{sh}(x)$ .


$$\int \text{sh}(x) dx = \int \frac{\exp(x) - \exp(-x)}{2} dx = \frac{1}{2} \times \left( \int \exp(x) dx - \int \exp(-x) dx \right) = \frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2} = \text{ch}(x) + C^{\text{ste}}$$

On vérifie ce résultat avec Sage. Une primitive de  $\text{sh}(x) = \text{ch}(x) + C^{\text{ste}}$ .

## 3.3 La fonction $x \mapsto \text{th}(x)$ .

Définissons nos fonctions dans Sage

```
f(x) = tanh(x)
g(x) = diff(f(x), x)
F(x) = integrate(f(x), x)
```



La représentation graphique de  $x \mapsto \text{th}(x)$  et de sa dérivée.



### 3.3.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{th}(x)$ .

$$\begin{aligned}(\operatorname{th}(x))' &= \left( \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)} \right)' \\&= \frac{\operatorname{sh}(x)' \times \operatorname{ch}(x) - \operatorname{ch}(x)' \times \operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)^2} \\&= \frac{\operatorname{ch}(x)^2 - \operatorname{sh}(x)^2}{\operatorname{ch}(x)^2} \\&= \frac{1}{\operatorname{ch}(x)^2}\end{aligned}$$

### 3.3.2 Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{th}(x)$ .

$$\begin{aligned}\int \operatorname{th}(x) &= \int \frac{\operatorname{ch}(x)}{\operatorname{sh}(x)} \\&= \int \frac{du(x)}{u(x)}, \quad \text{en posant } u(x) = \operatorname{ch}(x) \text{ et donc } du(x) = \operatorname{sh}(x) \\&= \ln |u(x)| = \ln |\operatorname{ch}(x)| \quad \text{or } \operatorname{ch}(x) > 0 \text{ sur } \mathbb{R}, \text{ donc} \\&= \ln(\operatorname{ch}(x)) + C^{ste}\end{aligned}$$

**On vérifie ce résultat avec Sage.** Une primitive de  $\operatorname{th}(x) = \log(\operatorname{ch}(x)) + C^{ste}$ .


## 3.4 La fonction $x \mapsto \operatorname{Argch}(x)$ .

Définissons nos fonctions dans Sage

```
f(x) = arccosh(x)
g(x) = diff(f(x), x)
F(x) = integrate(f(x), x)
```

Le cosinus hyperbolique, noté  $\operatorname{ch}$  est défini sur  $\mathbb{R}$  selon l'expression  $\frac{\exp(x) + \exp(-x)}{2}$ , son domaine de valeurs est  $[1, +\infty[$  c'est une fonction paire c'est-à-dire  $\operatorname{ch}(-x) = \operatorname{ch}(x)$ .

La fonction  $x \mapsto \operatorname{ch}(x)$  est inversible sur le domaine de définition restreint à  $\mathbb{R}^+$ , car elle y est bijective, son inverse est notée «  $\operatorname{Argch}$  » et définit la fonction « *argument cosinus hyperbolique* » telle que  $x \mapsto \operatorname{Argch}(x)$ .



La représentation graphique de  $x \mapsto \text{Arg ch}(x)$ .

On observe que la fonction est croissante, continue sur  $[1, +\infty[$  et dérivable sur l'intervalle ouvert  $]1, +\infty[$ .

### 3.4.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto \text{Arg ch}(x)$ .

On a la fonction composée  $\text{Id} = \text{ch} \circ \text{Arg ch}$  telle que  $x \mapsto \text{ch}(\text{Arg ch}(x)) = x$  dont la dérivée s'écrit alors  $1 = \text{Arg ch}' \times \text{ch}' \circ \text{Arg ch}$ .

$x = \text{ch}(\text{Arg ch}(x))$  en dérivant, on a

$1 = \text{Arg ch}'(x) \times \text{ch}' \circ \text{Arg ch}(x)$  d'où

$$\text{Arg ch}'(x) = \frac{1}{\text{ch}' \circ \text{Arg ch}(x)} = \frac{1}{\text{sh}(\text{Arg sh}(x))} \quad \text{or, on sait que}$$

$1 = \text{ch}^2(\text{Arg ch}(x)) - \text{sh}^2(\text{Arg ch}(x))$  alors

$$\text{sh}(\text{Arg ch}(x)) = \sqrt{\text{ch}^2(\text{Arg ch}(x)) - 1} = \sqrt{x^2 - 1} \quad \text{finalement}$$

$$\text{Arg ch}'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{on vérifie ce calcul avec Sage.}$$

**On vérifie ce résultat avec Sage.** La dérivée de  $\text{arcosh}(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}\sqrt{x-1}}$ .


### 3.4.2 Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \text{Arg ch}(x)$ .

Pour calculer  $\int \text{Arg ch}(x) dx$ , on procède par une intégration par parties en posant  $u(x) = \text{Arg ch}(x)$  et  $v'(x) = dx$ , d'où  $u'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$  et  $v(x) = x$ .

On a donc

$$\begin{aligned} \int \text{Arg ch}(x) dx &= x \text{Arg ch}(x) - \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx \quad \text{or} \\ \int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} dx &= \int \left( \sqrt{x^2 - 1} \right)' dx = \sqrt{x^2 - 1} \quad \text{d'où} \\ \int \text{Arg ch}(x) dx &= x \text{Arg ch}(x) - \sqrt{x^2 - 1} + C^{\text{ste}} \end{aligned}$$

On vérifie ce résultat avec Sage. Une primitive de  $\operatorname{arcosh}(x) = x \operatorname{arcosh}(x) - \sqrt{x^2 - 1} + C^{ste}$ .




Les représentations graphiques respectivement de  $x \mapsto \operatorname{Argch}(x)$ , de sa dérivée et de sa primitive.

### 3.5 La fonction $x \mapsto \operatorname{Argsh}(x)$ .

Définissons nos fonctions dans Sage

```
f(x) = arcsinh(x)
g(x) = diff(f(x), x)
F(x) = integrate(f(x), x)
```

La fonction  $x \mapsto \operatorname{sh}(x)$  est inversible sur son domaine de définition  $\mathbb{R}$ , car elle y est bijective, son inverse est notée «  $\operatorname{Argsh}$  » et définit la fonction « *argument sinus hyperbolique* » telle que  $x \mapsto \operatorname{Argsh}(x)$ .



La représentation graphique de  $x \mapsto \operatorname{Argsh}(x)$ .

On observe que la fonction est croissante, impaire  $\operatorname{Argsh}(-x) = -\operatorname{Argsh}(x)$  et on observe que la fonction est continue et dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

### 3.5.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{Argsh}(x)$ .

On a la fonction composée  $\operatorname{Id} = \operatorname{sh} \circ \operatorname{Argsh}$  telle que  $x \mapsto \operatorname{sh}(\operatorname{Argsh}(x)) = x$  dont la dérivée s'écrit alors  $1 = \operatorname{Argsh}'(x) \times \operatorname{sh}' \circ \operatorname{Argsh}$ .

$x = \operatorname{sh}(\operatorname{Argsh}(x))$  (x) en dérivant, on a

$1 = \operatorname{Argsh}'(x) \times \operatorname{sh}' \circ \operatorname{Argsh}(x)$  d'où

$$\operatorname{Argsh}'(x) = \frac{1}{\operatorname{sh}' \circ \operatorname{Argsh}(x)} = \frac{1}{\operatorname{ch} \circ \operatorname{Argsh}(x)} \quad \text{or}$$

$$\operatorname{ch}(\operatorname{Argsh}(x)) = \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2(\operatorname{Argsh}(x))} = \sqrt{1 + x^2} \quad \text{donc}$$

$$\operatorname{Argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

**On vérifie ce résultat avec Sage.** La dérivée de  $\operatorname{arsinh}(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ .

### 3.5.2 Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{Argsh}(x)$ .

Pour calculer  $\int \operatorname{Argsh}(x) dx$ , on procède par une intégration par parties en posant  $u(x) = \operatorname{Argsh}(x)$  et  $v'(x) = dx$ , d'où  $u'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$  et  $v(x) = x$ .




On a donc

$$\int \operatorname{Argsh}(x) dx = x \operatorname{Argsh}(x) - \int \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} dx \quad \text{or}$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} dx = \int (\sqrt{1 + x^2})' dx = \sqrt{1 + x^2} \quad \text{d'où}$$

$$\int \operatorname{Argsh}(x) dx = x \operatorname{Argsh}(x) - \sqrt{1 + x^2} + C^{ste} \quad \text{que l'on retrouve avec Sage.}$$

**On vérifie ce résultat avec Sage.** Une primitive de  $\operatorname{arsinh}(x) = x \operatorname{arsinh}(x) - \sqrt{x^2 + 1} + C^{ste}$ .



Les représentations graphiques respectivement de  $x \mapsto \operatorname{Argsh}(x)$ , de sa dérivée et de sa primitive.

## 3.6 La fonction $x \mapsto \operatorname{Argth}(x)$ .


Définissons nos fonctions dans Sage

$$f(x) = \operatorname{arctanh}(x)$$

$$g(x) = \operatorname{diff}(f(x), x)$$

$$F(x) = \operatorname{integrate}(f(x), x)$$

La fonction  $x \mapsto \operatorname{th}(x)$  est inversible sur son domaine de définition  $\mathbb{R}$ , car elle y est bijective, son inverse est notée «  $\operatorname{Argth}$  » et définit la fonction « *argument tangente hyperbolique* » telle que  $x \mapsto \operatorname{Argth}(x)$ .



La représentation graphique de  $x \mapsto \operatorname{Argth}(x)$ .

On observe que la fonction est croissante, impaire  $\operatorname{Argth}(-x) = -\operatorname{Argth}(x)$  et on observe que la fonction est continue et dérivable sur l'intervalle ouvert  $] -1, 1[$ .

### 3.6.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto \operatorname{Argth}(x)$ .

On a la fonction composée  $\operatorname{Id} = \operatorname{th} \circ \operatorname{Argth}$  telle que  $x \mapsto \operatorname{th}(\operatorname{Argth}(x)) = x$  dont la dérivée s'écrit alors  $1 = \operatorname{Argth}'(x) \times \operatorname{th}' \circ \operatorname{Argth}$ .

$x = \operatorname{th}(\operatorname{Argth}(x))(x)$  en dérivant, on a

$1 = \operatorname{Argth}'(x) \times \operatorname{th}' \circ \operatorname{Argth}(x)$  d'où

$$\operatorname{Argth}'(x) = \frac{1}{\operatorname{th}' \circ \operatorname{Argth}(x)} \quad \text{or, la dérivée de th vaut}$$

$$\operatorname{th}' = 1 - \operatorname{th}^2 \quad \text{donc}$$

$$\operatorname{th}'(\operatorname{Argth}(x)) = 1 - \operatorname{th}^2(\operatorname{Argth}(x)) = 1 - x^2 \quad \text{finalement}$$

$$\operatorname{Argth}'(x) = \frac{1}{1 - x^2}$$

**On vérifie ce résultat avec Sage.** La dérivée de  $\operatorname{artanh}(x) = -\frac{1}{x^2 - 1}$ .


### 3.6.2 Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \operatorname{Argth}(x)$ .

Pour calculer  $\int \operatorname{Argth}(x) dx$ , je procède par une intégration par parties en posant  $u(x) = \operatorname{Argth}(x)$  et  $v'(x) = dx$ , d'où  $u'(x) = \frac{1}{1 - x^2}$  et  $v(x) = x$ .

On a donc

$$\begin{aligned} \int \operatorname{Arth}(x) dx &= x \operatorname{Arth}(x) - \int \frac{x}{1-x^2} dx \quad \text{on reconnaît dans} \\ - \int \frac{x}{1-x^2} dx &= -\frac{1}{-2} \int \frac{d(1-x^2)}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{1-x^2} dx \quad \text{d'où} \\ \int \operatorname{Arth}(x) dx &= x \operatorname{Arth}(x) + \frac{1}{2} \ln|1-x^2| + C^{ste} \quad \text{or } x \in ]-1, 1[ \\ \int \operatorname{Arth}(x) dx &= x \operatorname{Arth}(x) + \frac{1}{2} \ln(1-x^2) + C^{ste} \quad \text{que l'on retrouve avec Sage.} \end{aligned}$$

**On vérifie ce résultat avec Sage.** Une primitive de  $\operatorname{artanh}(x) = x \operatorname{artanh}(x) + \frac{1}{2} \log(-x^2 + 1) + C^{ste}$ .



Les représentations graphiques respectivement de  $x \mapsto \operatorname{Arth}(x)$ , de sa dérivée et de sa primitive.

# Chapitre 4

## Récapitulation des résultats

### 4.1 Dérivées, fonctions, primitives des fonctions trigonométriques

dérivée	fonction	primitive
$x \mapsto -\sin(x)$	$x \mapsto \cos(x)$	$\sin(x) + C^{ste}$
$x \mapsto \cos(x)$	$x \mapsto \sin(x)$	$-\cos(x) + C^{ste}$
$x \mapsto 1 + \tan^2(x)$	$x \mapsto \tan(x)$	$-\ln  \cos(x)  + C^{ste}$

### 4.2 Dérivées, fonctions, primitives des fonctions trigonométriques inverses

dérivée	fonction	primitive
$x \mapsto \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \mapsto \operatorname{Arccos}(x)$	$x \operatorname{Arccos}(x) - \sqrt{1-x^2} + C^{ste}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \mapsto \operatorname{Arcsin}(x)$	$x \operatorname{Arcsin}(x) + \sqrt{1-x^2} + C^{ste}$
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$x \mapsto \operatorname{Arctan}(x)$	$x \operatorname{Arctan}(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C^{ste}$

## 4.3 Dérivées, fonctions, primitives des fonctions trigonométriques hyperboliques

dérivée	fonction	primitive
$x \mapsto \text{sh}(x)$	$x \mapsto \text{ch}(x)$	$\text{sh}(x) + C^{ste}$
$x \mapsto \text{ch}(x)$	$x \mapsto \text{sh}(x)$	$\text{ch}(x) + C^{ste}$
$x \mapsto 1 - \text{th}^2(x)$	$x \mapsto \text{th}(x)$	$\ln(\text{ch}(x)) + C^{ste}$

## 4.4 Dérivées, fonctions, primitives des fonctions trigonométriques hyperboliques inverses

dérivée	fonction	primitive
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$	$x \mapsto \text{Arg ch}(x)$	$x \text{ Arg ch}(x) - \sqrt{x^2 - 1} + C^{ste}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$	$x \mapsto \text{Arg sh}(x)$	$x \text{ Arg sh}(x) - \sqrt{x^2 + 1} + C^{ste}$
$x \mapsto \frac{1}{1 - x^2}$	$x \mapsto \text{Arg th}(x)$	$x \text{ Arg th}(x) + \frac{1}{2} \ln(1 - x^2) + C^{ste}$



# Chapitre 5

## Calcul de quelques primitives.

### 5.1 La fonction $x \mapsto \ln(x)$ .

Définissons la fonction dans Sage.

$$f(x) = \ln(x)$$

$$g(x) = \text{diff}(f(x), x, 1)$$

$$F(x) = \text{integrate}(f(x), x)$$

$$\begin{aligned}\int \ln(x) &= \int \ln(x) \times 1 \\ &= x \times \ln(x) - \int \ln(x)' \times x dx \\ &= x \times \ln(x) - \int dx \\ &= x \ln(x) - x + C^{ste}\end{aligned}$$

#### 5.1.1 Calcul de la dérivée de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ .

**Première Méthode** Passons par les limites pour trouver une primitive de  $\ln(x)$  :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{x+h}{x}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{x \times X}, \text{ avec } X = \frac{h}{x}.$$


$$\text{On a donc } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{x \times X} = \frac{1}{x} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = \frac{1}{x} \times 1 = \frac{1}{x}.$$

**Seconde Méthode** Pour ce calcul, il faut utiliser le calcul de la dérivée d'une fonction composée.

On a  $\exp((\ln(x))) = x$ , par conséquent la dérivée de cette expression s'exprime par  $\exp(\ln(x)) \times$

$$(\ln(x))' = 1, \text{ d'où } (\ln(x))' = \frac{1}{\exp(\ln(x))} = \frac{1}{x}.$$

**On vérifie ce résultat avec Sage.** La dérivée de  $\log(x) = \frac{1}{x}$ .



Le graphe de  $x \mapsto \ln(x)$ .

On peut maintenant entreprendre le calcul d'une primitive de la fonction  $x \mapsto \ln(x)$ .

### 5.1.2 Calcul d'une primitive de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ .


Je pose que  $u(x)$  est égal à la fonction  $\ln(x)$  et  $v'(x)$  est égal  $dx$  d'où  $u'(x)$  est égal à la fonction  $\frac{1}{1+x^2}$  et  $v(x)$  est égal  $x$ . Alors on a  $\int \ln(x) dx = x \times \ln(x) - \int \frac{1}{x} \times x dx = x \times \ln(x) - x + C^{ste}$ .  
Finalement,  $\int \ln(x) dx = x \times \ln(x) - x + C^{ste}$

**On vérifie ce résultat avec Sage.** Une primitive de  $\log(x) = x \log(x) - x + C^{ste}$ .

## 5.2 Calcul d'une primitive de $x \mapsto \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}}$ .

Je pose  $y - x = \sqrt{x^2 + 1}$  avec  $y - x = \sqrt{x^2 + 1} \geq 0$ , donc  $y \geq x$ .

Quel est le signe de  $y$  c'est-à-dire le signe de  $x + \sqrt{x^2 + 1}$  ?



La représentation graphique de  $x + \sqrt{x^2 + 1}$  et de sa dérivée.

En élevant au carré, on a

$$(y - x)^2 = x^2 + 1$$

$$y^2 - 2yx + x^2 = x^2 + 1$$

$$y^2 - 2yx = 1 \quad \text{puis en différentiant chaque variable}$$

$$2ydy - 2dy \times x - 2ydx = 0$$

$$(y - x)dy = ydx$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{(y - x)} = \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\int \frac{dy}{y} = \ln |y| + C^{ste} = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad \text{or } y = x + \sqrt{x^2 + 1} \geq 0$$

$$\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C^{ste} = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Or, nous avons déjà vu en 3.5.1, page 16 que la dérivée de la fonction  $x \mapsto \text{Argsh}(x)$  vaut  $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$  ce qui implique que  $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C^{ste} = \text{Argsh}(x)$ . Montrons-le !

### 5.2.1 Avons nous $\text{Argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ?


Posons  $y = \text{Argsh}(x)$ , comme  $\text{Argsh}$  est la fonction inverse de  $\text{sh}$ , on a  $\text{sh}(y) = \frac{\exp(y) - \exp(-y)}{2} = x$  d'où  $2x = \exp(y) - \exp(-y)$  et en multipliant par  $\exp(y)$ , on obtient l'équation du second degré en  $\exp(y)$ ,

$$(\exp(y))^2 - 2x \exp(y) - 1 = 0, \quad (5.1)$$

dont le discriminant  $\Delta$  vaut  $4x^2 + 4 \neq 0$ , ainsi les solutions s'écrivent  $\exp(y_1) = x + \frac{\sqrt{4x^2 + 4}}{2} = x + \sqrt{x^2 + 1}$  et  $\exp(y_2) = x - \frac{\sqrt{4x^2 + 4}}{2} = x - \sqrt{x^2 + 1}$ .

On ne retient que la solution  $\exp(y) = x + \sqrt{x^2 + 1}$  puisque la fonction exponentielle est toujours positive et que  $\exp(y_2) = x - \sqrt{x^2 + 1} < 0$ .

Finalement,  $y = \text{Argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ .




Les représentations graphiques de  $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$  et de  $\text{Argsh}(x)$ .

Nous avons montré l'égalité  $\text{Argsh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ .

## 5.3 Calcul d'une primitive de $x \mapsto \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$ .

Je pose  $y - x = \sqrt{x^2 - 1}$  avec  $y - x = \sqrt{x^2 - 1} \geq 0$ , donc  $y \geq x$ .

Quel est le signe de  $y$  c'est-à-dire le signe de  $x + \sqrt{x^2 - 1}$  ?



La représentation graphique de  $x + \sqrt{x^2 - 1}$  et de sa dérivée.

En élevant au carré, on a

$$(y - x)^2 = x^2 - 1$$

$$y^2 - 2yx + x^2 = x^2 - 1$$

$$y^2 - 2yx = -1 \quad \text{puis en différentiant chaque variable}$$

$$2ydy - 2dy \times x - 2ydx = 0$$

$$(y - x)dy = ydx$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{(y - x)} = \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$\int \frac{dy}{y} = \ln |y| + C^{ste} = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{or } y = x + \sqrt{x^2 - 1} \geq 0$$

$$\ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) + C^{ste} = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Or, nous avons déjà vu en 3.5.1, page 16 que la dérivée de la fonction  $x \mapsto \text{Argsh}(x)$  vaut  $\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$  ce qui implique que  $\ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) + C^{ste} = \text{Argsh}(x)$ . Montrons-le !

### 5.3.1 Avons nous $\text{Argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ ?


Posons  $y = \text{Argch}(x)$ , comme  $\text{Argch}$  est la fonction inverse de  $\text{ch}$ , on a  $\text{ch}(y) = \frac{\exp(y) + \exp(-y)}{2} = x$  d'où  $2x = \exp(y) + \exp(-y)$  et en multipliant par  $\exp(y)$ , on obtient l'équation du second degré en  $\exp(y)$ ,

$$(\exp(y))^2 - 2x \exp(y) + 1 = 0, \quad (5.2)$$

dont le discriminant  $\Delta$  vaut  $4x^2 - 4 \neq 0$ , ainsi les solutions s'écrivent  $\exp(y_1) = x + \frac{\sqrt{4x^2 - 4}}{2} = x + \sqrt{x^2 - 1}$  et  $\exp(y_2) = x - \frac{\sqrt{4x^2 - 4}}{2} = x - \sqrt{x^2 - 1}$ .

On ne retient que la solution  $\exp(y) = x + \sqrt{x^2 - 1}$  puisque la fonction exponentielle est toujours positive et que  $\exp(y_2) = x - \sqrt{x^2 - 1} < 0$ .

Finalement,  $y = \operatorname{Argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ .



Les représentations graphiques de  $\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$  et de  $\operatorname{Argch}(x)$ .

Nous avons montré l'égalité  $\operatorname{Argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ .