MS disease, its types and characteristics of each

بیماری ام اس (اسکاروز چندگانه) نوع عودکننده فروکشکننده، شایعترین نوع این بیماری است و در ۸۵ تا ۹۰ درصد موارد مشاهده میشود. این نوع معمولاً در سنین حدود ۳۰ سالگی آغاز میشود و به طور کلی خوشخیمتر از سایر انواع است.

ویژگیهای کلیدی این نوع شامل:

- عودهای مکرر: بیماری با حملات مکرر شناخته میشود که پس از هر حمله معمولاً بهبودی حاصل میشود.
 - 2. پیشرفت محدود: بین حملات پیشرفت چندانی وجود ندارد.
 - 3. تشدید علائم: علائم در هر حمله تشدید میشوند یا علائم جدیدی ایجاد میشود.
 - 4. تنوع علائم: علائم بسته به نواحی آسیب دیده در مغز و نخاع متفاوت هستند.
- 5. عدم نظم مشخص: حملات در زمانهای مختلف و بدون ترتیب خاصی رخ میدهند. این نوع ام اس به درمان دارویی بهتر پاسخ میدهد.

بیماری ام اس نوع پیشرونده اولیه ویژگیهای زیر را دارد:

- 1. پیشرفت تدریجی: ناتوانی بیمار بهطور مداوم افزایش مییابد.
 - 2. عدم وجود عود: هیچ حمله یا عود مکرری وجود ندارد.
- 3. شیوع: حدود ۱۰ در صد از بیماران مبتلا به ام اس به این نوع دچار هستند.
 - سن شروع: معمولاً در سنین بالای ۴۰ سال شروع می شود.
- 5. درگیری نخاعی: شایعترین مشکل، ضعف در اندامهای تحتانی است و درگیری های مخچه و تعادل کمتر مشاهده میشود.

این نوع از ام اس بهطور خاص با پیشرفت مداوم و بدون عود بر ایاس تاریخچه بیمار مشخص می شود. چون از مایش خاصی برای افتراق ان با نوع عود کننده بهبود یابنده و جود ندارد

بیماری ام اس نوع پیشرونده ثانویه ویژگیهای زیر را دارد:

- 1. تبدیل از نوع عودکننده: معمولاً ابتدا بیمار حملات عودکننده را تجربه میکند، اما پس از چند حمله، دیگر حملاتی رخ نمیدهد و بیماری به تدریج پیشرفت میکند.
 - 2. پیشرفت تدریجی: پس از اتمام حملات، بیماری بهطور مداوم پیشرفت میکند.
- 3. عدم پیشبینی: میزان احتمال تبدیل شدن نوع عودکننده به پیشرونده ثانویه قابل ارزیابی نیست .
- 4. تشخیص بر اساس تاریخچه: تشخیص این نوع بر اساس وجود عودها و حملات مکرر در گذشته و سپس پیشرفت تدریجی بیماری انجام می شود.
- **5. زمان تبدیل:** تبدیل از نوع عودکننده به پیشرونده ثانویه ممکن است ۱۰ تا ۲۰ سال بعد از اولین حمله رخ دهد.

این نوع از ام اس نیاز به توجه و درمان مستمر دارد تا از پیشرفت آن جلوگیری شود.

بیماری ام اس نوع عودکننده پیشرونده، بدخیمترین نوع این بیماری محسوب میشود و شیوع آن بسیار اندک است.

ویژگیهای کلیدی این نوع شامل:

- 1. پیشرفت مداوم: بیماری بهطور مداوم در حال پیشرفت است .
- 2. عودها و حملات: در این نوع، حملات و عودهایی نیز رخ میدهد، مشابه نوع عودکننده.
- **3. ترکیب ویژگیها:** میتوان این نوع را ترکیبی از نوع عودکننده و نوع پیشرونده اولیه دانست.
 - 4. تشدید مستمر: با هر حمله، وضعیت بیمار بدتر می شود و آسیب های بیشتری به جا میگذارد.

این نوع از ام اس به طور کلی شدیدتر از سایر انواع است و نیاز به مدیریت دقیق تری دارد.