



آمار و احتمالات مهندسی تمرین سوم - متغیر تصادفی، میانگین و واریانس محمد و ثمر تاریخ تحویل ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

سؤال ١.

برای هر یک از متغیرهای زیر نوع توزیع را مشخص کنید.

الف) یک برنامه ی نظارت شبکه به طور مداوم درخواستها را از طریق یک شبکه ارسال می کند. گاهی اوقات این درخواستها به دلیل مشکلات شبکه با شکست مواجه می شوند و باید دوباره ارسال شوند. متغیر تصادفی A، تعداد عملیات ارسال مجدد را در یک ساعت نشان می دهد.

ب) یک مهندس ایمنی در حال بررسی حوادث صنعتی در یک کارخانه است. او فکر می کند که ۴۰ درصد حوادث، ناشی از عدم رعایت دستورالعمل ها توسط کارکنان است. برای آزمایش این تئوری، گزارشهای حوادث بهطور تصادفی انتخاب می شوند تا زمانی که گزارشی پیدا شود که حادثهی ذکرشده اش ناشی از عدم رعایت روشهای ایمنی کارمند است. متغیر تصادفی B تعداد گزارش تا قبل از رسیدن به مورد عدم رعایت دستورالعمل ها است.

پ) فرض کنید یک درمان جدید برای نوعی سرطان ارائه می شود که ۱۰ درصد احتمال موفقیت دارد. ۵۰۰ بیمار به طور آزمایشی دارو را مصرف کردهاند. متغیر تصادفی C تعداد بیماران بهبود یافته است.

ت) یک حافظه ی خالی از رم کامپیوتر ایجاد می شود. از بین n مکان حافظه، k عدد اختصاص داده شده و بقیه آزاد هستند؛ همچنین هر دو مکان یک احتمال مساوی برای اختصاص داده شدن داشته اند. متغیر تصادفی D نشان دهنده ی طول یک بلوک پیوسته از حافظه آزاد است.

ث) قضیهی اعداد اول بیان می کند که برای n به اندازه ی کافی بزرگ، احتمال آنکه یک عدد صحیح با n^{v} رقم، عدد اول باشد برابر است با $\frac{1}{n^{\mathsf{v}}}$. فرض کنید می خواهیم یک عدد اول بزرگ با n^{v} رقم پیدا کنیم و این کار را با انتخاب یک عدد n^{v} رقمی و سپس چک کردن اول بودنش انجام می دهیم. متغیر تصادفی E تعداد اعداد صحیحی است که تا قبل از رسیدن به جواب امتحان می کنیم.

ج) فروشگاه لباس فروشی که در شهری کوچک و سرد واقع شده است، از ساعت ۶ تا ۲۰ باز است. مدیر این فروشگاه میخواهد برای باز بودن فروشگاه در نوبت شب (ساعت ۲۰ تا ۶) تصمیم بگیرد. برای این کار به مدت یک هفته فروشگاه را در نوبت شب نیز باز نگه داشته و میزان فروش در نوبت شب را محاسبه می کند. متغیر تصادفی F، تعداد فروش در نوبت شب است.

سؤال ٢.

در دوران همه گیری ویروس کرونا، افراد تمایل به دوری از جمعیتهای زیاد دارند و دوست دارند به خصوص در فضاهای سربسته مانند سالنهای سینما کنار جمعیت کمتری باشند.مدیر یک مجموعه تفریحی که سینما هم دارد، این نکته را با مسئول فروش بلیتها در میان می گذارد. مسئول فروش سانسهای مختلف را چک می کند. می گوید: "به طور مثال برای ساعت ۱۷، هر یک از ۴ سالن مجموعه، به ترتیب ۲۰، ۲۳، ۱۷ و ۱۰۰ تماشاچی دارند. در نتیجه به طور میانگین در هر سالن ۴۰ تماشاچی هستند و با توجه به ۱۲۰ نفره بودن سالنها این تعداد یک سوم ظرفیت سالن است و جمعیت زیاد نیست. برای بقیهی سانس ها هم حدودا به همین شکل است." اما آن شب تعداد زیادی تماس با قسمت انتقادات و پیشنهادات مجموعه گرفته می شود و از جمعیت زیاد سالن سینما در دوران همه گیری ویروس کرونا در سانس هایی از جمله سانس ساعت ۱۷ شکانت می شود.

الف) آیا مسئول فروش در اعلام تعداد میانگین جمعیت هر سالن و پیش بینی احساس تماشاچیان اشتباه کرده است؟ اگر خیر، دلیل احساس تماشاچیان چیست و اگر بله، تعداد میانگین درست برای سانس ساعت ۱۷ چقدر است؟

ب) احتمالاً تماسهای مربوط به سانس ساعت ۱۷ بیشتر از تماشاچیان کدام سالنها بوده است؟

پ) به نظر شما با چه ترکیب جمعیتی در سالنهای سینما، با همین روش استدلال و میانگین گیری مسئول فروش، نظر تماشاچیان مانند پیش بینی مسئول فروش می بود؟ (منظور این است که در چه صورتی اگر مسئول فروش پیش بینی شلوغ یا خلوت بودن سالنها را می کرد، تماشاچیان هم همان احساس را می کردند؟ همچنین در این بخش صرفا استفاده از مفهوم هم کافی است اما در صورت نیاز می توان از فرمولها هم برای توضیح بهتر پاسخ کمک گرفت.)

سؤال ٣.

یک جفت سکه را بطور همزمان پرتاب می کنیم. احتمال شیر آمدن هر سکه p هست.

الف)اگر این دو را همزمان با هم n بار پرتاب کنیم و X مجموع تعداد پرتابهایی باشد که نتایج این سکه با هم متفاوتاند، X از چه توزیع احتمالی پیروی می کند؟

Y فرض کنید اگر نتایج این دو سکه متفاوت باشند، شما ۱ دلار جایزه می گیرید و در غیر آن صورت ۱ دلار از دست می دهید. اگر Y کل سود شما باشد، Y را برحسب X بدست آورید. امید ریاضی و واریانس Y چقدر است؟

سؤال ۴.

۲ نامزد انتخابات کارگروه آموزشی دانشکده در حال پخش کردن برگههای تبلیغات خود در بین ۲۰۰۰ نفر از دانشجویان هستند. با توجه به محدودیت زمان و هزینه، هر نامزد توانسته در بخش انتشارات تنها ۲۰۰ برگه تبلیغ پرینت بگیرد؛ سپس به طور تصادفی و با احتمال یکسان آنها را بین ۲۰۰ نفر از ۲۰۰۰ دانشجو پخش کرده است. فرض کنید دانستن اینکه چه کسانی تبلیغ نامزد اول را دریافت کردهاند، هیچ اطلاعاتی در مورد افرادی که تبلیغ نامزد دوم را دریافت کردهاند نمی دهد. شایان ذکر است که از دید دو نامزد انتخابات، بعید است که یک دانشجو برگهی تبلیغ هردو را گرفته باشد و با اطلاعات کافی از هر دو نامزد رای بدهد.

الف) توزیع تعداد دانشجویانی که توانستهاند بعد از دریافت و مطالعهی هر دو تبلیغ و با اطلاعات کافی رای بدهند از چه نوع است؟چرا؟ (متغیر تصادفی تعداد دانشجویان با این شرایط را X در نظر بگیرید.)

ب) تابع جرمي احتمال X را بيابيد.

 χ امید ریاضی X را با استفاده از متغیرهای شاخص بیابید.

سؤال ۵.

هر یک از اعضای یک گروه n نفره، مستقل از یکدیگر، تاس سالمی را پرتاپ می کنند. به ازای هر k فردی که طی پرتاب تاس هایشان عدد مشابهی مشاهده کنند، k امتیاز به گروه داده می شود. به عنوان مثال در یک گروه ۱۱ نفره (n=1)، اگر پس از پرتاب تاس ها سه بازیکن عدد ۲، چهار بازیکن عدد ۵، یک بازیکن عدد ۶ و یک بازیکن عدد ۶ را مشاهده کنند، ۷ امتیاز عدد ۲، چهار بازیکن عدد ۶ می گروه تعلق می گیرد. میانگین امتیاز گروه را بر حسب n حساب کنید.

سؤال ٤.

فرض کنید که $X_1, X_7, ..., X_n$ متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکنواخت در بازه (a,b) باشند.

$$X_i \sim Uniform(a,b)$$
 , $a < b$

الف) فرض کنید $Y=min(X_1,X_7,...,X_n)$ تابع توزیع انباشته Y را بیابید. Y امید ریاضی متغیر تصادفی Y را محاسبه کنید.

سؤال ٧.

تانکهای ارتش یک کشور از ۱ تا N شماره گذاری شده اند. این کشور در یک جنگ، n عدد از تانکهای خود را از دست می دهد و تانکها به دست دشمن می افتد. دشمن درمی یابد که تانکهای تصاحب شده شماره گذاری شده اند. الف) دشمن چگونه می تواند تخمینی برای تعداد کل تانکهای این کشور (یعنی N) به دست آورد؟ بی تصاحب کند و بیشترین و کمترین شماره های تصاحب شده ۲ و ۱۱۷ باشند، تخمین تعداد کل تانکهای این کشور چقدر است؟

سؤال ٨.

تمرین کامپیوتری سری سوم با موضوع «توزیع احتمالهای گسسته» را میتوانید از طریق این لینک ۱ دریافت کنید.

- یک کیی از فایل مذکور با نام CA3_SID در گوگل درایو خود تهیه کنید.
- در فایل خود بخش هایی که به وسیله مستطیل مشخص شده اند را با کدهای مناسب جایگزین کنید.
 - سوالاتي كه به زبان فارسي و رنگ سفيد مطرح شدهاند را در همان سلول پاسخ دهيد.
- فابل كد خود را با ايميل hesam.as.sa.as@gmail.com با دسترسي Editor به اشتراك بگذاريد.
 - لینک فایل پاسخ خود را در بخش متنی جایگاه آپلود این تمرین در سامانه ایلرن قرار دهید.
- دقت کنید در صورتی که لازم به ایجاد یک سلول جدید برای اجرای کد داشتید، اول سلول از R% استفاده کنید تا سلول به عنوان کد R تشخیص داده شود.

هرگونه انتقاد، پیشنهاد یا نکته جانبی را میتوانید از طریق یک سلول متنی در ابتدای فایل (قبل از سرفصل اصلی) به ما منتقل کنید.

 $^{^{1}\}mathrm{TODO}$