

高雄榮民總醫院 整形外科 一般衛教文件

科別	整形外科	編號：3070003
主題	高壓氧治療	2004.07.01訂定
製作單位	整形外科	2023.06.30審閱/修訂

一般說明：

高壓氧治療：病患在密閉之高壓治療艙中，增加艙內壓力，提高血中之氧氣分壓，促進微細血管增生，增進組織再生之能力，加速傷口癒合。利用氣體在加壓的情況下，溶解度會提高的物理特性，以此來提昇組織中氧氣的分壓促進新生血管及新生組織來使傷口癒合得以加速進行。

高壓氧治療健保適應症為急性一氧化碳中毒、放射線治療後引起之骨壞死或放射線治療後所引起之膀胱炎出血或直腸出血、骨髓炎、壞死性筋膜炎、二至三度燒傷且表面積介於百分之十五至百分之九十、氣壞疽病、肢體壓傷伴有創傷性出血、減壓病…等；非健保適應症如困難癒合之傷口、缺氧性腦病變、突發性耳聾等，一個療程約做20-30次，單人艙每次90分鐘，多人艙每次120分鐘，治療時有些病患會有耳朵因不適應壓力改變而產生之疼痛或牙疼，少數病患會產生嘔吐甚至痙攣之現象，但絕大多數之病患均可在安全的環境下完成所有治療，並且對傷口產生極大的進步效果。

如何自我照顧：

接受高壓氧治療時如有耳鳴、牙疼甚至痙攣等現象，請停止接受高壓氧治療，並且要尋求耳鼻喉科、牙科或神經內科之診療，如果治療時仍有膀胱或直腸繼續出血之現象，也應再回泌尿科或大腸直腸外科診療。

何時應就醫：

如有上述需要高壓氧治療之適應症，可至整形外科門診洽詢或請您的主治醫師會診整形外科加以評估，如果病情需要且符合健保規定，本科將儘速安排您做高壓氧治療亦或以自費做治療。

備註：每年修訂或審閱乙次

警語：所有衛教資訊內容僅供參考使用，無法取代醫師診斷與相關建議，若有身體不適，請您儘速就醫，以免延誤病情。