

「鈣」厲害！ 一起認識乳品類

文 / 陳郁臻
國泰綜合醫院營養師



依據「國人膳食營養素參考攝取量」建議，一般成年人每天需攝取1000毫克的鈣質，但根據台灣歷次「國民營養健康狀況變遷調查」報告發現，國人礦物質攝取以鈣的不足狀況最為嚴重，如果想有效補鈣，最常想到的就是喝乳品類，但現在市售的「奶」種類又多又複雜，因此我們需要學習何謂乳品類，唯有挑選正確的乳品類才能有效補鈣。

「奶」的分類

乳品類

鮮奶、奶粉、保久乳、羊奶、羊奶粉等…。
乳製品：起司、優格、優酪乳。

非乳品類

植物奶：燕麥奶、豌豆奶、杏仁奶、核桃奶、腰果奶等…。
豆製品：豆奶（豆漿）。

每100毫升	鮮奶	羊奶	杏仁奶	燕麥奶	豆奶(豆漿)
六大類食物歸類	乳品類	乳品類	油脂與堅果種子類	全穀雜糧類	豆魚蛋肉類
熱量（大卡）	63	65	17.1	44	35
碳水化合物（克）	4.8	4.2	0.3	8.1	0.7
蛋白質（克）	3.1	3.4	0.6	1	3.6
脂肪（克）	3.6	4.0	1.5	0.8	1.9
乳糖（克）	4.4	4.0	0	0	0
鈣（毫克）	104	110	120	4	24
膳食纖維	0	0	0.8	1.1	1.3
維生素A	143	143	0	0	0
膽固醇	13	17	-	-	-

資料來源：台灣地區食品營養成分資料庫

並非產品名有「奶」就屬於乳品類。市售的乳品類只有牛奶、羊奶及其製品，如：奶粉、保久乳、起司、優格、優酪乳等可稱為乳品類，因此市售稱為「植物奶」的皆不屬於六大類食物中的乳品類，更是不可隨意替換的。首先，市售最廣泛的植物奶－「杏仁奶」其實是油脂與堅果種子類，它每100毫升中所含的鈣質含量雖較牛奶多，但因成份富含草酸、植酸與膳食纖維等物質，容易形成草酸鈣，導致鈣質的吸收利用率降低，因此考量有效的補充鈣質時，一般會建議選用動物性的乳品類，來提高體內的鈣質利用率；但是，對於有乳糖不耐症者來說，雖然植物奶不能取代乳製品，但在別無選擇時，杏仁奶也是一種可以補充鈣質的食物選擇。乳品類除了可補充鈣質外，它還富含優質蛋白質，與豆魚蛋肉類的「豆奶」皆是屬於高營養價值的食物，雖然豆奶的鈣質不多，不是補鈣的好選擇，但若是以補充蛋白質而言，它會是替代其他豆魚蛋肉類的好選擇。燕麥奶屬於全穀雜糧類，它與乳品類都是富含高碳水化合物的食物，所以有需要血糖控制者在攝取燕麥奶或乳品類時，都需要定時定量才可避免血糖波動，導致血糖控制不佳。

各種乳品類的營養價值

乳品類與其製品，一份都可提供約250毫克鈣質，若依照國民飲食指南建議『每天早晚一杯奶』，就是一天攝取兩份乳品類，即可以達到「國人膳食營養素參考攝取量」建議量的一半，而每天早晚一杯奶這項建議，對於有乳糖不耐症者可使用起司或其他乳製品來取代，利用食物代換的方式達到補充鈣質的目的，但需要限鈉者，因起司的製程過程中其鈉含量增高，所以攝取時需要限量。

	鮮奶	奶粉	保久乳	起司	優格	羊奶
每份重量(克)	240	30	240	45	210	240
熱量(大卡)	151	151	149	124	204	156
碳水化合物(克)	11.5	11.1	12.2	2.4	28.6	10.1
蛋白質(克)	7.4	7.9	7.2	7.3	6.5	8.2
脂肪(克)	8.6	8.5	8.2	9.5	6.9	9.6
乳糖(克)	10.6	10.9	10.8	0.6	8	9.6
鈣(毫克)	250	274	228	242	216	264
鈉(毫克)	89	101	132	638	145	89
鉀(毫克)	353	394	398	28	365	439
磷(毫克)	199	207	247	173	191	211
鎂(毫克)	24	28	26	10	27	34

上述皆依一份全脂乳品做比較

資料來源：台灣地區食品營養成分資料庫

乳品闢謠專區

Q1 全脂、低脂到底 選擇哪一類？

從補充鈣質的觀點看，補充一份全脂乳品與低脂乳品都是一樣能補充約250毫克鈣質，但兩種乳品最大差異是在「脂肪」含量，全脂乳品的脂肪量多相對的熱量高，但其他的營養成分都無太大差異，所以除非是需要控制熱量，否則選擇全脂與低脂都一樣好。

每240毫升	全脂乳品	低脂乳品
熱量(大卡)	151	103
碳水化合物(克)	11.5	12.0
蛋白質(克)	7.4	7.9
脂肪(克)	8.6	2.8
乳糖(克)	10.6	11.3

Q2 保久乳可久放是因為含有防腐劑？ 保久乳的營養比鮮奶不好？

保久乳是不含防腐劑，它之所以能久放是因為在製程過程中使用超高溫短時間殺菌，與鮮乳使用的高溫短時間殺菌有些微差異，但都可以達到消滅病原菌的效果。只是因為鮮乳殺菌溫度較低，所以保存期限相對較短也須冷藏保存。從成分表上可看出，兩者之間的營養成分是有差異的。

