

# hw\_15(2)

## 习题6.6

5.

(1) 验证矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

有相同的特征多项式;

解:

$$\begin{aligned} \chi_A(t) &= |tE - A| \\ &= (t-2)^2(t-4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \chi_B(t) &= |tE - B| \\ &= (t-2)^2(t-4) \end{aligned}$$

故相同

(2) 求出它们的极小多项式;

解:

$$\begin{aligned} (A - 2E)(A - 4E) &= 0 \\ \text{故 } m_A(t) &= (t-2)(t-4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (B - 2E)(B - 4E) &\neq 0 \\ \text{故 } m_B(t) &= (t-2)(t-4)^2 \end{aligned}$$

(3) 求出它们的约当标准形。

解:

$$J_A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$J_B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

6. 设  $A$  是  $n$  阶复方阵。证明:  $A$  是幂零的当且仅当  $\text{tr}(A^k) = 0$ ,  $1 \leq k \leq n$ 。

解:

先证必要性

$A$  为幂零,  $t_1 = \cdots = t_n = 0$ ,  $\text{tr}(A^k) = \text{tr}(J(A)^k) = 0$

再证充分性

$\text{tr}(A^k) = \text{tr}(J(A)^k) = \lambda_1^k + \lambda_2^k + \cdots + \lambda_n^k = 0$

故  $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$

故  $A$  为幂零

7. 如果线性算子  $\mathcal{A}$  的约当标准形只有一个约当块, 确定  $\mathcal{A}$  的所有不变子空间。

解:

令

$$J_A = \begin{pmatrix} t & 1 & & \\ & t & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & t \end{pmatrix}$$

设对应的一组约当基为  $e_1, \cdots, e_n$

$$(A - tE)e_1 = 0$$

$$(A - tE)e_k = e_{k-1}$$

令  $B = A - tE$

$$V_0 = \{0\}, \quad V_k = \ker B^k, \quad V_n = V$$

故  $A$  的所有不变子空间为  $V_0, V_1, \cdots, V_n$

14. 如果线性算子  $\mathcal{A}$  在基  $e_1, \dots, e_n$  下的矩阵是

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 4 & 10 & -12 \\ 3 & 6 & -7 \end{pmatrix}, \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求出  $\mathcal{A}$  的一个约当基和  $\mathcal{A}$  在约当基下的矩阵。

解:

(1)

$$\chi(t) = (t-2)(t^2 - 4t - 14)$$

$$t_1=2,\quad t_2=2+3\sqrt{3},\quad t_3=2-3\sqrt{3}$$

$$J=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2+3\sqrt{3}&0\\0&0&2-3\sqrt{3}\end{pmatrix}$$

$$t_1=2, (A-2E)X=0$$

$$X_1 = [-2,1,0]$$

$$t_2=2+3i,$$

$$X_2=\left[\frac{1}{3}+\sqrt{3},\frac{4}{3},1\right]$$

$$t_3=2-3i,$$

$$X_3=\left[\frac{1}{3}-\sqrt{3},\frac{4}{3},1\right]$$

$$(2)$$

$$\chi(t)=(t-1)^4,\quad t=1$$

$$J=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$(A-E)v_2=v_1,\quad (A-E)v_4=v_3$$

$$v_2=[0,0,0,1],\quad v_1=[1,1,0,0]$$

$$v_4=[0,1,1,0],\quad v_3=[0,0,1,1]$$