

hw_7(2)

习题4.2

2. 令 $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0\}$. 它是行向量空间 \mathbb{R}^4 的子空间.

(1) 证明 $u_1 = (2, -1, 0, 0)$, $u_2 = (3, 0, -1, 0)$, $u_3 = (1, 0, 0, 1)$ 是 U 的一个基.

解:

$$u_1, u_2, u_3 \in U$$

$$\text{设 } au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$$

$$\begin{cases} 2a + 3b + c = 0 \\ -a = 0 \\ -b = 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

$a = b = c = 0$, u_1, u_2, u_3 线性无关, 故为 U 的一个基

(2) 证明 $v_1 = (1, 1, -1, 0)$, $v_2 = (1, 1, 0, 3)$, $v_3 = (1, 0, 1, 4)$ 是 U 的一个基.

解:

$$v_1, v_2, v_3 \in U$$

$$av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$$

$$\begin{cases} a + b + c = 0 \\ a + b = 0 \\ -a + c = 0 \\ 3b + 4c = 0 \end{cases}$$

$a = b = c = 0$, v_1, v_2, v_3 线性无关, 故为 U 的一个基

(3) 求从基 u_1, u_2, u_3 到基 v_1, v_2, v_3 的转换矩阵.

解:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} v_1 = t_{11}u_1 + t_{21}u_2 + t_{31}u_3 \\ v_2 = t_{12}u_1 + t_{22}u_2 + t_{32}u_3 \\ v_3 = t_{13}u_1 + t_{23}u_2 + t_{33}u_3 \end{cases}$$

$$T = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

(4) 求 $w = (1, 1, 1, 6) \in U$ 在基 u_1, u_2, u_3 和基 v_1, v_2, v_3 下的坐标列向量.

解:

$$W_u = (-1, -1, 6)$$

$$W_v = (-1, 2, 0)$$

3. 求下列向量张成的线性子空间的一个基和维数: $(1, 1, 1, 1, 0)$, $(1, 1, -1, -1, -1)$, $(2, 2, 0, 0, -1)$, $(1, 1, 5, 5, 2)$, $(1, -1, -1, 0, 0)$.

解:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dim A = 3$$

基: $(1, 1, 1, 1, 0)$

$(1, 1, -1, -1, -1)$

$(1, -1, -1, 0, 0)$

5. 设 U 和 V 是 \mathbb{R}^n 的子空间, $\dim(U + V) = 1 + \dim U \cap V$. 证明: $U + V$ 是这两个子空间中的一个, $U \cap V$ 是这两个子空间中的另一个.

解: 设 $\dim(U \cap V) = a$, $\dim U = a + t$, $\dim V = a + s$

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V)$$

$$= 1 + \dim(U \cap V)$$

$$a + s + a + t - a = 1 + a$$

$$s + t = 1$$

故 $s = 1, t = 0$ 或 $s = 0, t = 1$

若 $s = 1, t = 0$, $\dim U = a$, $\dim V = a + 1$

$$U \subset V$$

故 $U = U \cap V, V = U + V$

若 $s = 0, t = 1$, 同理, $U = U + V, V = U \cap V$

6. 证明：子空间 U_1, U_2, \dots, U_k 线性无关当且仅当

$$(U_1 + U_2 + \dots + U_{i-1}) \cap U_i = 0, \quad 1 < i \leq k.$$

解：先证充分性： \Rightarrow

$$\text{当 } (U_1 + \dots + U_{i-1}) \cap U_i = 0, \quad (1 < i \leq k)$$

取各自任意向量, s.t. $u_1 + \dots + u_k = 0$

$$-u_k = u_1 + \dots + u_{k-1} \in U_k \cap (U_1 + \dots + U_{k-1})$$

故 $u_k = 0$, 同理, $u_1 = u_2 = \dots = u_k = 0$

故线性无关

再证必要性： \Leftarrow

若线性无关

$$\text{设 } x \in (U_1 + \dots + U_{i-1}) \cap U_i$$

$$\text{令 } x = u_i = u_1 + \dots + u_{i-1}$$

$$u_1 + \dots + u_{i-1} - u_i = 0$$

故

$$u_1 = \dots = u_{i-1} = u_i = 0$$

故

$$(U_1 + \dots + U_{i-1}) \cap U_i = 0$$

7. 设 U, V, W 是 \mathbb{R}^n 的子空间. 下列等式是否成立?

$$U \cap (V + W) = (U \cap V) + (U \cap W).$$

解:

7、不成立

$$U = \{(x, y) \mid x = y\}$$

$$V = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

$$W = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$$

$$U \cap (V + W) = U = \{(x, y) \mid x = y\}$$

$$(U \cap V) + (U \cap W) = \{0\}$$

8. 证明直和不满足消去律，即等式 $U \oplus V_1 = U \oplus V_2$ 并不意味着 $V_1 = V_2$.

解: $V_1 = \{(1, 0)\}$

$V_2 = \{(0, 1)\}$

$U = \{(1, 1)\}$

$U \oplus V_1 = \mathbb{R}^2, U \oplus V_2 = \mathbb{R}^2$

但 $V_1 \neq V_2$

9. 找出子空间 $\langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ 和子空间 $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ 的和与交的一个基:

(1) $u_1 = (1, 2, 1), u_2 = (1, 1, -1), u_3 = (1, 3, 3),$

$v_1 = (1, 2, 2), v_2 = (2, 3, -1), v_3 = (1, 1, -3);$

解:

和的基: $\{(1, 2, 1), (1, 1, -1), (1, 2, 2)\}$

交的基: $\{(3, 5, 1)\}$

10. 设 $u = (1, 1, 1, 0), v = (0, 1, 1, 1), w = (1, 1, 0, 0)$ 是 \mathbb{R}^4 中的向量.

(2) 证明不存在纯量 a, b, c 使得 $au + bv + cw = (1, 2, 3, 4)$.

解:

$$\begin{cases} a + c = 1 \\ a + b + c = 2 \\ a + b = 3 \\ b = 4 \end{cases}$$

无解, 故不存在

12. 判断 $[-4, -8, 6, -5]$ 是否在 $[3, 8, -5, 2], [-5, 7, -8, -2], [-9, 6, 3, -9]$ 张成的子空间中.

解:

设 $[-4, -8, 6, -5] = a[3, 8, -5, 2] + b[-5, 7, -8, -2] + c[-9, 6, 3, -9]$

$$\begin{cases} 3a - 5b - 9c = -4 \\ 8a + 7b + 6c = -8 \\ -5a - 8b + 3c = 6 \\ 2a - 2b - 9c = -5 \end{cases}$$

无解

故不在