

hw_7(1)

习题4.1

1. 设 E_1, E_2, E_3 是列向量空间 \mathbb{R}^3 的标准基。

(1) 证明：向量组 $E_1, E_1 + 2E_2, E_1 + 2E_2 + 3E_3$ 和向量组 $E_1 - E_2 + E_3, E_2 - E_3, E_3$ 都是 \mathbb{R}^3 的基。

解：

$$\begin{aligned} & \text{设 } aE_1 + b(E_1 + 2E_2) + c(E_1 + 2E_2 + 3E_3) = 0 \\ & \quad \begin{cases} a + b + c = 0 \\ 2b + 2c = 0 \\ 3c = 0 \end{cases} \\ & a = b = c = 0 \\ & \text{故 } E_1, E_1 + 2E_2, E_1 + 2E_2 + 3E_3 \text{ 线性无关, 为 } \mathbb{R}^3 \text{ 的基} \\ & \text{设 } a(E_1 - E_2 + E_3) + b(E_2 - E_3) + cE_3 = 0 \\ & \quad \begin{cases} a = 0 \\ -a + b = 0 \\ a - b + c = 0 \end{cases} \\ & a = b = c = 0 \\ & \text{故 } E_1 - E_2 + E_3, E_2 - E_3, E_3 \text{ 线性无关, 为 } \mathbb{R}^3 \text{ 的基} \end{aligned}$$

(2) 求从基 $E_1, E_1 + 2E_2, E_1 + 2E_2 + 3E_3$ 到基 $E_1 - E_2 + E_3, E_2 - E_3, E_3$ 的转换矩阵, 以及从基 $E_1 - E_2 + E_3, E_2 - E_3, E_3$ 到基 $E_1, E_1 + 2E_2, E_1 + 2E_2 + 3E_3$ 的转换矩阵。

解：

$$\begin{aligned} T_{B \rightarrow A} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{5}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$T_{A \rightarrow B} = T_{B \rightarrow A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

(3) 假设向量 X 在基 $E_1, E_1 + 2E_2, E_1 + 2E_2 + 3E_3$ 下的坐标列向量是 $[2, -1, 5]$, 求 X 在基 $E_1 - E_2 + E_3, E_2 - E_3, E_3$ 下的坐标列向量。

解:

$$T_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 23 \end{pmatrix}$$

4. 叙述和证明定理4.7的行向量空间的版本。

解:

行向量空间 \mathbb{R}^n 中的向量 u 在基 A_1, A_2, \dots, A_n 下的坐标行向量为 $X = (x_1, \dots, x_n)$, 在基 B_1, B_2, \dots, B_n 下的坐标行向量为 $Y = (y_1, \dots, y_n)$, 那么其中 T 是从基 A_1, A_2, \dots, A_n 到基 B_1, B_2, \dots, B_n 的转换矩阵

证明:

$$u = X(A_1, A_2, \dots, A_n) = Y(B_1, B_2, \dots, B_n)$$

$$(B_1, B_2, \dots, B_n) = (A_1, A_2, \dots, A_n)T$$

得

$$X(A_1, A_2, \dots, A_n) = Y(A_1, A_2, \dots, A_n)T$$

$$X = YT$$

5. 设

$a_1 = (3, 5), a_2 = (-2, 6), b_1 = (\cos \theta, \sin \theta), b_2 = (-\sin \theta, \cos \theta)$ 。利用习题1很容易知道向量组 a_1, a_2 和向量组 b_1, b_2 都是 \mathbb{R}^2 的基。求从基 a_1, a_2 到基 b_1, b_2 的转换矩阵 T 。

解:

$$T = A^{-1}B$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \frac{1}{28} \begin{pmatrix} 6 \cos \theta + 2 \sin \theta & -6 \sin \theta + 2 \cos \theta \\ -5 \cos \theta + 3 \sin \theta & 5 \sin \theta + 3 \cos \theta \end{pmatrix}$$

6. 向量组 $a_1 = (5, -2), a_2 = (3, 1)$ 和向量组 $b_1 = (3, -2), b_2 = (-3, 4)$ 均是行向量空间 \mathbb{R}^2 的基。求向量 $u = (7, -5)$ 在这两个基下的坐标行向量。

解:

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$X_1 = (7, -5)A^{-1} = \frac{1}{11}(7, -5) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} = (2, -1)$$

$$X_2 = (7, -5)B^{-1} = \frac{1}{6}(7, -5) \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = (\frac{13}{6}, -\frac{1}{6})$$